






914.91

£35



Vice-Læbmand Eggert Dlassens
og
Land-Physici Biarne Povelsens
Reise igiennem Island,
foranstaltet
af
Videnskabernes Sælskab
i Kiøbenhavn,
og beskreven af forbemeldte
Eggert Dlassen,
med
dertil hørende 51 Kobberstøfter
og
et nyt forfærdiget Kart over Island.

Anden Deel.

Sorøe, 1772.

Trykt hos Jonas Lindgrens Enke.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.



Norder = Island.

Hunevands-, Hegrenæs-, Badle-
og Thingoe = Syffeler.

§. 696.

Dm dette Stykke og de tvende efterfølgende kunne vi Indledning.
nu mælde, at da vi i de foregaaende, og især det sidste
Stykke om Bestiordene, have anført og beskrevet de
fornehmeste Ting, der høre til Islands Beskrivelse, og hvoraf al
Mængden passer sig til det øvrige af samme; da blive de efterfølgende
Afhandlinger om de treende Landets Gierdunger, nemlig
Nord- Øster- og Sønder-Landet, langt kortere end de forrige;
thi her mældes i hver Gierding ikkun om de Ting, som den haver
for sig selv, men de, som den haver tilsælles med de andre, hen-
viises til de forrige Stykker.

§. 697.

Reisen over
Nordlandet
i Almindelig-
hed.

Det første Aar vi komme til Jsland, nemlig 1752, begyndte vi Reisen sonden fra, over de Fjælde, som ligge midt oppe i Landet fra Øster til Vester: Vi agtede os over Rislveien fra Thingvalle til Skagefiorden, hvilkken Vei regnes for 20 Mile i Længden; men da vi vare midt paa Fjældene, paaKOM os et meget haardt Veir, med Blæst og Regn, hvorved vi toge feil af Veien og forevilde paa disse vidtloftige Fjælde i 3 Dage, da vi hverken havde Føde for os, eller Græs til Hestene; Vi maatte med Livs Fare over store Jokel: Elve, hvor vi ingen Badsteder vidste. Hestene brækkede Skoene af sig og Høverne med; hvorfors vi maatte gaae til Fods. Endelig hittede vi ned til Øsfiorden, og efter nogle Dage fortsatte Reisen derfra over Thingoe: Syssel nord til Tior-næs og de ildsprudende Svovelbiærge ved Myvatn. Om Efter-høsten reiste vi tilbage over samme Syssel, til Des og Skage: Fjøl-den, og derfra over Rislveien til Sønderlandet. 1755 foretog vi atter en Reise til Nordlandet, først fra Dale: Syssel til Rutefiord, som adskiller Stifstene, og hvis Nordside horer til Nordlandet og Hunevands: Syssel. Vi reisde da over dette og Hegrenæs: eller Skagefiords: Syssel, tillige med en: Deel af Øsfiords: eller Badle: Syssel, i dette Aar, og vendte tilbage i October: Maaned. I Aaret 1757, forend vi toge fra Jsland, reisde vi over de Stykker, som vi hidindtil ikke havde besøgt; nemlig Viarne Dovelsen over Langelæs, og de paa begge Sider af dette Sted liggende nordligste Egne af Nord: og Øst: Landet; men Eggert Olaffen over et Stykke af Vesterlandet, især Vardestrands: Syssels Egne, nær ved Vard-tripfiord og Fuglebiærget.

ved .2

112

§. 698

§. 698.

Man regner almindelig Norder-Fjerdungen for den 3die Deel Nordlandets af Jsland. I Hensigt til Storrelsen kan det neppe være; thi naar ^{Storrelse og} man tager de øde Fjælde med, da bliver Vesterlandet næsten lige saa stort, og Østerlandet noget større. Men i Hensigt til Bygden er Nordlandet en god Deel større, end nogen af de andre Fjerdunger, og næst efter Sønderlandet best beboet; dog udgjør Nord-Fjerdungens Mandtall ikke den 3die Deel af Nationen. Veliggenheden er norden paa ret smuk, med jævnlige Afvejslinger af Fjorde og Dale, Næs og korte Fjældsveie: først Balkanæs imellem Rutefiord og Midfiord; Vatnæs imellem den og Hunefiord; Skagen imellem den og Skagafiord: Gliotahorn eller Dale-Taa slutter denne Fjord; og imellem bemældte Forbiærg og Giogrer skær Øsfiorden sig ind i Landet; de smaa Fjorde og Vigge østen og vesten for den, kendes ikke meget paa Landkortet. Skialfandefiord er imellem Giogrer eller Reykenæs og Tisrønæs østen for Huusevigs Havn. Rødenup eller Rødenæs er det nordligste Fjorbiærg paa Nordlandet, og den fornemste Fjord imellem samme og Langanæs, (der adskiller Nord- og Øster-Fjerdungen), er Øsfiorden, mange andre mindre Vigge og Fjorde uberegneede. Bygden paa Nordlandet ligger da fornemmelig nær ved Fjorde og Vigge, og ovenfor dem, eller op til Dalene. Dens Breedhed kan anslaaes fra Næssene op til Dalene 4 til 6 Meile, og Længden fra Langanæs til Rutefiord 45 Meile. Oven eller sonden for Bygden ligger høie og vidtloftige Fjælde, som tildeels ere skulte med Jis: De betegnes med Fjældsveienes Navne: Arnarvatnsheide imellem Hunevats-Spyss og Borgarfiorden; Kislveien imellem Skagafiord og Sydlandet; Sprengesand og Mødredals-Øræft, 2de

vidtledige Fjeldstrækninger imellem Badle og Thingoe-Syffeler og Østerlandet. De fornemste Bjærge, som ligge Nordlandet nærmest, og ere bedækkede med Jøkel, ere oppe paa Fjældene disse: **Bald-Jøkel**, som indtager en stor Strækning, fra Eriks-Jøkel over Borgarfiorden, til Kiølsveis-Fjældet, hvor Veien ligger. Paa den anden Side af Veien, nemlig mod Østen, begynder **Hofs-Jøkel**, et henved 15 Milie langt Jisbiærg, som af Østerlandets Beboere kaldes **Lange-Jøkel**. Norden til ved dette Jisbiærg ligger den Fjældvei Varnahialle fra Kiølsveien til Desfiord, og sønden til den forbermældte Sprængesand fra Rangaavalle-Syffel til Baarderdal i Thingoe-Syffel, hvilken Dei er nu mesten glemt og reent afslagt, ja Mellemfarten selv ophævet, til stor Skade for Indbyggerne; saa at de, der endelig skulle reise til disse Steder, maa tage en anden langt besværligere og længere Vej. De andre store Bjærge og Jøkeler nævnes ikke paa dette Sted, saasom man ikke seer dem fra Bygden i Nordlandet; thi Fjældene gaae derfra langs som op ad, førend man kommer til de største Bjærge midt oppe i Landet, og disse ligge Sønder og Øster-Landet nærmere, hvorfore vi og ville handle nærmere om dem, naar vi komme til de sidste Stykker. Men derimod tilhøre Nordlandet egentlig og alene følgende Jisbierge, som ligge nær ved Bygden: **Tuneryggs-Jøkel** imellem Kolbensdal og Horgaadalen, hvor Indboanerne tit reise over; **Unedals-Jøkel**, liggende imellem Skagefiord og Svarfedalen; **Deilberdals-Jøkel** kaldes ogsaa et Jisbiærg her i Nærvarølsen.

§. 699.

Bygdens
Inddeeling.

Bygden paa Nordlandet er deelt i 4 Syffeler. **Sunevands-** og **Skagefiords-** eller **Segrenæs-Syffeler** adskilles ved de ud til Skage

Skageheide lobende Evarfielde og Viærge, hvoriblandt Lindastol er det fornemste. Segrenæs: og Desfiordo: eller Vadle: Sysseler adskilles ved et andet Evarfiæld og Fiældevei, Ørnedals: Helde, tilligemed de Fiælde, som løbe der ud fra til Dlafsiord, Siglenæs og Fiothorn. Vadleheide ligger imellem Desfiorden og Thingoe: Syssel, men Sysselerne adskilles egentlig ved den Viærge: Klostet Bargiaa i Riobanger: Sæit; thi den østlige Side af Desfiorden, her uden for, hører til det sidste og ikke til Vadle: Syssel. Det nordligste Grændsefiæl imellem Thingoe: Syssel og Muule: Syssel paa Østerlandet, og tillige imellem Stifterne og Fierdungerne, er Langanæs, men især den Odde Ekaalatange, som løber der ud fra. Sodenæs er det Præstegjæld, som er norden paa Næffet, og til det høre nogle Gaarde, der ligge paa den søndre Kyst og inden Muule: Syssel.

§. 700.

De fornemste Fiorde og Forbiærge bleve nyelig opregnede. Stranden
og Æerne. Nordlandets Kyster ere ellers overalt ujævne, og paa de fleste Steder der klippagtige. Søen uden for Landet er reen og Dybheden ikke meget forskiellig. Æerne ere saa, og ligge allesammen, Grims: se undtagen, nær ved Stranden. Rutse ligger i Rutesfiord, og hører til Melstad Præstekald. Den giver Fugle og Sælhundefangst med Garn, samt Værdtunn. Inde i Skagefiorden ligge 4 Æer: Ingvelbstadholm paa Røpkestrand, giver Fuglevildt og Duun. Elinarholm uden for Kolbensaaens Udlob, har liden Nytte. Lundse, hvor man har Sælhundefangst, Værdtunn og Fuglefangst. Drangse er formedelt dens store Nytte af Viærge: fuglefangst, Høestæt og skion Vinter: Græsning, den fornemste af Nordlandets ubeboede Æer. Den seer ud, langt borte, som et

hoit Kæstel; thi den bestaaer af en rundtomkring steil Klippe, 100 Favne hoi. Et ved den rager en Drang, eller hoi og smal Klippe, op af Søen, hvoraf den har faaet Navn. Malmø kaldes den 4de og sidste De i Skagafjorden; hvilken er beboet: Den ligger i Milt uden for Hofdestrand, og der falder temmelig Sølhundefangst. Grimsø (hvor Smaabirk har været tilforn), ligger midt i Desfjorden, er temmelig stor og haver to Bøndergaarde. Den giver godt Græs, Sølhundefangst og Væderfugl. Flarø ligger ude ved Glogretæe, og er en god Fiskeplads: Der ere 4 Bøndergaarde; men 1755 bleve de ødelagde af Jordskælvet. Naar man kommer Huusevijs Davn forbi, seer man 3de Der: Den største er Lundey, hvor man fanger Søe-Papegøyer; der er godt Græs, og den 24 Dagslatte stor. Hver Dagslat er et Stykke paa 30 Favne i Firkant, og man regner Drangoens Græsmark paa 72 saadanne. Kort her oven for, uden for Manaa, ligger tvende Der, hvor Saar gaae ude og man fanger Papegøyer. Øster efter herfra findes adskillige smaa Der og Holme, der give god Mængde Æg og Væderuun. De østligste eller yderste af dem høre til Sodenæs Præstegaard. Grimsø er een af Landets fornemste og største Der, bekendt iblandt alle Søefarende. Den ligger herved 12 Mil ude i Havet fra Desfjorden, omtrent under samme Bredde som Cap de Nord, og er Kongens Eiendom, hørende til Desfjordens tvende Klostere, Mødrevælle og Munke-Ehveraa. For nærværende Tiid findes der 6 Gaarde; men for 60 Aar siden have der været langt flere. Der er skiont Fiskevær, hvorfor og Juddyggerne fra det faste Land fare aarlig derhen for at handle. Grimsøe haver sin egen Præst og Kirke; men Kalvet er et af de mindste i Island. Grunden er tildeels sandig, giver dog Græs til nogle Koer.

Indbyggerne leve i øvrigt af Søfugle, som salde der i Mængde, nemlig de 4 Arter af Bærgsfugle, Rysen, som bygger der for sig selv, og især Gillingen eller den store Procellaria, som i Norge kaldes *Savhest*. Den har saa overskudig Olie, endog i Maven; at den sprunder Tran, naar den er vreed eller bevæges hæftig. Naar Indbyggerne paa denne De have dræbt disse Fugle; ombinde de dem med en Snor for og bag, for at Olien ikke skal flyde bort. Gillingen speges og forvares til Vinteren, da den spiises til Torsfisk i Stedet for og i Mangel af Smør. Giædrene af Bugen, som ogsaa ere feede eller stærk fittede, bruges til at giøre Jid med iblandt andet Brændsel, hvilket maa give en slem Lugt. Paa Grimsøe findes kun saa Køer og Saar, selgelig kunne Indbyggerne ikke samle meget af Balde til daglig Drik; men i det Sted bruge de Saft og Extract af Cochlearia, hvilken voxer i Mængde paa Strandklipperne. De mænge denne Saft med deres Drifkevand, som de hente fra nogle i en sandig Grund gravede Brønde, hvis Vand derfor gjerne er uklart og stinkende; det skal endog tidt blive raadent, og dette meener man er Aarsag til den ubekjendte slemme Sygdom der hersker paa Den, og især angriber dem, som nyelig have sat sig der ned. Sygdommen skal være en Art af Hydrops: heele Legemet svulmer op, og tilsidst komme slemme Vylde ud, hvorved Mennesket seer ud som det havde Spedalskhed. En hoi Grad af Skiorbug saarer og samme Udseende: Lusten, Vandet, Grunden og Spiisningen paa Grimsøe giøre, at de Uvante læt kunne faae saadan Sygdom. Der er intet Raad herimod, uden at fløtte ind paa det faste Land, da de Syge som oftest naae deres Helbred igien; men bie de paa Den, doe de gjerne i det 3die Aar. Denne Sygdom skal dog ikke være smitsom. De Hollandske og andre Sifere,

Fiskere, som fiske her uden for, komme giærne til Grimsøe, thi her ere gode Ankergrunde. Indvaanerne tilhandle sig af dem de nødvendige Ting, saasom de selv ikkun meget sjelden komme til det faste Land med deres egne Baade. Paa den Hellige, som henved Aar 1025 havde i Sinde at foreene Island med Norge, stilledes en Gesandt til Island, og iblandt andet begjærede denne De til Forsøring; men nogle af de Ældste paa Althinget raadede derfra, frøgtende, at Kongen lettelig kunde holde der en Flode og Krigsfolk, der kunde være i Stand til at undertvinge heele Landet. Kolbens-Øe, som i Søe-Charterne kaldes Neven-Alint, ligger 12 Islandske Søe-Miile Norden for Grimsøe, og er tilforn bleven besøgt fra det faste Land, for at hente Søefugle og Søehunde derfra: begge Slags Dyr ere der ganske tamme, og Den vrimler af dem. Grunden skal være klipperig og uden Græs.

§. 701.

Fjældenes
og Bygdens
almindelige
Beskaffenhed.

Om de fornemste Bjerge er nyelig blevet talt (§. 698.). Nordlandets Fjæld-Lyn er heel vidtloftig, men ligger dog ikke saa meget høit, nemlig 2 til 3 Miile fra Bygden, og har derfor mangesteds store Beedemarker, hvor en Mængde Kvæg og Heste kunne gaae om Sommeren. Bjærgene ere overalt til Fjælds omkumlede ved Jordbrand, dog kjendeligst paa Risloveien, hvor de Reisende maae fare over vidtloftige Lava-Strækninger; samt paa de nordlige Fjælde imellem Badle-Thingoe og Muule-Spyseier, hvor nogle Bjerge have sprudet Ild for kort Tiid siden, hen ved 1730. Den Tiid vi reisde her over, lode vi paa mange Steder grave i Jorden, hvor den var bevoxen med Græs, Lyng og Moss; Arter, og funde da gierne vepelvis liggende Lag af Sten eller Sand, samt hvid og sort Pimpesten. I Bygden seer man mes-

get

get forskjellige Biærge; dog en Del af de ældste eller ærdeste: i Hunevands- Syssel er lave Biærge, men høiere, i Hegerens- Syssel. Vassdal, et heet Bygdelay, er ligesom indmuret med steile Biærge. Hialtedalen, Kjekkestrand og Hofdestrand, have ligedannede Biærge. Især er det Strandbiærg Lindastof, Westen til ved Skagsefjorden, beremt over heele Landet for Edelseene, gode Uter, og andre Besynderligheder; men da vi i Aaret 1755 besøgte dette Biærg, erfarede vi, at det ikke havde noget forud fremfor andre Biærge. De Forandringer, som der skede, af Quarzer, Chatebonier, Agater og smaa Crystaller, ansees kun af Indvaanerne for Edelseene (§. 569). Op til Dalene i Skagsefjorden ere Biærgene meer uordentlige og uensfynlig omtumlede. Både Syssel, saasom Øene og Spærse-Øal, har hele Fjærdde. Ehingør-Syssel derimod meest lave Fjærdde Bygder. Den beboede og Egne er temmelig smuk og græsrig overalt. Man finder der de samme Jordarter og Lag som Vester paa; men tykkere Lag af Madsjord, og Biærgsiderne længer op bevoxne med Uter.

Skredsfalde giøre ofte Skade paa Nordlandet, saasom ved Skagefiorden i Østerdalene, Norderaadal, og især have Batsdalens Indboanere følet bedrøvelige Værkninger deraf. Den sidste Gang skeede det: 1720, som forklares i Zorrebøw's tilføit. Efter, hvorhos tillige rettes de Feil, der ere i Andersons Beretning om samme. Men for 175 Aar siden, nemlig 1545, skeede paa dette samme Sted et endnu større Skredfald, som borttog den Bøndegaard Skidesfede, begravede 13 Menneſter, og forde et stort Stykke Land, nemlig Tunet af heimleste Gaard, ved Hiøsl: af den nedstyrtede See eller Vandflod fra Fjeldet (hvis Bredde

Skredfald og
Skredglær.
etc.

rebnede) bort fra den østlige Side; over til den anden Side af Dalen; og paa dette Stykke staaer nu en temmelig stien Bønde-gaard; kaldet Hinausar. Tilstræffelige Raad imod disse forstræffelige Tilfælde kan vel intet Menneske give; dog ville vi meddeele en Underretning, som kan have sin Nytte, i det mindste i Hensigt til almindelige Skredsfælde, som aarlig pleie at skee nær ved Gaarde og Græsmarker i Jesland. De nu værende Indbyggere sige, at der er intet Raad derimod; men det kommer deraf, at de have glemt denne og en Del andre vigtige Indretninger, som deres Forsfædre gjorde til Huusholdningens Understøttelse og Forbedring; jeg mener de Gamles Skredgiærder, som man endnu paa mange Steder seer Levninger af. Disse vare Muure opførte af Steene, først midt for den Viærg-Kløfte, som Skredsfaldet kom fra, hvor de 2de Vægge stodte sammen i en spids Vinkel, hvis Hjørne vendte op imod Kløften, og var meget tykt, og opført af store Steene. Den nederste Ende af disse 2de Vægge blev fortsat paa begge Sider med en krum Muur, der gik skraas op imod Viærgsiden igjennem. Den spidse Vinkel var heel tyk, grundmuuret inden i, og de krumme Vægge tykkere ved Enden af dens Sider, eller hvor crura boiedes. Disse Skredgiærder bleve aarlig giorte til Rette, og naar der faldt saa store og mange Klipper ned af et Viærg, at de odelagde et Stykke Jord eller Huuse, da forlode Forsfædrene ikke, eller nedlagde en Gaard derfor; men de anvendte endogsaa den skeedte Ulykke til deres Efterkommeres Sikkerhed; thi store Skredsfælde danne gierne en hoi og tyk Bakke ved Roden af Viærgene, og saadan en Bakke bestaaer af idel svære Klipper i Grunden: de øverste Klipper bleve da forte tilsammen, Bakken forhoiet eller hoiere opmuret i Midten, i den samme Form af Skredgiærde, som

som nylig blev beskrevet; saa at de fleeste saadanne Steders Beboere have fremdeles været fri for videre Skredsalde.

Biargenes Høide paa Nordlandet have vi ikke kundet fastsætte, uden efter Vieshnet, undtagne 3de Steder. Om Jisbiargene oven paa de hoi Høide midt i Landet kan man slutte af Besterjokelens Høide (S. 439.); ja det er ikke urimeligt, som nogle endskönt uden Vished, paastaar, at Baldjskel og de andre Jisbiærge høiest oppe, naae længer op i Lusten end Toppen af Sneesfiædet. Bygdens Biærge ere sædvanlig ikke høiere end hen ved 200 Favne; og de høieste, som Tindestolen, 2 til 300. Sygggebjærg kaldes et høit og steilt Strandfiæld i Thingoe. Syffel: Oven for eller op fra samme Bjærg gaaer en hoi Høidsfjæde, der fra Havet at regne stikker over 500 Favne i Høiden. I Aaret 1752 komme vi til dette Bjærg, og reisde derfra til Soes, til Nattsfare-Biiger, hvilke tilforn have været beboede. I Aaret 1755 maalede vi 2de Biærge paa Hofdestranden, ikke just for at viide deres Høide; men, siden de tillige vare lette at bestige, for at viide Barometerens Stigen og Falden i Lustens Løge, hvilket Forsøg vi forgiæves havde foretaget paa Besterjokelen Aaret tilforn (S. 429.), undtaget, saavidt med Sikkerhed kan sluttes af det samme og de efterfølgende Forsøge, hvor stor Forskiel der er i Nørgsolv-Støttens Falden ved et middelmaadig lavt og et overmaade høit Bjærg. Sædafiæll, oven for Hofdestranden, maalede vi først med Astrolabio, og befandt dets lodrette Høide over Havet 1372 Fodder Dansk Maal. Barometeren stod neder paa Slætten paa 28 Tomme og 6 Linier. Af Forstningen saldt Nørgsolvøet sagte, til vi havde naaet Halvparten af Biærgets Høide, da det efter Proportion saldt stærkere og stærkere, indtil vi havde den øverste Brink

af Viærget, hvor Instrumentet stod paa 27 Tommer 1 $\frac{1}{2}$ Linie, saa at den ganske Forskiel bliver 1 Tomme 4 $\frac{1}{2}$ Linie. Høfden, eller (som den i Landnama: Saga kaldes) Thordar: Høfde, er et Hoved eller særskilt Forbiærg, som tilforn har været en De, hvorfra det tilgrændsende Bygdslav har faaet Navn: Viærget, som er ganske steilt mod Søekanten, kan bestiges til Siderne. Her faldt Barometeren i alt 7 $\frac{1}{2}$ Linie, og Viærgets Høide, som vi maalede med en Snor, var 690 Fod. Den Forskiel var dog paa begge disse Forsøge, at da Instrumentet kom oven fra ned igien, stod det net op paa selsamme Høide som før, paa Høfden; men den Tid vi komme ned fra Høfdaflall, stod det paa Slækten en Linie høiere end før, da vi begyndte at gaar op paa Viærget. Dette skeede den 11 September (da det stærke Jordstælv var nyelig forbi). Kløkken 6 om Eftermiddagen, da Luften var klar, og endnu noget varm; Kløkken 8, da vi komme ned igien, var den bleven lidt koldere; men ellers var for Sandserne ingen Forandring skeet i Værelset. Alt Barometere faldt og stige lidt ved Afsejling af Kuld og Varme i en varm Stue, det er af de nyere Naturkyndige blevet anmærket, og Luften kunde gjerne være bleven lettere i sig selv om Aftensunden, endskiont man ikke mærkede det.

S. 703.

Floder og
første Søer.

Nordlandets Indvaanere have en langt større Mængde af Floder og stærke Søer end hine Vester paa. Rutesfiordsaar giver god Laxefangst, og Midsfiordsaaren endnu bedre, fordi de nærboende drive godt derpaa, og Naen fører større Mængde Vand. Op ad Videdalsaa, Vatabalsaa og Blanda (hvilken sidste Aae er den største i dette Syssel) gaar en Mængde Lax, som fanges af Indbyggerne. Herforuden findes her en snart utallig Mængde

Mængde af ferske Søer, hvor man har Overflodighed af Foreller, endskjønt denne Fangst mangesteds ikke nær drives, som den kun de, hvilket Syssels Folkemangel er tildeels Skyld i; dog fanges ikke nogensteds paa Landet saa jævnlig Lax og Foreller, som her: for Exempel, i den Søe paa Midfiords Hals, i Vesterhop og Midhop, 2de Søer i Videdalen, i Skiotet og Selgavatn i Batsdalen. Paa Skageheide, mellem Sysselerne, ere mangfoldige ferske Søer, som almindelig regnes for utallige, ligesom Derne i Bredefiorden, og de mange Steenheie i Batsdalen, hvilke de omtalte Skredfælde (S. 702.) have forarsaget. Skageheidens Søer ere fast alle suaa, dog findes Foreller i dem alle; men de fanges ikke, ligesom der ere andre flere Søer, som ingen have Nytte af. Hunevatn, den Søe, som Sysslet tager Navn af, ligger kort fra Thingore-Kloster. Paa Gaftheide imellem Videdal og Batsdal og heiest op til Fjælds paa Evedegre (en lang Fjældsvei imellem Hunevands-Syssel og Bergerfiorden) ligge adskillige fiskerige Søer, hvortil Indvaanerne fra begge Herreder fordm. søgte, endog om Vinteren, (ligesom man nu søger til Fiskeleier ved Strandkanten), og laae der i opbyggede Hytter, og om Foraar og Efterhøst i Tætte, da de med Naade og Garn fangede en stor Mængde Foreller. Ligeledes har man drevet denne Fangst paa Arnarvats-Svide. Den fangede Fisk blev efterhaanden fort til Bygden, og deels nedsaltet, deels forterret fersk. Laxaa i Svartaardal (den østligste Bygd i Sysslet) giver Laxen fangst. Skagefiorden har færre Floder og Søer. Herredovandene kaldes en af Islands største Elve: den fører hvidagtigt Jøfelsvand, kaldes Jøfelsaa paa Fjældene, og har sin Oprindelse i Jøfs-Jøfel. Man veed at en stor Mængde af Lax gaar op i

denne Elv; men Indbyggerne ere ligesaa lidet i Stand til at fange den her, som i Hvidaaerne og andre Landets største Floder. Sæl hundene, som holde sig i stor Mængde i Udlobet af Herredsvandene, fange Lænen meget, men blive igien fangede af Indvaanerne: I de Elve, der falde i Herredsvandene, findes dog Fisk; saadanne ere, often til Norderaa og vesten til Vesteraa, Tungaa og Staderaa, nær ved Reinestad-Kloster. Læt ved Havet give de tvende ferske Søer ved Siaafarborg vesten for Herredsvandene, og Sødevatn oven for Therderhesøe, ret flon Forellesfangst: ligeledes Glioten, det østligste og største Bygdelay i Ekagefiords Syssel. I Vester-Glioten er Flokedalsvatn, som giver Foreller, og Naen, som kommer derfra, Læ og Orreder: ligeledes ere i Øster-Glioten, den Elv Gliotaa, og en fersk Sø Miklavatn, som den danner oven for sit Udlob, fiskeriige. Badle-Syssel har, i Olafsfjord, en fiskeriig Sø; som er en stor Mærkværdighed ikke alene for Island, men og for Rigerne; thi man finder i den naturaliserte Havfiske, Torst, Kollier, Hellesthyndre og Røkker, alt af middelmaadig Størrelse. Indbyggerne gjøre Huller paa Isen for deres Fiskestænger, og fange de omtalte Fiske paa Meedefroge: de smage søde og behagelige, dog ikke som Havfiske af samme Arter. Foreller falde her ogsaa, og fanges meest om Foraaret. Søen er een Miil lang, og stilles fra Stranden kun ved et smalt Rev af opkastet Møl eller Strandsteene, hvorigiennem Elven, som kommer ned fra Dalen, og rinder igiennem samme Søe, haver brækket et smalt Udlob til Stranden. Det synes klart nok, at Fjorden har tilforn gaaet saa dybt ind i Landet, som Søen nu gaaer, og er ved en stærk Brænding, Jordstælv eller anden voldsom Omvæltelse, afskaaen eller deelt i to Deele ved ovennævnte Rev; Havets

Havets Giske ere da blevene indsluttede; og ved den sagte aftagende og formedelt Elvens Siememfart opløste Saltbed, meer og meer vante til det søde Vand. Alle de fornævnte Giske fanges ogsaa i Havet eller Fjorden her uden for. I Svarferdalsaa findes Ørreder. Sælhundene søge og her op til Landet i Mængde, for at spise disse Giske, ved hvilken Leilighed Indvaanerne fange dem. Sørgaa, nær ved Modrevall-Kloster, er en temmelig stor Elv, i hvis Udlob Sælhundene ogsaa fanges. Ryastardaraa, som deeler Østfjords-Bygden i tvende Deele, er tillige med Svarferdalsaa den største Elv i Syssel: den tager ogsaa andre mindre Aarer til sig, og har ver Giske. Thingoe-Syssel har endeei flionne Elve og ferke Søer, som ere fiskerige. Sniofkaa falder i Østfjorden og giver Lærefangst. Skialfandefiot, er den største Elv i denne Egn, hyer baade Læp og Ørreder gaar til; men især er her en Mængde af Sælhundene, som gaar op i Udlobet. Læpaa er den anden største Elv, hvori der falder den flionneste Lærefangst. Begge disse Elve have, ligesom heele Egnen, smeltede Klipper i Grunden, og disse mørke Klipper, samt de Gialestyder, der jævnt findes imellem dem, ere det, som Læpen meest søger. De fornemste ferke Søer ere Liosavatn, kørt fra Skialfandefiot, og den, der horer til Huusevig, hvor Eierne tilforn have holdt Giskebaad og fanger Foreller. En liden Elv i Reykedal, kørt fra Grenjedstads Præstegaard, er derfor mærkverdigg, at den opvarmes ved en heed Kilde, og at Forellerne, som løbe her op til, blive saa overmaade feede i dette varme Vand, at somme af de Nærboende neppe kunne spise den. I det Bygdelaav Kildehverse, og paa Kysterne der østen for, indtil Langenæs, findes endeei ferke Søer og Elve, der give Foreller, Indbyggernes til Livs Ophold. Iblandt Elvene er Iskelsaa i Østfjord den aller-

allerførste i Syfflet, og i den fanges Sælhundede med Garn. Denne Elv kommer fra de store Jisbiærge norden for Hofs-Jofel, som hore til Osterlandets Fjælde. Den falder over Modredals-Ørken, og har der et Færgested. Nybautn, eller Nygvandet, er den allerførneste ferste Søe paa Nordlandet, ja paa heele Jesland, i Henseende til dens Forellesfangst, som drives her bader end paa noget andet Sted; og tillige er denne Søe bleven saa meget bekjendt formedest de forfækkelige Jordbrande, som her ere udbrudte. Indbyggerne som boe omkring Søen, og udgjøre eet Præstegjæld, leve og have levet fra de første Tider, alene af Forellesfangst, og ikke søgt til Havkantens Fiskelær, eller kjøbt Fisk derfra. Hver Bønde har sin Vaad og en halv Snees Sættegarn, 10, 20 til 30 Favne lange, som han selv lader spinde af Hamp meget fine. Blidere om dette mærkværdige Sted skal blive nærdet i Egnens særdeles Beskrivelse. Den nys nævnte Laxaa har sin Oprindelse fra denne Søe.

Hverer og varme Bæde.

§. 704.

Reykjæver og
Reykjælag.

3 Hunevands-Syffel findes 2de fra første Tild af bekjendte varme Brønde. Den første, ved Naavn Reykjæver, ved Rute-fjord. Fahrenheits Thermometer steg i den, i 3 Minuter, til den 204 Grad. Bore Folk havde bragt et stort Stykke fersk Lax fra Rutesfjords-Naen derhen; man hængde det paa en Riep, der blev lagt over Hverebredden, saa at det var under Vandet, hvor det blev kaagt i en Tild af 8 Minuter, og havde en behagelig Smag: det var ogsaa langt mørere, end naar Lax kaages over Rjøffen-Tid. Hverens Vand er meget læt, klart og velsmagende. De tvende

Reykjælag.

Messing-Hydrometra, som os vare blevne tilsendte fra Societetet, synkede heri paa Diebliffet. Af de hvide Accretis Thermarum findes her noget paa Bredderne. Kildens Vind er en af blaåt Leet hardest Hælde, hvori smaa Ries-Åbner lade sig til Syn. Fra Hverens rinder en siden varm Bæk, og i Bredderne af samme findes Lag af en hvid, meget fin og mager, Jordart, som Indvaanerne kalde *Pieturs-Mold*, det er St. Peders Muld eller Støv-jord. Kort herfra er et gammelt Hversted, hvor Jordbranden haver tillige med Vandet frembragt nogle Hælder, der ere haardt sammenbage, ovenpaa bleeghvide og opfyldte af frennede Smaasteene, Urter og Stilke af Krat og Urter; neden under ere Hældernes sorte, smelte og udbrændte, som en anden Lava. *Reykes laug*, i Midfjord, er det andet fra Landets første Beboelses Tid bekiendte Badsted; nær ved Gaarden *Reykium*, hvor den Skedge boede, der aabnede Kong Rolf Krages Hoi i Sælland, og fik der det berømte Sværd Skofning (see *Arngr. Jóna Spec. Isl. p. 54*). Badets Vand er meget klart, uden al Smag, og saa læt, at det ene Hydrometrum sank deri til Bunds; det andet sank ikke ganske, gik dog ned over 326, hvilket var den højeste Grad, som der var tegnet paa. De Nærboende bade sig deri end i Dag, ligesom i forrige Tider. Naar Varmen i Badet tiltager, antage Gaardens Folk det for et vist Tegn, at Veirliget vil forandre sig, til Regn, endskjønt Lusten paa den Tid er ganske klar. Samme Anmærkning er bekiendt, og gjælder om de fleste Hverer i Island (see *L. Olavii Enarr. p. 93*). En anden mindre bekiendt *Reykes laug* findes i dette Eyfel, imellem Øvislerne eller *Watusdals* Aaens Udlob og Blanda. Badstedet staaer paa en moradfig Grund, hvor man, strax under den varme Jordkorppe, finder et

1½ Fod tykt Lag af Sorta (§. 230.); og derunder igien den røde jærnoktrige Myrefjord.

§. 705.

Heede Kil-
der i Skage-
fiorden.

Paa den Gaard Reykium i Skagefiorden (hvoraf Reykestrand har faaet Navn) findes et sundt Bad, og der uden for i Stranden springer op en varm Kilde, hvis Bredder ere tørre ved største Springs-Ebbe (§. 558.). Vallnalaug er ogsaa et bekiendt Bad i den gamle Historie, fort fra det gamle Thingsted paa Hægrenæs, en De midt i Skagefiordens inderste Viig, som Herredens vandene danne ved deres 2de Arme. Reykiarholl i Holms Kirkes Sogn, imellem Tungeaa og næstbenævnte Flod, er en Klippe, som en middelmaadig varm Kilde springer op af: Bredderne ere overtrukne med en hvid Skorpe. Endnu eet Bad her i Nærøveelsen er paa Reykium, Annes Kirke for Mælefjæld. Dets Vand er klart og sundt, og Badet bruges af Gaardens Opsiddere. I Hjalteidal, fort fra Bispestolen, er endnu een Reykelaug, et bekiendt varmt Bad, som bruges af Dalens Indvaanere. Reykiarholl, en anden Klippe med dette Navn, som har et heedt Vands spring og nogle smaa Kilder i Nærøveelsen, ligger i Slettehlid, Østen for Hofdestrand. Den tredie og fornemste Reykiarholl staaer i Østerfioten, og er en artig 30 Fod høj og rundagtig Klippe, af hvilken jævnlig opstaaer Røg og heede Dampe. Midt oven i Klippen seer man en liden Kilde, som af nogle Huller paa Bunden giver et klart og velsmagende, maadelig heedt Vand; der maae ventelig falde, fra det nærliggende Viærg, en Bæk under Jorden, som forsyner denne Kilde.

1780. 10. 14. 1781.

1782. 10. 14. 1783.

606 11

10 15

§. 706.



Den Brölande Hoi paa Flueravalle.



§. 706.

Hvørevælle er et i Island bekiendt Sted, som ligger høiest ^{Reisen til} oppe paa Riosfiædet, vesten for Veien, og kan derfor heller reg- ^{Hvørevælle.} nes til Skagefiorden, end til Sonderlandet. Vi havde tidt hørt meget fortælle om dette underlige Sted, førend vi komme til at reise; men dette Slags Underretninger vare ikke tilstrækkelige, fordi ingen uden Hyrder, og de der samle Fiældgræs, vare komne derhen, og disse dog kun siælden; thi Eggen er, formedelst Lava-Strækinger og Moradser, besværlig at komme til. Det fortaaldes, at man langt borte hørde en forfærdelig Brølen fra Hvørevælle, med flere forunderlige Ting. Vi vilde derfor endelig besøge dette Sted, i Maret 1752, da vi komme fra Nordlandet. Den 18 September, da vi reisde her forbi, saae vi langt borte en stærk Røg, der steg høit op i Luften. Vi sluttede, at denne Røg maatte komme fra Hvørevælle, og siden Bæret var klart og smukt, gjorde vi Forsøg paa at komme derhen. Os syntes Stedet maatte være omtrent en Miil borte. Da vi vare paa en Fierdingveis nær, saae vi Røgen stige op fra 3de adskilte Steder, og hørde et slags Bulder langt borte, som noget lignede en Løves Brølen, men havde derhos et slags Hvidslen, der var meget giennemtrængende for vore Øren. Hestene spidsede og Ørene, ja vi kunde ikke saae dem siige frem, men de vilde idelig vende tilbage: Til sidst maatte vi stige af, lade dem blive staaende noget borte, og gaae til Fods til Stedet. Det som først faldt i Øinene, var en hvid rundagtig Hei, hvor Røgen trængede ud af 3de smale og krogede Abninger, med saadan en Kraft, at den foromtalte hvidslende Brølen blev foraarsaget derved. Disse Hulter vare dog udvendig kun 2 Finger breede i Diameter, og deres Bredder isprængte med rød, hvid og grøn Farve.

El II 2

Vi

Vi undersøgte disse Huller med bøielige Pilestilke, men kunde ingen Dei komme, fordi Røgens Gange vare saa krogede. Naar man kastede smaa Steene ned i dem, sprudedes de strax op igien, og ligeledes bleve de flade Steene, som man lagde derover, bortførte ved Luftens Kraft. Naar vi stode nær ved, kunde vi intet Ord høre, endskjønt vi raabte hinanden i Ørene. Hverevælle er ellers en stor græsrig Dal, som kunde synes beboelig, hvis den ikke laae saa hoit oppe, norden til ved Baldjokel. Esvaner svømmede paa en liden fersk Sø, kort fra den brølende Hoi; vi saae og Joreller i en Bæk i Nærvaelsen. Man finder her Fjældgræs i Mængde, rundt omkring. Østen og sønden for støder til Dalen den store Lava-Strækning Kislhraun, og norden og østen for hæder Egnen nedad til Nordlands-Bygden, især til Skagefiorden og Hunevands-Øyfel. I Grunden er her, Vinter og Sommer, en stærk underjordisk Hæde, hvorfor den ikke kan fryse til. Man seer kort fra Hoiene trende store Høver, som ere stærk steengjørende: den mellemste af dem kaager allerhæftigst, og kaster Vandet 3 Alne hoit i Væiret. Den nordligste kaager mindst op, og ligger 8 Favne fra den mellemste; men den sydligste kun 2 Favne; og disse staae i noie Jorreening sammen, saa at naar den eene spruder Vandet hæftigst er den anden stille, og saa tværtimod. Det besynderligste og egne ved dette Vand, fremfor alle andre kaagende Kilder i Island, er dette, at der vøyer, ud over Vandet fra Bredderne, en meget fin og haard hvidglimsende Materie, som ligner Porcellain, og seer ud langt borte, som der var frusnen tynd Is noget ud paa Vandet. Herforuden seer man i denne Egn mange gamle Høvers steder, som Vandet har forladt, rimeligt efterat det ved sin steengjørende Kraft haver efterhaanden bygget en Hvelving over Bron-

den,

den, og maattet søge Ildfart paa et andet Sted. Her sees de sæd-
vanlige Forandringer af Petrefactis Tophaceis og Bolis Ther-
marum, med hvide, blaa-graa, røde og gule Farver. Her træf-
fes ogsaa en Forandring af bleeg hvidagtig Tophus, der er fin;
friabel og sammensat af eensdannede Partikler; den falder i hori-
zontale tynde Lag, og er meget tjenlig til at skure alle slags Metals-
ter. Hvor Graunet stoder til dette Sted, er en dyb Sprække i
Grunden, hvorfra ogsaa opstiger Røg, hvorved de sorte Klippe-
bredder ere bleve farvede med rodt eller smaa Deele af den om-
talte Bolo. Læseren behager at sammenligne dette med hvad før er
berettet om Krablande (§. 556.). Hvis de gamle Græske og Latin-
ske Poeter havde kiendt dette Sted, havde de vist nok bygget her
en sælles Boetis for Æolus og Vulcanus. Uimodsigelig er Hveres-
vælle et af Naturens artigste og forundringsværdigste Kunststykker
i Jesland. Her sees Levninger af et stort Huus, hvori man me-
ner at Noverne have haft deres Tilhold i forrige Tider, hvilket dog
ikke er troeligt, siden Stedet er aabent paa alle Kanter. Tilførn
haver man kaldt denne Egn Zwinveriadale, og især det Sted,
hvor Hvererne ligge, Røkevælle. Her falder Mængde af stærk-
tede Lava-Hælder, af hvilke vi opstabilede en Værde eller Pyrami-
de, 5 Alne høj, nogle Skride fra Brokchoien. Dette berettes
aleene for at vise Lydens giennemtrængende Magt; thi til vor For-
undring, igientog bemældte Værde den Straalen og Hvinen, der
kom ud af Høien.

§. 707.

Ved de heede Brønde i Vadsø-Syssel er ikke noget besyn-
derlig rart. Østen til ved Olasfiord sees man et Bad, hvorfra ^{heede Brøn-}
den Gialdveit-Keykeide har faaet Navn. Dette Bad kunde
Syssel.

gløres større, og brugeligere. Laugaland i Hergaa-Dalen, og Kristnæs ved Desfjorden, have ogsaa varmt Vand; Men paa Strafnegil Præstegaard er byggt det bedste Bad i dette Syssel, og det bruges meget af de Nærboende.

§. 708.

Orehver,
Badstuehvor
og flere.

I Thingoe-Syssel findes paa nogle Steder varme Vand, og andre forfærdelig heede, hvor der er Jid i Jorden, som i de tvende Egne, ved Myvatn og nær ved den Gaard Theste-Reykium, hvor Heeden driver op af en leeragtig Grund; men af de kaagheede reene Vand, som fortjene Reykdals-Hvererne, og iblandt dem Orehver, fornemmelig at nævnes. Disse Hverer staae 3 i Rad fra N. til S. Den første af dem, eller den sydligste, haver 2de Nabninger, ud af hvilke Vandet sprudes vopelviis 1 til 2 Alne høit: dens Opkaag varer 1 til 2 Minuter, og naar den haver udraiset, hviler den sig net op lige saa længe. Brøndens Dybhed har 7½ Al. Vi søgte ved Lodder at træffe de smaa Huller paa Bunden, igiennem hvilke Vandet drives op af Varmen; men forgæves; rimeligst ere disse Huller krogede. Orehver ligger henved 20 Skridt herfra, og er i Midten. Indbyggernes siige Brønden har faaet sit Navn deraf, at en Ore er nedfalden i den, sunken og opstidt igjen af forbeholdte sydligste Hver; men det er troeligere, at dens Lyd, som ligner noget en Ores Brolen, har været Oprindelse til Navnet. Dens Bassin er dannet som en spændt Klokke: Nabningen neder ved Vandet er over 6 Al. i Giennemsnidt; men oven til imellem Bredderne langt bredere; da den sidstbenævnte Hvers tvende Nabninger ikke overgaae 1 Al. Orehveren spruder Vandet 4 Alne høit i 1 Minut, indeil den er bleven ½ Al. til 3 Kvarteer lavere. Siden voxer Vandet til i Stilhed, 2 til 3 Minuter, til det har faaet

faaet sin sædvanlige Hvide, da man horer en mørk Dundren, lige som nogle Bøffeskud, neder i Grunden, og i det samme begynder Vandet med en stor Alarm at opløstes og skydes i Væiret. Den nordligste Brønd kaldes Badstuehver: den er dobbelt saa breed, som Drehyeren, og ligger 10 Skridt fra samme. Den er langt dybere end de andre to, og Vandet kaager almindeligst ikke op; men naar der er Søndenvind, med Væst og Regn, i Bente, skal den rase langt hæftigere end de andre, og skyde Vandet op, til nogle Favnes Hvide. Kort her norden for er endnu en liden heed Brønd, som Indvaanerne bruge til at boie Splitter i; thi Træet bliver saa blødt i dette Vand, at hvis det ligger for længe, gienemblødes det og udkaages, til at ders Feedine og Fasthed er borte; ja ikkun Trævlerne tilbage, som ingen Fremmed skulde antage for Træe: Farven er borte: Træet er hvidt, blaaagtigt, og noget giennemsigtigt. Ved første Diekast ligner det meest hvid Asbest, og ellers, naar Trævlerne ere løsneede fra hinanden, skulde man tænke det var hvid Silfverraad. Saadan besynderlig Forvandling er desto meer værd at lægge Mærke til, siden det just er en saaledes bereedet Materie, som det strengjørende heede Vand harder, eller indtager med Particulis tophaceis, og saaledes er det beskaaffent med flere Hverernes Petrefacta. Vi mælde ellers herom meest i den Antedning, at vi virkelig funde saadan en Materie ved en af Reyfedsals-Overerne. Den eene trættede imod den anden, at det ikke var Træe, men noget andet, ganske ubekjendt, indeil vi funde et Stykke, hvoraf Halvdeelen havde ligget neder i Vandet; men den anden halve Deel var usorandret. En halv Tierdingvejs herfra, og paa den anden Side i Dalen, er et varmt Bad i Reyfaaen; hvor de overmaade seede Foreller søge til (§. 703.).

Driffe.

Drifkevand have Nordlandets Indbyggere meget godt, og ellers alle de Forandringer deraf, som i Forveien ere bleven opregneede (§. 185.).

Lusten og Værliget.

§. 709.

Værliget
i Almindelig-
hed.

Paa Nordlandet er denne Hovedforskiel i Værliget bekiendt, at formedelst de høie og vidtloftige Fjælde, der ligge imellem det og Sønderkanten, føre de nordlige Vinde derhen, fra Havet, ikke alene Blæst og Kuld, men og tykke Skyer, Regn og Sne, endogsaa om Sommeren; da de derimod give klart Værlig sønder paa, og endskiøndt de ere kolde, saa blæser det der kun stærken, men der er ofter en sagte Fjældgale, og ganske stille af N. og NØ. Hvorimod den sydlige Vind, som paa denne Kant, der ligger imod Havet, bringer med sig en sky og fugtig Lust, med vedvarende Regn, er om Sommeren baade klar og mild for Nordlandets Indbyggere; dog de undtagne, der boe yderst, saasom de østligste Folk norden paa, hvilke have sammenslags Værlig som de i Østerrors deie: de i Rutefford, sammenslags, som i de nordlige Vestfforde; o. s. v. Her bør ogsaa anmærkes, at mangesteds paa Landet rette Folk dem efter Compasser, men regne derhos ikke Misvisningen, hvorfor de ikke kolle overeens om Vindenes Navne; m. v. Der gives ogsaa Undtagelser i Værligets almindelige Regler, hvor een eller anden Gaard eller Bygdelaad har særdeles Veliggenhed, staaer i Skyt under hote Fjælde, hvor Værligets Nabning vender saa og saa; m. v. Det som blev maeldt om Søndervinden, forholder sig vel saaledes i Almindelighed; men denne Uleilighed have dog Nordlandets og især Vestffordens Indvaanere af den, naar den blæser stærkt,

stærkt, og allerhelst naar Blæsten er sydøstlig, at de faae Sandfog ned i Dalene, af Gruus og Aske fra Kioien, Sprengesand og Drovverne, eller de østlige Fjæld-Ørkener; thi disse uhyre Fjælde ere ikke steile eller afbrudte, men sagte hældende ned ad til Norder-Vygdten. Derimod have disse Folk stor Nytte af denne Beliggenhed; thi de haarde nordlige Vinde indsluttes ikke hos dem, men strøge seir op til Fjælds, hvor Fjeldbjergene trække Skyer, Regn og Sne til sig (§. 435.); derimod, hvis de havde de steile Fjælde og Fjeldbjerge nær ved Vygdten, beholdte de længer hos dem det fugtige og kolde Væir, ligesom det skeer paa Hornstrandene, hvor Fjældene, og især Orange-Fokel, ere saa nær ved Havet. Endnu en anden betydelig Fordeel haver Nordlandet af denne Vygdens og Fjældenes Beliggenhed; nemlig at Jordsoøren, med dens Græs og Ulter, kan staae sig langt bæder end mange andre Steder, hvor Grunden er opreven og ødelagt af de vedholdende skarpe og staaende Vinde. Hvad der ellers er blevet berettet om Land- og Hav-Vindenes Natur og deres Virkninger paa Jordkorpren, især i det næst foregaaende Stykke, det kan komme overens og bestaae med alt dette (§. 561). De af Luftens Skarphed og Vindenes Hæftighed forædte eller udhullede Klipper, seer man her ikke saa almindelig, som sønder og vester paa. Tegn paa eller Virkninger af de stadige Vindene (Tempestates statae), træffer man heller ikke almindelig paa Nordlandet i Vygdten. (Vi undtage, som før blev sagt, det østligste Stykke af Thingøe Syssel, og især de Vygde, der ligge nær ved Ørken, det ere de Sandstrækninger til Fjælds, der kaldes Myvands, Mødredals, og Gols-Ørøve ic.). Men derimod til Fjælds, hvor der er Gronsoør, Lyngheder og Mosstrækninger, seer man tit disse Kiendetegn. I de nordlige Svartaa-Buger

saae vi dem meget tydelige, da vi 1752 drog over Kiofveien tilbage fra Nordlandet.

§. 710.

Seede og
Kulde.

Angaaende Seede og Kulde have vi just ikke saadanne Efterretninger, som kunne viise hvor stor Forskiellen er her og paa Sonderlandet; men saavidt man kan slutte af de thermometriske Observationer, som vi et Par Aar lode holde i Hunevands-Syssel, er den ikke betydelig. Hr. Magnus Petersen, en Præst, som for nærværende Tid har et Kald paa Skagestrand, meddelte os den Dagbog, han havde holdt over Bærliget paa Nordlandet, især i Vadle-Syssel, fra 1734 til 1757 den 1 Julii. I bemærkede Dagbog ere Vindene ikke antegnede; ellers har man overalt sammeslags Omvevlinger, som see paa Vesterlandet. Om Vinteren har der tidt været ret mildt, godt og stadigt Veir, og om Sommeren stærk Varme. I Landets Aarbøger anføres ogsaa undertiden usædvanlig milde Vintere og Foraar paa Nordlandet, f. Ex. Aaret 1624. Men altid, naar den Gronlandske Jis haver besøgt Landet, har der været en stor Elendighed norder paa. Hvilke Uleiligheder denne Jis bringer med sig, baade haarde Aaringer og andet meere, er nævnt i det sidste Stykke (§. 645). Og det er Indbyggernes endnu i frisk Minde, hvortledes den i næstafvigte haarde Aar gjorde Sommeren til Vinter paa Nordlandet. Forbemærkede Præst viiser i den Henseende i Slutningen af hans Dagbog, at 1757, sidst i Maj og først i Junii-Maaned, var endnu paa Skagestranden klingrende Frost ved Middags-Tider, endskjønt Solen skinne, og ellers en tyk Lust, Sne, og giennemtrængende Kulde, og at der den Tid intet Græs var kommet op af Jorden. Dog var Aaret tilforn endnu haardere, med stærk Frost og Sne iblandt.

i Julii

i Juli: og August-Maaneder. Den 26 Junii faldt Sneen i 36 landst Alen tyk; alligevel vorede dog Græsset, endog under Sneen, sidst i denne Maaned. Indvaanerne vilde have slaaet det først i August-Maaned og derefter, men kunde ikke, for Sneens Skyld, indtil den 25 Aug., da Hav-Risen først drev fra Landet, og strax derpaa kom Torffen paa Videne og Læren begyndte at gaae op i Elvene. I Aaret 1753 og 1754 var saadan en forfærdelig Vinter, som ingen kunde mindes, paa Nordlandet, da og den største Deel af Indvaanernes Creature omkomme. De levende Heste aade de døde med Hud og Haar: de gnavede Tommeret i Staldene, samt Jordbær og alt hvad dem forekom. Gaarene aade Ulden af hinanden, og ligeledes Tommeret. Jorden revnede af Frost, og dette ikke alene nord paa, men ogsaa mange andre Steder. 1752, da vi reisde over Grasdalene, (et Sted paa Fiældene, imellem Sønder- og Nord-Landet), funde vi, til vor største Forundring, Vintersprækker hist og her i Grunden sammesteds, som vare over 40 Favne i Længden, med mange Tværsprækker; men det er ellers ikke saa meget at undre paa, at Frosten virker saa hæftig her oppe, naar den gjør det i Bygden. Dog er dette at mærke om Foraars-Værligt paa Nordlandet, at saasom Vinden blæser gjærne østlig, det er at sige, N., O. og S.O., paa den Tiid af Aaret, og disse Vinde ere kolde og skarpe, saa er der tidt Kuld og Blæst, med Frost og Sne, ved Søekanten og paa Næssene i Hunevands-Spyss, samt Skagefiord og Desfiord, naar der er stille, og, formedelt Solens virkende Kraft, mildt Værligt oppe i Dalene, hvor Bygden er i Skiul, og Bjærgklipperne samle Solens Varme, og flyde den fra sig ned paa Græsjorden.

§. 711.

Lufthændelser

Lufthændelser sees tidt paa Nordlandet, især Lynild og andre ildagtige Phænomena, der komme fra de store Isfjeler midt i Landet, og andre ildsprudende Viærge. Lufsten er ganske rød, som den var fuld af Røg, og undertiden sees man Ildkloder og Visker, af adskillig og uvis Dannelse, at flydes op og fare fra eet Sted til andet. 1755, sidst i September og først i October, bleve nogle Mænd nord paa, meest i Hunevands-Syssel, saadan en Røg vare i Lufsten, og den haver vist nok været en Forvarsel for Katlegiaa, forend den for Alvor brækkede løs, hvilket skedde midt i October. Jordstælvet, som heele Nordlandet følede samme Aar, gik foran den 11 September. Vi vare paa Hofestrand samme Tid. Klokker 8 Fornmiddag, komme de første Stød, 5 til 6 i Tallet; men da Klokker var ikke fuldt 9 de andre og hæftigste; først hørde man i Lufsten en susende Lyd, og derpaa begyndte Grunden at røres, først med svære og langsomme Hævelser, dernæst med en hæftig og forvirret Rystelse, da Tættet vi laae i, hoppede og Jorden løstede sig op ligesom belgevils: i det samme hørde vi en forfærdelig Bulder, og da vi derover sprunget ud af Tættet, vare alle Viærgene stærk og nærfkult med Taage; af Viærgene komme Skredsalde overalt; store Klipper fulde deels ned, deels revnede de. Paa den anden Side af Skagefjorden, henvend 3 Mille borte, saae vi hvor Søen sprudede Blandet heit op i Lufsten, og dette gjorde de nedfaldende Steene fra den Strækning af Strandklipper, som kaldes Ketubiærg, paa Skagen. Paa Malmoe og Drangoe revnede Klipperne og fulde ned i Stranden, og især paa denne sidste De gjorde Jordstælvets Skade, ved at odelægge Viærgfuglenes Tilholdssteder. Thorderhofde, der, ligesom bemældte Der, bestaaer af Sandsteen, miste

de

de ogsaa store Stykker og fik dybe Sprækker: vi maalede een oven paa Høfden, 1 Fod breed. I Hunevands Syffel var dette Jordstykke ikke nær saa hæftigt; men derimod often for os hæftigere nord ad lige til Huusevig, hvor det var allerstærkest. Det var dog oien-synligen Guds Forsyn at takke, at intet Menneske kom til Skade, da Skredene dog allevegne ligesom strømmevæis fulde ned til Bygden fra Fjældene, og man kunde, for Stovtaage, ikke see hvad Dei de nedfaldende Klipper toge. I Flioten bleve nogle ridende Folk kastede af Hestene: Paa Flatøe bleve 4 Gaarde ødelagde, Huusene fulde ned, og Bondernes samlede Vinter-Forraad blev fordervet. Jordstykkelets Bevægelse gik fra Øster til Vester, i Havet uden om Landet, først til Næssene og saa ind i Landet. Dette har man tydeligst mærket i Siglefjorden, som er smal og har høie stejle Blærge paa begge Sider. Præsten paa dette Sted sølede samme Tid paa en Vaad over Fjorden: Han var midt paa Fjorden, da han hørde en stærk Lyd ligesom af en Hvirvelvind: i det samme standsede Vaaden, blev klemt og oien-synlig sammmentrykket af Bølgerne fra begge Sider, og derhos rykket lidet ned: derpaa saae han Røgen staae op fra Fjældpyntene, og tillige med Skredfaldene gaae ind ad Fjorden til Borten. Fiskerne fra Siglefjord og nærliggende Steder, sølede paa Søen samme Dyrkninger: nu vilde deres Vaade ligesom sonderlides, og nu igien trykkes sammen. Paa Grimsøe bevægedes Grunden saa stærkt, at Huusene komme af Lave og store Stykker af Klipperne ved Stranden fulde ned, hvorved de arme Indbyggere toge stor Skade, da endel af deres Eeglear-Hylder og Fugle-Klipperne fulde ned i Stranden. Det sidste Tilfælde klagede de meest over, thi Fuglen kan ikke mange Aar efter bygge paa slige Steder: Klipperne maae udvires i Fjorveien,

det er, blive mere udvendig af Lusten eller de skarpe Vinde, før end Viærgsuglen kan udhugge sig med Næbbet beg' emme Nædesteder. Denne Fortællning viiser da, at hvis dette Jordstykke er kommet fra Katlegiaa, er det gaaet først i Nord til Badle-Heide, og derpaa lidet affides til Huusevig og Soekysten derimellem; thi ved Myvand, og der østen for, blev man ikke dette Jordstykke var. Øster, Sønder, og Vester-Landet vare ogsaa fri. De efterfølgende Dage fornam man ogsaa til Rystelser nord paa. Den 12 September sex Gange; den 13. fire Gange; den 14. en Gang; den 15. to Gange temmelig stærk; den 16. en Gang; og endelig sidste Gang den 24 Sept. Imidlertid faldt den 18 Sept. over Nordlandet, især Desfiords, og Hegrenæs's Sysseler, Myster (§. 15.), eller et slags Støvtaage, som var ullen den, der pleier at komme til Sønderlandet, eller andre Steder, fra de øde Fjælde. Dette Myster kommer ellers med stærk Blæst; men nu var kun en liden østlig Kuling, og Taagen var rødagtig; den kom ind i hver Fiord, og oven over var Lusten klar. Denne Taage forde skarpt dog fint Støv med sig, hvilket man fornam paa Ansigtet og især i Øinene. Man kunde falde paa den Tanke, at der har været Jd løs øster i Havet; thi med saadan en Havbrand følger ogsaa Støvtaage. Lopte Elldur eller Luft-Jld, kaldes i det gamle og endnu brugelige Islandske Sprog den Lynild, som tænder an og gior Skade, som tit skeer i andre Lande. I Island træffer det meest ind paa de Steder, hvor der er Jld i Jorden, eller Vulcaniske Viærge, hvor paa nogle Exempler skulle blive fremførte i de efterfølgende Stykker. Torden høres ogsaa paa slige Steder. Paa Nordlandet er det især anmærket, at det tordnede og lignede usædvanlig om Sommeren 1718, og paa Briamonæs, en Gaard og Odde ved Myvand,

fløg

fog Jorden et Menneſke ihjel den 11 Junii, endſkiont man, paa Legemet, fandt ingen Tegn dertil. En Pige tød hos faldt til Jorden, og et Stykke deraf ſulde trende ridende Mandſperſoner af Heſtene; dog komme baade de og Pigen til Rette igien. Her er overalt Heede og Gid i Jorden, og deſuden Mængde af Svovel og ſeede Jordarter, mængede med Vitriol og Alum.

Om Jordarterne.

§. 712.

De ſædvanlige, ſom i de forrige Stykker (§. 564. 2c.) er blevet talt om, findes og paa Nordlandet. Alſ den ſorte gode ^{fine leeragtige Jordarter iſær.} Vættejord er jævnlig tykke Lag i Bygden, og nær ved Bygden i Gårdſiderne. Om den ſorte Jordart ved et varmt Bad i Hunevands Syſſel er før berettet (§. 704.). De finere leeragtige Jordarter ere følgende: a) *Pieturs-Mold*, Terra Apyra, holder ſig ſtræng, og beholder den hyde Farve i Glden (§. 704.). b) *Smidun-Mor* eller *Effe-Leer* kaldes i Island en graa Jordart, ſom Smiddene bruge til at opmure deres Eſſeſteder, fordi dette Leer taaler brav Gid og ſmeltes ikke giærne. Det findes i Bredderne af Midfiords-Aaen: Laget er 20 Alne tykt og henved 300 Alne i Længden; og ſaa ſtort Lag finder man kun ſiælden af noget Slags Jordart i Island. Naar denne bliver ſtemmet, æltet og behandlet ſom Pottejord, ſkulde man troe den ikke blev utienſtig til Indvaanernes Nytte. Den er ellers en noget hårdet Mergel-Art, ſom ikke har meget af ſeet Leer ved ſig; den træffes mangeſteds i Island, endſkiont ikke i ſaadan en Mængde, ſom her. c) *Jelandst Malachit* kaldes en grøn blod og haard, dog altid leeragtig Steenart, ſom findes paa mange Steder i Island. De

Gam

Gamles Malachites er en Jaspis-Art; men de Nyeres, hvissen denne Jeslandske nærmer ligner, er en Kaaber-Erg. Den haver giærne noget Jern ved sig, ligesom den grønne Mudderjord, der falder paa Kefkenæs i Bredefjorden (§. 565. f). Indvaanerne give den Navn af grøn Vokfarve, fordi Bogbindere i Jesland bruge den til Boger, og de Studerende til at strege under Ord og Meeninger, i Stedet for rød Kride. Den falder tide saa løs, at den kan gnides til Pulver imellem Fingrene, atter saa haard, at den tager imod en mat Slibning. Den er meget barkende for Smagen, kleber ved Tungen, og haver iblandt en noget vidrig Smag, dog ikke som Kaaber-Erg. I Ziden mister Steenen den grønne Farve, og bliver brunrød. Den falder baade fin og grov, og denne sidste, som er steenagtig, kan bruges til Ole, men faaer dog ingen god Farve. Almindelig falder den i Fjældenes Rifter, men aldrig i nogen Mængde, saaom paa Nordlandet overst oppe i Vatsdal, nær ved Grimstunge Præstegaard, og i Svædisfrok i Badle-Syssel ved Defjorden, hvor der ogsaa træffes smaa Drogesteene inden i den (§. 568. c). d) *Bolus albo-ceruleo & fulvo variegatus*, findes i de omtalte Skredhøie i Vatsdalen. Den smeltes let, og bruges til Jernlodninger. e) *Bolus colore lucide carneo*, en meget fin og anseelig Jordart, findes i Holtestad-Biærg, fort fra Skagestrand. Dette Biærg giver lidet Surterbrand, men er ellers omtumlet, samt viiser smeltede Lag og sammenbakte Leersklipper, med smaa forbrændte Steene inden i. f) *Bolus brunneus tenacissimus*, er en særdeles fin og sei Leerart i Strandklipperne af Ufsødal paa Gliothon: den falder i de smaa Huller og Rifter i liden Mængde. Det besynderligste ved denne Jord er, at man overalt inden i den seer at avles ganske smaa Kristaller, og hvor

de komme til større Guldkommenhed, danne de smaa Boller, som ogsaa inden i have noget af Jordarten. g) Paa Reykheide, hviest oppe, findes tvende Arter som høre til Bolos *Therमारुम*. Den eene er guul, fin og feedagtig, og treffes ellers ved Svovel-Miner, hvor Jorden er udfiolet. Den anden, som af os blev kaldet *Ptisanæ fossilis*, er hvid, og kiendelig deraf, at den ligner grovmaalede Byggryn. Den er suuragtig i Smagen, holder tider Alun, og er af samme Art, som den der findes i Svovel-Miner, hvor det af Vitriol og Alun sammenblandede Salt blomstrer ud. Bemældte Fjæld, som ligger imellem Olafsfjord og Svarfeddal, er tilføen omtumlet, og af samme Art som Dræghidsfjældet (§. 448). h) *Bolus Therमारुम varius*. Af de oven beskrevne Leerarter, som findes hvor der er Heede i Jorden (§. 202 & seqq.), falde i Myvands-Sveiten, og nær ved den Gaard Hest-Reyke, den hvide, blaa-graa, guule og røde; paa det sidste Sted er den hvids blaa og rød-marmoreret, ret smuk at see til, naar den viises hårdet og steben paa en af Siderne: den er derhos fuld af smaa smukt messingfarvede Riisavner. Alle disse Boli ere stiptiske, og for Smagen meer eller mindre suuragtige. i) *Bolus Therमारुम insipidus ruber*, er en fin Leerart, som falder ved Ophøer (§. 708.), og har deri Fortrin for alle andre, baade Høerernes og flere Steders Boli, at den har ikke Syrlighed ved sig, hvilken ellers er saa noie forenet med de heede og andre af de fineste Arter, at den besværlig ved Udlaugning kan reent frastilles. For nogle Aar siden var, af en Hændelse, en Prøve fra dette Sted kommen visse Jordkiendere i Kiøbenhavn til Hænde, hvilke forsikrede, at denne røde Bolus var en god Porcelain-Jord; der viistes Stoffeknappe og flere Prøver gjorde deraf. Det Islandske Compagnie fik dette at viide, og

Isod ved deres Kiebmænd paa Huusevig, bringe nogle Tønder hjem af denne Jord; men man gjorde dog ikke Porcelain deraf. k) 3 Mattfareviigene ere nogle, især 3de gode Jordarter af Mergel, blandet med feedt Leer. Ligeledes paa Tiernes, østen for Huusevig; men den Art holder Alun. l) En zinnoberrød sin Jordart findes i Gistdet, nær ved den Bondegård Ulfaa i Desfiords Syssel. Den er jernhaltig. m) 3 Liosavatskard, en bebygget Dal imellem Fioloskadaf og Myvandsveiten, findes en hvid noget rødsvart Mergel, som baade er fin og holder sig godt i Isden: Vi have ladet noget af den gjøre i Arbeide i Kiøbenhavn.

Steenarterne.

S. 713.

De sandsteensartere.

De sandsteensartere ere: a) Moberg, er tidt bleven nævnet i det Foregaaende, det findes paa mange Steder i Nordlandet, dog med Forskiel i Godheden. b) Den Sandsten, som Thorderhofde, Malmoe og Drangoe bestaae af, er en Forandring, noget haardere og fastere end det sædvanlige Moberg, fordi den ikke har de jordagtige Deele, som dette. Den fortæres heller ikke nær saa meget af Lusten. Farven er lysere end i de andre Mobergs Klipper. 3 Thorderhofde falder tvende andre endnu haardere og finere Forandringer, nemlig en blaagraa Sandsteen, bemængt med skarpe dog fine Deele; denne er meget beqvem til Bygninger, og en blegghvid Klippe, meget haard, der bestaaer af grove og skarpe Deele: denne kunde maaſkee bruges til Møllesteene. Af de Arter, som her findes i liden Mængde, er den graa Philitriesteen og de af fint Sand: og feedt Leer. bestaaende smaa runde Vitler, Oolithi, eller Klippebolle: disse ere lyseblaagraa, og findes i den fineste

fineste Sort af forbemældte blaa-graa Sandsteen: de findes i Jælden, og bruges her til Jernlodninger. c) Rødssteen af en grovere og skarpere Art, end den som er nævnt om i det næstfølgende Stykke (§. 566. b). Et Lag deraf findes i Diupedalsaa ved Desfiorden. d) En Hvirsd fiin, meget leeragtig dog haard Steensart, findes i Fjeldet ved Ulsaa, nær ved den uysommældte Jord. (§. 712. 1). En Forandring deraf er den hærdede Steenart i Mads-mardal paa den østlige Side af Desfiords-Bygden. Den er mærkes rød. e) Hvedsteen-Arter: Den fineste og blødeste Art af dette Slags, er en af graa Sandsteen, i 7 Fod tykt Lag, i Timnaas bjærg i Skagafiordsdalene. I Grunden eller Dybet af Desfiords-Aa findes et Lag af en lysgraa Klippe, som er tienslig til runde Hvedsteene. I det inderste af Hørgaadal, hvor Aaen springer frem, og førend man kommer op paa Hæledals-Heide, staaer en Klippe, som Brynesteene findes i: de falde i aflange, tynde og smukke Stæser, og bruges af Indvaanerne til at skærpe Knive og andet Værktøi af Jern, naar de ikke faae Bryne udenlands fra, hvilkede de holske meer af.

§. 714.

De grove Stenklipper ere: a) de sædvanlige graa Klippe ^{Grove Stenklippe.} per, som findes snart allevegne i de Jælandske Fjælde, især paa de Steder af Fjældene, som ikke ere omtumlede ved een af de tidligere Omvæltelser (§. 22, 206, 360 og 567.). b) *Saxum arenario-micaceum* (§. 567. b) findes sammesteds i de Bjærg, der staae paa eller nær ved Udpynrene imod N. c) Studaberg (loc. cit.) er her ikke saa meget almindeligt. Af de krumme Basalt-Klipper sees dog en artig Probe i Skatevigs-Fjeldet: Støtterne ere almindeligt sekskantede, men derhos til 5 og undertiden kun til 4 Sides.

der (§. 476.). d) Ræmpe-Muure (§. 567. d) sees her paa mange Steder ved Strandsiden. e) Blaagryte (§. 477.) er her i Siaren almindeligt. f) Zelluberg, flade Steene eller Hælder, falde paa mange Steder meget smukke og rienslige til Bygninger. I det af Naturen befæstede Sted Borg i Bidedal, (hvorom meere hersefter), findes 1 Al. tykke liige Hælder oven paa den Basalt-Klippe, som Borgen meest bestaaer af. Steenarten er et meget haardt hvidagtigt Graaberg. En anden Sort af Hælder, der i Hensigt til Skikkelsen ere ligesom de sædvanlige, findes oven paa Hialdet Batnehjalle, sonden for Østfjordsdalen, nær ved de færste Søer sammesteds. Klipperne kunne kloves i tynde meget liige og smukke Gliiser, der ere meget haarde, eensdannede, og graa-bruunagtige i Farven. Det vilde ikke blive saa besværligt, at føre dem herfra ned til Østfjorden. g) Rød Ræmpesteen. Vi have nyelig talt om de sædvanlige Moberg og andre Sandsteen-Arter. Denne røde Art er heel besynderlig og bekjendt: af den sees heele Klipper eller Stykker i Hølebyrde, et steilt Viærg over og tæt ved Holum Bispeggaard: En Muur omkring Kirken er tilforn bleven bygget deraf, og nu paa nyt Kirken selv. Store Stykker af den findes nedfaldne ved Noden af Viærgen. Bruffet er en Rødsteen, blandet med Graabergs Sand, Gruus og smaa Seene. En nærslågtet Steenart, endskiont ikke fuldt saa haard eller stærk, findes paa andre Steder i Hialtedals-Viærgene, som Mellemag, ligesom dette i sig selv er, endskiont det langt overgaaer det andet i Tykkelsen. I Rødeviig (en Bugt iblandt Rattfarevigerne) findes ogsaa en nærslågtet Steenart i et Viærg, hvorfra Bugten har faaet Navn: deraf er en Mængde, og læt at komme dertil, for at hugge Klippen. Hølebyrdens Rødsteen er jernhaltig, den synes ogsaa at være ble-

ben sammenbagt og hårdet i dette Fjælds oprindelige Omtumling (hvilket er eet af de ældste, og ordentligt med Etager): den forvitres ikke, og bliver ikke løs i Fjiden, som endel Islandske Moberge og Rodsteen-Marer. Forommældte Bygning viiser, at den lader sig meget godt arbeide. h) Eggiaberg, Saxum arenario-terrestre, Oolithis prægnans, er en Biærgart paa Fiornæs often for Hunselvig, som af nogle tages for Eitleberg, eller et Slags Breccia, men er det dog ikke; thi endskiont Biærget selv, eller Matrix, er et Moberg, der giærne findes i de Islandske Breccier, saa ere dog disse Æg ingenlunde af andet eller fremmed Slags, som smaltet Steen, Pimp eller Strandsteene; men af selvsamme Slags Materie, som deres Matrix, dog langt finere og haardere, noget jernagtige og forvitres giærne, eller falde fra hinanden i tynde Skorper, der omgive disse Æg, som sielden falde større, end at man kan indstutte dem i Næven. Alt Fiornæsset viiser de tydeligste Kiendetegn til Omtumlingen, skal blive udført paa sit Sted. i) Svartberg kaldes en besynderlig Bergart i Strand-Klipperne i Skaalevig. Den er temmelig haard og sei, og lader til at være en af vegetabiliske Surterbrands-Jord og Graaberg-Sand sammenblandet Materie. Man seer i den smalle hvide Dværg-Marer. Paa Skardsstrand, i Dale-Syssel, fandt jeg samme Slags Klipper, hvor man rider over ved Ebbetiden. Der findes Surterbrands-Materier i Nærværelsen; her ligesaa. Den nysomtalte grønne Malachit (§. 712. c) falder i smaa ovakrunde Stykker inden i Klipperne ned til ved Fiæren, og oven over har Fjeldet fem og sekantede Basalter. Til Siden er heele Skaalevigsdalens Grund uordentlig, og Jordens Lag nu høddende, nu afbrudte, og tidt gandske omvorte.

§. 715.

Siinere
Steenarter.

Siinere Steenarter ere: a) sort Jaspis. Flint-Jaspis og Agat-Arter falde i Nordlandet paa mange Steder; men denne Art fra Tinnaa er besynderlig deri, at der falder et heelt Lag af den, 5. God tykt, hoit oppe i Viærget. Det er endnu ei afgjort, hvor-
fen om Flinten, eller jaspis-artede Steene, at de ei ere smaltede. Om denne sorte Jaspis synes det rimeligst; thi baade er Glædet omtumlet; Lava, og andre Levninger af Jordbrand, findes og i Nærværelsen; dog er den ikke liig den bekjendte sorte Glas-Agat. Den giver lidet Jld, naar den slaes imod Staal: den er i Brud-
der uligge, og viser ikke de runde Deeles, som den besynderlige grobe Art Rasinne, der findes under neden i Glædet. Den er ellers meget haard og seil, og tager imod Skibning. En anden grovere Art af sort Jaspis falder i Wiadimardal ved Østfjorden. b) Rød Jaspis, som meget nærmer sig til Flint i Hensigt til Haardheden, samt at den let slaer Jld, findes hoit oppe i Glædet, i Ulfsdalen paa Eliothorn, i et fast Lag, som vi dog ikke kunde komme til, den Tiid vi vare her, men maatte lade os noie med de nedfaldne Styk-
ker. c) *Jasponyx chalcedonio mixtus*, baade rød og grønagtig, med hvide, mælke- og valde-farvede Pletter og Arer, treffes baade her og i Svarfaddal. d) Grøn Jaspis falder af samme Art og Haardhed, som den røde i Ulfdals-Viærget. En noget blodere Art findes ogsaa i Svarfedalen. e) *Chalcedonius semi-pellucidus, griseo colore, maculis lacteis*. Denne og flere Forandringer af Chalcedonier findes i Tindstolen. f) *Onyx ex albo caruleus, fasciis candidis* treffes i næstbemaeldte Viærg: den findes og paa flere Steder nord paa i Stranden, og andensteds i Landet: denne Farve er den almindeligste, og Skikkelsen gjerne rundagtig;
ellers

ellers treffes ogsaa mælkefarvede Onyches med blaa Striiber; der ere meer giennemfigtige end Resten af Steenen. Disse Chalcedonier og Onyxsteene kaldes under eet af Indvaanerne Glerhallar, (det er Glersteene); men dette Navns Bemærkelse er ellers alt for lidet bestemt: det strækker sig til alle Slags Quarz-Arter, der ere hvidagtige og meer eller mindre giennemfigtige. g) *Porphyrites rubens*, *lapillulis albis distinctus*, treffes ogsaa under neden i Tindestol: den er meget haard og flintagtig, slaar Ild mod Staal og faaer ved Slibning en smuk Glands.

§. 716.

Krystalllagtede Steenarter, som ere ommalste i foregaaende Stykke (§. 568.), findes og i Tindestol, nogle af hvert Slags: f. Ex. i Steenkar. (loc. cit. d.) smaa Stykker Berg-Krystaller med 6 Kanter. Ved denne Anledning bør mældes om det bekjendte Fjæld Tindestol, hvilket i forrige Tider blev kaldet *Eylis-Fjæld*. Fjældet er høit, med mange Etager, selgelig iblandt de ældste i Island. Det staaer paa Strandbredden i Skagafjorden; vesten til, og indod N. O., gaar en liden Bugt ind i Bjærget; kaldet Glerhallar-Viig. Navnet, som nyelig blev forklaret, viiser, at her mædnes at være de Natur- eller Edelsteene, som Indvaanerne agte saa høit. Oven paa Fjældet falde ogsaa nogle Forandringer af Quarz og Spath-Krystaller; men derimod længer borte paa hin Side, i den Dal, der skiller Tindestol fra de andre Fjælde, er Egnen meget pøstiumlet. Dette Sted kaldes Tröllabotnar, maaßee fordi det udraabes for onde Mænders Boelig: der findes endel af de Materier, som falde i Drapeliid-Fjæld. Een af os reisde til dette Sted for at see den Steenkuil-Art, her skulde være opdaget; men den befandtes ifflun at være en vitrescerende sort glasartet Materie, som ingen

ingen Feedme var i. For at komme igien til Glerhalls-Byg, hvist
 den anden af os ved samme Tiid besøgte, da sees i samme en
 Huule, kaldet Baulubellir, hvor ind man ikke kan komme, uden
 med den laveste Ebbe i Springtiiden. Her finder man de fleeste af
 de nysommældte Steenarter, især Chalcedonier, og adskillige Agat-
 ter, Quarz-Arter og Spath-Krystaller, samt Quarz-Druiser,
 hvis Deele ligne deels Busoniter, deels Menneffe-Kindtænder, og
 disse give de Nærboende ud for Riartlinge-Tænder. *Spatum calca-
 reum rhomboidale non duplicans objecta* (§. 568. i), og *Spatum
 parasiticum asperum* (ibid. k), findes ogsaa i Tindestol. *Zeoli-
 tes albus, purus* (loc. cit. m), i smaa Stykker, men derhos hvid,
 reen og fast, falder i Rodeviig. *Aluta montana* er, tillige med
 næstfølgende Steenart, særdeles rar og mærkverdigg i Jsland, siden
 den ingensteds falder paa Landet (der os er vitterligt), undtaget
 paa Ulsdals-Strand Osten i Gliothon, uden paa Klipperne, hvor
 den sidder som Læder, hvid og elastisk: den lader sig let trykke med
 Fingeren, medens den er frisk og sidder paa Klippen; men naar
 den tørres, bliver den haard og sei. Berg-Rorken er af samme
 Eone, men finere, hvid og lidet glindsende, kan i Klippernes
 Sprækker voxe til 1 Tommes Tykkelse, og skræres med en Kniv.
 Naar denne tørres, seer den gibbsagtig ud og kan skræbes med
 en Nagl.

§. 717.

Steenarter
 og andre Ma-
 terier, frem-
 bragte ved
 Jordbrand.

Al de Materier, som ere frembragte ved Jordbrand, findes
 a) halvsmaalede Graunsteene paa mange Steder i Nordlandets
 Gjaalde, hvor Jordbrandens Levinger ellers ikke ere meget synlige,
 for Ex. i Skagafjords-Dalene, paa Erolleborn, Gliothonet og
 i Rostevig; man seer her de samme Farver, Steenarter og Bier-
 genes

genes Bessaffenhed, som paa Drapehlidfiæld (S. 448). Det sorte i en Runddeel krummede Viærg, inden for Dalefredet paa Skots horn, staaer opført, som en hoi Brandmuur, af denne Steenart. b) *Lava*, eller fuldsnæltet Graun, findes endog saa paa de Stæder af Nordlandets Bygde og Fiælte, som ingen af Indboerne tage for forbrændte; men kun i smaa Stykker i Bygden; ligeledes Breccier og tynde Lag inden i Viærgene, og disse kunne regne deres Alder lige med, og maa skee hoiere, end Fiældene selv. Man finder slige Smaasteene overalt. Paa Hialtedalsheiden ere Klipper af gunstigt Breccia, hvori der ligge deels snæltede, deels til Pimpesteen udbrændte Eitler. Saadan en Viærgart er i Hialtedals-Fiældets Mellemstæg, i Vatødal, i Vindestøl og i Desfordens Viærg. I Holte eller Gruus-Bakker, neder i Bygden, træffer man næsten overalt, naar man søger derefter, vulcaniske Smaasteene, og større udhullede Steene af samme Oprindelse. I Desfiørdes Bygden samlede vi en Hoben saadanne Prover af adskillige Slags. Heele Strækninger af Lava seer man ikke i Nordlands Bygden, forend i Thingøe-Eyssel; men derimod ere de kiendelige nok oppe paa Fiældene, i det store Graun paa Kiølvøien, hvor Jælden har, paa samme Maade, som er nævnt om Surthuulen (S. 350 o. f.), dannet Grettis-Zellir, hvilken er henved 30 Favne lang, og hvor den er bredest, 6 Favne, opfyldt for det mæste med sort Sand og stødte Pimpesteen. Denne Graunstrækning er i Forskningen kommen fra Høltjøfel, og naaer inod Sønden til Blaaæll, et af Sønderlandets Fiælde. Man finder her paa mange Stæder *Strias vulcanias*, f. Ex. i Grettishuulens Høvelving, hvilken, ligesom Surthuulens, er overtrukken med en tynd glasagtig Skørpe og knortede Stalactiter. Den anden Lava-Strækning ligger i

Bugten af Hofsjöklet, kaldet Lambahraun: Veien ad Vatnahjalle til Þesfiorden falder derover. Imellem Þraunet og Þesfelen ser man nogle smaa Bjerge, der ere røde og have tilførn været Jordbrandens Værksteder. Þraun kaldes og, saavel paa Skagen, som i Flotene, nogle klipperige Steder, men disse vilse ikke den rette Lava; endskjønt det er slutteligt af Steenens Huller, at de have engang været i Brand. I Þhingoe-Syssel har man store Lava-Strækninger, og Grunden næsten overalt forbrændt og omstumlet. Disse Þraun have deres Oprindelse i Myvands-Eggen, som for sig selv skal beskrives. Længer hen imod Østen og Længer næs har man andre Þraunsteder, for Exempel i Þræsthole-Sogn. c) Ravntinna, eller Glas-Ålgat, findes mangesteds paa Nordlandet: I Skagefiords-Dalene (§. 715.) er en grov, men dog haard, tæt og eensdannet Art. Paa Þhindestol 3de Forandringer: ligeledes i Þesteviig, Þesfiordsdal, og især giver Myvatn de største og beste Ålgater. Her falde ogsaa de smaa Globuli, som findes i Drapehlidfiæld, og af samme Art bringer Þindestol og Þesteviig gode Prover. d) Ravntinnubroder (§. 215.) findes ogsaa paa foromnævnte Steder, og den foregivne Steentull-Materie i Þrollebotn, ved Ulfæa og Þiadmardal i Þesfiords-Bygden, og paa flere Steder, er intet andet end denne samme Materie, som er stødtt smaa, og smælttes tæt, men giver ingen Lue.

§. 718.

Tophi.

Alf *Tophis* findes her: a) *Zverastoinar*, beskrevne i de forrige Stykker, i Anledning af Reykholts-Dal og flere Steder; nemlig de grove blegagrigte, som gjerne indeholde petrificerede Stykker af Plante-Riget. Alf disse falde nogle ved Þrehver og der i Þarværellen; men især paa Þveravalle (§. 706). De *Tophis* steene

steene, som Hverene frembringe og forøge deres Bredder med, ere grovere og losere end de første. Den hvide gibslignende *Tophus*, eller Skorpe, som Hverevandet danner ved sin Overtaafning, er og meget tæt og blød: b) Den sandagtige *Tophus* paa Hveres valle, som kunde tiene til at skure Metaller; annædt i det forrige. c) Af de haarde og mindre kiendelige *Tophis* findes noget i Trolleborn, Ulfaafæld og Miadmardal i Desfjorden. Paa dette sidste Sted findes en meget haard og tæt Art af *Tophus*; den bestaaer af tynde Lag og smaa Knorter, hvor der er Nabning imellem Lagene. Den kommer nærmest til Drapshidfiældets *Petra concreta schistiformis* (§. 441). d) De saa kaldte Kalksteene, der giærne falde i de hvide Fjælde, og paa nogle flere Steder, blive og saadanne *Tophii*, som det heede Vand haver frembragt: de falde meest i flade, ulige Stykker, og findes i Fjeldsiderne, hvor Skredfald have bragt allehaande Ting ned af Bjærgene. Materien ligner den coniske *Tophsteen* fra Baula. Den er giærne haard, sei og tæt inden i, dog smuskes Hænderne naar man føler paa den. Skredvand angriber den ikke; den holder sig og stræng i Jiden. Af disse Arter findes noget i Skreedet i Barsdal, i Trolleborn, paa det øverste af Hofdefæld, i Røsteviig, i Thingoe-Syssel, og paa flere Steder.

Mineralier.

§. 719.

Jærn er her paa Nordlandet i Jords Leer og Steen-Arter sammenslægt, som paa Vesterlandet (§. 481.), og det snart allevegne. Ligeledes Jærnskorper eller *Incrustata martialia*, uden paa de Steene og Klipper, som holde Jærn eller ligge i Mudderjord og

Jærn.

Fugtighed. Forandringerne af Skiffelsen have givet denne Jærns Erh forskiellige Navne, ligesom den findes deels for sig selv i heele Klumper, hvor Grunden er sumpig, og regnes af nogle til Tophsteenen (Tophus martis); deels i adskillige Skiffelser, hvilke vi dog kun sielden haver fundet i Island; men ofter i Klumper. Af disse figurerede JærnsErher veed man meget at sige i andre Lande, og et artigt Deviis derpaa funde vi i Aaret 1755 paa Disklebe Præstegaard i Skagafjorden. Kort fra Gaarden var en stor Streen, som, da vi væltede den om, forestillede paa den Kant, der sad i Jorden, en Figur som et Træ, 12 Tommer Dansk Maal i Længden og 8 i Bredden; saavel Bullen som Grenene vare rødagtige, huile inden i, og neppe tykkere i Giennemsnidt udvendig end 2 Linier. Hvarken denne eller andre deslige JærnsErher i Island trække Magnet en meget, forend de blive rustede. Det synes at dette, og andre Figurer af samme Slags; ere kun Incrustata af en Lyng eller Krat-Plante, som ved nogen Hændelse er bleven bragt derhen. Den sorte Farver-Jord (§. 480. c) er her paa endel Steder, og det er nyelig anført (§. 704.), som noget sært eller rart, at saadan en Jordart findes ogsaa ved et Bad og i en varm Grund i Hunebands-Eyssel. Af Jærnkis er os allermindst kommet for i denne Part af Landet. 3 Bolis Thermarum findes tidt saafine Kiisavner, at man neppe bliver dem vaer med det blotte Nie. For Exempel, i den hærdede Leerart paa Bunden af det varme Bad i Rutesfjord (§. 704); ved Drexher, en grøn blaaig Bolus med smaa gule Høner; nær ved Myvand og paa Ehestereyfer i Ethingoe-Eyssel, træffes de ligeledes i bemældte Jordarter.

§. 720.

At Anstalter til Jærnværker have virkelig været til i Island, er viist i det foregaaende (§. 368 og 575.); men i Nordlandet funde vi allerførst Spor dertil, da vi reisde over Sniofjedalen. Kort fra Halse Præstegaard var en liden Hoi, hvor det tegnede til en Dofte, hvoraf vi sluttede, at der maatte have staaet en Bygning i gamle Dage. Vi funde og her i Jorden Kull og Sinner, især af de store svære og meget jærnagtige, som vi den Gang af Forskningen toge an for en siin, meget malmagtig Lava; men vi komme strax paa andre Tanker, ved det vi funde derhos de foransorte Kiendtegn, og bleve endog fuldkommelig beskrykede i den Meening, at her har været Jærnværk i forrige Tider. Her er og endnu den allerbeste Birkeføv, uagtet den i lang Tid er bleven hugget uden fornoden Forsyntighed. Tilligemed falder her en Mængde af den gamle Mudderjord eller Jærnokker, baade nær ved, og, endskjont med nogen Forskiel, oppe i et Wiærg kort fra Halse. Bag efter vidste ogsaa nogle af Naboerne at fortælle, at her skulle tilforn have været et Smitdested, og andre forsikrede, at deres Fædre havde fortaalt dem, at der i det Bygdelaav Kildehverfe, kort fra Myvand, men 12 Miile her fra, skulde have, efter deres Meening, henvæd for 200 Aar siden, boet en Norst Mand, som selv, for sit Huus, bereedede Jærn af Rauda, hvorved man i Island forstaaer den rødagtige Ofkerjord, men at han tilsidst var bleven fied deraf; thi Forsdeele kunde ikke betale ham Omkostningerne.

Gammelt Jærnværk.

§. 721.

Uiminidelige Risffen-Salt kunde paa Nordlandet bereedes af Havvandet (§. 576.), baade ved at lade det fryse, og ved at bringe det hen til Drehoer eller de andre faagende Kilder der i Nær-

Saltarter.

værelsen (§. 708.); Her er ogsaa blevet kaagt Salt i forrige Tilder, især i Badle-Syssel: Paa Manaar-Der, uden for Tiernæs, findes hvidt fint Salt paa Strand-Klipperne, kaagt af Solen (§. 576. b). Men herforuden treffes 3 andre Saltarter paa Nordlandet, nemlig: a) Vitriol, som tildeels er *Vitriolum maris nativum*, hvilket den eene af os har fundet paa Tiernæs i Ehingoe-Syssel (§. 27, 234 og 576.); deels det saa kaldte Naama-Alun, som opspitser i Blomster af Svovel-Minerne ved Myvand, hvorom siden skal udforlig berettes. Bemældte Blomster smage vel meest efter Alun; men ved gjorte Forsøge have vi befundet, at de fornemmelig indeholde Vitriol. b) 3 Bakken af Tiernæs, oven for Stranden, findes ogsaa, foruden det omtalte Vitriol, samt haarde Bolder som Gaase-Æg, større og mindre, hvilke ere meget jernagtige (§. 719.), en suuragtig, fin, feed og væxtartet Jordart, nær ved og imellem Suterbranden og dens Løge. Endskjønt denne Jord blev ikke prøvet, saa viiste baade Smagen og de andre Omstændigheder, at den er rigtig af Alun. Men det mærkværdigste er, at der imellem Gliiserne af den grove jordblandede Surtarsbrand findes ganske klare serstraalede Stierne af bemældte Saltart: hvilket ikke er truffet her i Landet paa noget andet Sted. Foruden den Alunart, som findes i Svovel-Minerne, foreenet med Vitriol, funde vi en Bæk paa Tiernæs, som havde suurt adstringerende Vand, hvilket blev lidet hvidagtigt ved Solutionem Lunæ. c) Graunsalt, af samme Art som det, der falder i Bornesborg (§. 483.) og paa flere Steder, findes ogsaa ved Myvatn i Lava-Klippernes Rifter og Huuler, hvor Jldens Smæltning har længst holdt ved. Det bliver et slags Salmiak. d) Her falder endnu eet Slags ubekendt Salt, hvis Blomster vi opdagede
paa

paa samme Sted, i det vi lode grave ned i den heede klippagtige Grund, da denne Saltart spirede ud af Bæggene. Den er hvid, og ganske lidet syrlig for Smagen; men ellers, hvis man tager noget deraf i Munden, særdeles torrende og stiptisk.

Fossilier.

§. 722.

Opgravede og tildeels crySTALLISEREDe Conchylier, af ad- Opgravede,
tildeels crys-
talliserede
Conchylier.
skillige Arter, findes i et lidet Bjærg eller Bakke, kaldet Hallsbiørns-
stade-Kamb, 140 Fod høi, og beliggende i Ehingoe-Syssel, nær
ved Stranden, kort østen for Huusevig's-Havn. Bakken bestaaer
meest af Strandleer, og det er eienlystigt, at Havvandet eengang
haver, ved noget Slags Oversvømmelse, steeget saa høit. Vi lode
grave oven i Bakken, som er dækket med Madjord og bevoren med
Græs, og funde disse Skaller baade høit og lavt, dog de beste og
mindst krunkede oven til. De crySTALLISEREDe ere kun paa eet Sted,
og al Mængden af dem ere Roeskaller (§. 689.), et Slags glatte
Cardia veneres; men de andre Arter ere fornemmelig a) Gim-
burstel, en liden glat Venus. b) Baarustel, en Cardia stri-
ta. c) Sarpudist, en Pecten striatus auritus. d) Salloka,
de Norffes Sand-Mige, er den større Tellina. e) Adskillige
Strand-Sneglehuuse, saasom den sædvanlige Kubbe, paa Norff
Konge. f) De ganske smaa spidske Strand-Snekker, paa Js-
land's Siæru-Konge, af adskillig Farve. g) Endnu en middels
maadig stor Snegle-Art, som ikke findes paa andre Steder i Lan-
det: den har 5 Kringelbugter og er længere og spidsere end de an-
dre: heraf falde 2de Forandringer; den eene glat; den anden lidet
striibet. h) Møepatter, Nerita, hvoriblandt nogle af usædvan-
lig

lig Størrelse. Mængden af disse Skaller have inden i en sort leers blandet Sandsteen; ganske saa ere tomme, og Roefskallerne findes ogsaa fulde af denne Sandsteen. Paa nogle af Sneglehuusene mærker man det indvendige Lag af Skallen, forvandlet til hvide Krystaller. Dog er det egentlig Roefskallerne, som ere krystalliserede, og viise ret besynderlige og rare Forandringer, hvilke for deres Skyld ere blevene, Tiid efter anden, udsorte herfra og bekiendte mange Steds i andre Lande. Man finder oftest 4 Slags Forstiael. Den første, naar kun den inderste Hinde af Skallen er forvandlet, som nys blev sagt om Sneglene; og da haver Skallen den ommældte Sandsteen inden i. Den anden, naar Skallen er ganske tom, og beklædt inden i med hvide smaa serkantede Krystaller. Den tredie, naar den er halv fuld af store hvidagtige Krystaller, og halv Sandsteen. Undertiden treffer man den heel krystalliseret. Og endelig den fjerde, naar Skallen er ganske indtagen af en meest rødagtig Crystallisation. Denne har ogsaa nogen Forstiael, deels i Farven, deels i Krystallerne; thi nogle falde guulrode, som Sukkers Candis, andre ganske mørkebrun-rødagtige, som den grovste Sort af bemældte Sukker. Disse sidste Krystaller ere ogsaa gierne de allergrovste og største; men i Henseende til deres Skikkelse ere de 2 Slags, nemlig regelmæssig cubiske, da Spidserne gierne vende ud ad, og disse ere de mørkeste og største: dernæst findes de lysere, med noget mindre Cubis, hvor Kanterne ere lidet afslæbne igien, saa at her findes 12 smaa og aflange Sider, foruden de 6 store. De ommældte smaa hvide Krystaller staae gierne ud, spidse og smalle, viisende der en serkantet Figur. Endelig have vi mærket paa nogle helt iglennem forvandlede Stykker, naar vi brækkede dem, at endskjønt de vare hvide inden i, havde de dog et Lag af brunnagtige

agtige Krystaller uden om, eller inden for Skallen. Det bliver altsaa Spørgsmaal, om disse Veneres her ansees for Petrefacter, det er at sige, om disse Krystaller, som saa besynderlig ere opvoxne, dels i Skallen selv, dels inden for den, have ikke havt Dyret selv og dets Skal til Grund-Væne; endskjønt Skikkelsen udvendig er reent borte, hvilket ogsaa nødvendig maatte stee, ved det der opkom en Krystall-Dannelse.

§. 723.

Alf Steensforvandlinger, især af Træer-Arter, træffes nogle paa Nordlandet. a) *Smide Petrefacta Tophacea*, som de heede Brønde eller Høer frembringe (§. 578.), findes i Nærvarelsen af Drexler (§. 708.), ved hvilken Leilighed tillige er vist den besynderlige Omgang, som Naturen bruger ved denne Steensforvandling. Vi funde der nogle ganske indtagne Stykker, og derhos andre, som ifkun udvendig vare overtrukne, men Træet inden i uforandret, undtaget at hvid Tophus havde trænet sig ind i Risterne. Derimod, hvor Materien var ganske udkaaet og blodgiort i Forveien, der var Petrefactet fuldkomment. b) Den anden besynderlige Art af tophist Steensforvandling, ommældt tilføi i Drapes Hidsjældets Beskrivelse (§. 441 og 42.), traf den eene af os i Troidbotne, en ode Fjælddal over for Fjendstol. Man finder her ikke alene Stykker af *Concretis Thermarum* (§. 222.); men ogsaa en tydelig træligende, meget haard og tæt ansigtsfarvet Steenart, hvis Træer ere meer rødagtige end Resten: Proven holder sig stræng i Jiden, og angribes ikke af Sædvand. c) Af de sorte Koldvands Petrefacter ere betydelige Træstykker bleve fundne etsteds i Skagafjorden, nær ved den store Flod Heradsbænde. Vi have tilføi seet og faaet store Prover af dette Træ, hvilket er sort, tem-

Steenforvandlinger.

melig haardt og tungt, ganske forandret til Sten og derhos lidet jærnagtigt. Paa Tiernes findes ogsaa Prover af dette Slags Pærefacter. d) En grovere Sort opdagede vi i Natifareviger, da vi reisde derhen. Den kiendeligste seer man i Strand-Klipperne i Rodeviig, nemlig et tyndt Lag med tydelige Trævler, ganske kulsort af Farve, og Rifterne indtagne af hvidagtige Krystal-Lameller. Denne Art er dog ikke saa haard som den næst forrige, dog, Provven som vi finge i Søe-Klipperne i Skaaleviig, er endnu løsere: det lader til, at begge disse Arter ere beblandede med en vegetabilisk Skiferjord; her findes ogsaa tynde Lag af det Slags Skifer i Nær-værelsen, og tillige baade Surterbrands- og Ampelit-Arter, hvorefter om nu strax skal mældes noget mere.

§. 724.

Surterbrand

Surterbranden er bleven Læserne bekendt af de forrige Stykker (§. 235, 237 og 579). Man træffer den paa nogle langt fra hinanden bortliggende Steder i Nordlandet: et tydeligt Tegn til den oprindelige store Omvæltelse, som Jsland haver udstaaet længe førend det fik dette Navn (§. 582). Paa nogle Steder er denne Materie heel og fast, i Form af Træ eller Tommer, men paa andre Steder foraadnet og løsnet fra hinanden; paa nogle Steder igjen midt imellem begge; det er at sige, Materien er vel fast og god, men haver dog ikke saa kiendelig Form af Surterbrand. I Skagefiords-Herred bliver man den vaer paa flere end et Sted; men det fornemste er Hofsøgil, en Diargkloste nær ved den Gaard Hof i Goddalene, hvoraf Hofsøfjel har sit Navn. Denne Materie er af middelmadig Fiinhed: her falde store knortede Plancker, i 3de Lag oven paa hinanden, og Klipper derimellem: det øverste og underste er tyndest; det mellemste 3 Fod tykt. Indvaanerne i Nær-

Nærværelsen søge aarlig herhen, og brække Materien ud med Jærns-
 stænger, for at brænde Kull deraf til deres Smeddier; men det
 skeer ikke uden Farlighed, thi Stykker af Klipper falde ofte ned,
 ved det her sættes ingen Stotter under, eller bruges andre Indret-
 ninger, til at gjøre Arbeidet læt og sikkert. Maaden, som de bru-
 ge, til at brænde Kull af Surterbrand, er denne. I tæt og tør
 Jordgrund graves en rund kugelformet Groft, 2 Fod dyb og hen-
 ved 2 Alne breed, deri lægges den i smaa Stykker brækkede Surter-
 brand, og stables op til en Alens Høide over Jorden. Man læg-
 ger Jiden ind i et Trækull, som gøres nederst ved Grunden, og
 derpaa svider Materien; man tildækker den med Jordsvær oventil,
 og udsukker den saasnart Røgen formlindfkes. Nær ved Finnaa,
 i Skagefiorden, findes ogsaa lidt af Surterbrand; men Materien
 er slæt. I Desfiords eller Badle-Syssel, ført fra den Bondegaard
 Ulfæa, fandt vi, efter given Anvisning, et halvt Fod tykt Lag af
 en saakaldet Steenkull-Materie, hvilken er sort af Farve og bræn-
 delig: den falder tildeels i smaa Stykker, som Tærninger, deels
 ganske stød og henhalden i fugtigt Gruus. Materien er hverken
 Steenkull, ikke heller tientlig for Jærnsmedde; den er af Oprin-
 delsen stød Surterbrand, bemængt med Bæjte-Jord. Norder-
 Syssel, og især Eiernæsset, viser artige Forandringer af denne
 Materie. Stedet bestaaer i en Strækning af høie Bakker langs
 med Søekanten, og der falde 4 til 5 Lag oven paa hinanden, 1 til
 1½ Fod tykke, og tynde Mellemag af en guulagtig feed suursma-
 gende Jord (§. 721.), saa at Tykkelsen af alle disse Lag udgior i alt
 3 Alne. De nederste Lag ere de beste, Materien er og reeneft og
 finest nederst i hvert Lag. De 2de øverste Lag give god Surter-
 brand, dog kun tynde Tiliser; men Træets Trævler, Knorter og

Greene ere der ret fiendelige. 3 Farven sees 2de Forandringer: den almindeligste er sort; men den anden brunn, hvilken er blodst og ligner meest til Anseelse det usforandrede Træ (S. 581). Surters branden forandres under neden i Laget til en fin, sort, lidet brunnagtig Materie, der viser indvoendig meget fine Trævler, og synes at nærme sig til Ampelitis (S. 583). Materiens Lag bestaae igien af cubiske smaa Stykker, der slutte til hinanden, 1 Tomme meer eller mindre tykke, og imellem de smaa Lag af Cubis, saa vel som de store Lag, er giærne noget af den nysbenævnte guule Jord. Denne Materie har man her kaldet Steenkull, saafom den er ofte bleven forsøgt til samme Brug, og den var det fornemste, hvorfor vi reisde hid. Men den er ikke nær saa tienlig, som Steenkull: hverken giver den saa stærk Varme, og derhos kan den brænde Jærnet, naar den ikke foides i Jorveien. Man kan heller ikke formode, at her er stort Forraad af bemældte Materie; thi endskjønt Strækningen langs med Stranden kan være en Fierdingveis, saa ere dog Lagene ikkun meget tynde, og man veed ikke hvor langt de naae ind i Landet; tilmed ere de paa Strandsiden ofte afbrudte og uordentlige, og fra Søekanten hælde de eller falde des meere, jo længer de naae ind i Landet, saa at Arbeidet med at opgrave Materien, vilde blive meer og meer besværligt. Det er besynderligt og rart, at der i disse Lærningers Mellemstige, nemlig i den guule Jord, findes haarde Volder af jærnagtig Sandsteen (S. 721. b), og i Klipperne i Nærheden træffer man dem endnu større og grovere. Sædvanligst ere disse Æg saa store som Gaase- og Svane-Æg. Oven paa disse Lag findes den aftegraa Skifer, som er almindelig ved Suterbranden paa andre Steder; den er temmelig grov og leeragtig. Klipperne oven for Bakken, hvori disse Steen-

Æg

Jeg sidde, ere en Art af brunt Moberg. Et andet Sted, hvor
 om vi havde faaet den Underretning, at der fandtes Steenkull,
 besøge vi i det vi komme fra Fiornæs. Det ere de foransorte Ratt-
 fareviiger, hvor vi reisde hen til Soes. I den middelste Viig,
 nemlig Skaaleviig, funde vi da: a) lidt af Surterbrand, som til-
 deels var løs og raaden. b) Sort Gruns derhos, af denne sön-
 derknusede Materie, sammeslags som den ved Ulfad. c) Den saa-
 kaldte Steenkull-Materie, hvoraf der ere 2de Forandringer. Den
 første ligner meest den nysansorte brændelige Materie paa Fiornæs.
 Den anden er langt finere, haard og glindsende, og denne er en
 Ampelitis. Af begge falde store og smaa Stykker, glærne flir-
 kante: de brænde meget godt, med en jævn Lue, især den sidste,
 og den lader sig smukt arbeide og polere, til Knapper eller andet
 Smaat (§. 583). Hvor meget vi end søgte efter denne Materie
 i Skaaleviig, funde vi dog kun meget tynde og korte afbrudte Lag,
 samt særskilte Stykker og Smuuler hist og her i Grunden, som viis-
 ste tydelig en her foresalden Omtumling. Paa den anden Side af
 Fiældet, som vi ginge over til Rødeviig, opdagede vi, kort fra
 Stranden, i en Leer-Bakke, et temmelig ordentligt Lag af denne
 Ampelitide, 1½ Al. tykt.

Frugtbarheden.

§. 725.

Hvad Grunden, Græsmarkerne, Hoeslættten og Foderet i Als I Alminde-
 lighed angaaer, falder her intet Nyt at tillægge, uden hvad lighed.
 der naturligen følger af Egnens Bestaaffenhed, Luften, Heeden og
 Kulden, hvilke Voster allerede ere beskrevne (§. 709 og 710). Til
 Foder for Kreaturer bruges ei glærne andet end Høe, hvilket her

er godt og kraftigt, og holder sig temmelig vel ude i den friske Luft, endskjønt her ikke bruges Hoelader. Alleslags Jndhægninger for Tuune og Græsmarker ere her reent forældne, hvorved Gaardene er blevene meget forværrede og ringere i Priisen end i forrige Tider. Ugrundede og meget skadelige Meeninger ere Skyld her i, og det ikke aleene her nord paa, men og paa flere Steder. Erfarenhed bekræfter det samme om denne Deel af Island, som endeel Skribenter berette om nordlige Steder, og især dem, der vende og hælde imod Norden, nemlig at Græs og Urter vøxe der allerbest. De angive sædvanlig Nordenvinden som Aarsag dertil, og det er visse-
 lig sandt, især hvor en Egn vender imod denne Kant nær ved Eoen, som norder paa i Island, hvor de Dunster, som denne Vind bringer fra Havet, gjøre Jorden frugtbar. Men man kan endnu lægge hertil 2de vigtige Aarsager. Den første er, at alle de Planter, der vøxe nordlig og vende imod Nord, ere vant til Kulden og for-
 drage den bader end Varmen, ligesom Jndvaanerne: det er derfor, at naar de støttes under en mildere Himmel-Egn, maae man ei aleene skaffe dem saadan Jord, som de ere vant til, men ogsaa dan Situation som de før have havt, ja ogsaa Is og Snee, om de skulle leve. Den anden Aarsag, som ogsaa er bekiendt iblandt de Naturkyndige, er, at den største Deel af de nordlige Urter og Græs leve længer end eet Aar, da Roden staaer Vinteren over, og bringer nye Væxt frem Aaret efter, ja flere Aar, ligesom den har mange Plantegiemmer ved sig; thi nogle have snart utallige, saa at de jævnlig komme op Aar efter Aar, endskjønt de afveies for tiidlig, eller i andre Maader hindres fra at komme i Frøe. Men foruden og tilligemed denne Fremvæxt, komme de fleste dog i Blomster og Frøe, som Naturen forsyner Jorden med til Overflod.

Paa

Paa Nordlandet er det bekiendt, ligesom paa mange Steder i Norge, at Græsset voxer der i kort Tid: Jorden har en overflodig og frugtbringende Fugtighed af den nys opstøede Sne, og Jis, og Solens Straaler frembringe en stor Grad af Heede i den sorte og stedse vaade Madjord. Dalene nyde især denne Herlighed. Ja endskjønt Solen ikke naaer til de Planter, som staae under Jisen, driver den varme Luft dem alligevel; men toes Sneen, og kommer for hastig bort, vødes de spæde Værter, og brænde ofte af, ved det Sneen i et Dieblis falder hen, og Solen kommer til at bestraaale de unge svage Planter, der altid for havde staaet i Skyggen.

§. 726.

Alf Urter voxer paa Nordlandet de fleste, som almindeligst findes paa Vesterlandet (§. 588-591). Ja Tuus Markes og Fiadrs Urter ere her giærne de samme, som ere anførte i Klofar-Syssel og Borgarsfjorden (§. 32 og 247 til 254). Især have vi her paa visse Steder, deels i stor Mængde, deels som rare, efterfølgende Urter: 1.) *Oweysu-Gras*, *Gentiana*, *Centaurium* (minus), findes paa den nordre Kant af Rutesfjorden. 2.) Det er ogsaa aamærket, at *Cochlearia* voxer der paa hver Gaard, paa og omkring Huusene, endskjønt Indbyggerne ikke ere faldne paa at bruge den til Raal. 3.) *Achillea* (*Millefolium*), *Vallhumall*, voxer i stor Mængde i Skagesfjorden, især paa den Gaard Stor-Alre. 4.) *Lyra-Ros*, *Epilobium* (*Alpinum*) Fl. Sv. 307, længst oppe til Fiadrs ved den bekiendte Eto Blanda, hvor den styrtes ud fra Fokelen. 5.) Paa nogle smaa Holme og Der i samme Eto, neder i Bygden, er god Forraad af Melur, *Arundo* (*Arenaria*) Fl. Sv. 102. Men den allerstørste Mængde deraf voxer i de store Fiadrs-Ørkener, imellem Nord- og Øster-Landet, og bringe en overflodig Rærne;

Urter.

men

men Landets Indvaanere have ingen anden Nytte deraf, end at deres Heste, som gaae der vilde, leve derved og blive de allerhaardst foreste og dueligste til at holde længe ud stærk Riden eller andet Arbeide. 6.) *Mela-Sol* (som vi have holdt for *Papaver-Alpinum Linn. Sp. Plant. p. 507.*), er en Art der egentlig horer Besterlandet til, og vorer der giærne i Bygden; alligevel have vi ogsaa fundet den paa Nordlandet, hoiest oppe til Siælds ved det Tisbiærg Hofs-Jokel. 7.) 3 Skægsfiorden, og paa flere Steder i Nordlandet, findes temmelig Mængde af ædelige Svampe: de ere ogsaa snart allevegne andensteds i Jsland; men spiises ikke giærne nu omstunder. Og fordi det traf saa ind, at vi bleve paa denne Kant bekvæmte med en Stoppe eller Græs, kaldet *Sveppa-Kal*, af den almindeligste Art, da anføre vi denne Post. Her falde fornemmelig 3de Arter: a) *Agaricus caulescens, pileo albo horizontali lamellis & stipite albis, Hestesvepp*, som er den almindeligste og bedste: den er uden al Smag og fast i Riidet: dens Hat er 2 Tommer breed; men Hoiden noget mindre. b) *Agaricus caulescens, pileo supra plano subconvexo horizontali ex albo subrubente lamellis concoloribus stipite albo.* Den kaldes ogsaa *Hestesvepp*, og forbyttes med den anden, hvilken iffun findes paa tørre og grunsaagtige Lyngmarker, da denne derimod vorer i en feedere Jord. Størrelsen er den samme, og den sidste synes at blive en *Champignon* Fl. Sv. 1045. c) *Agaricus caulescens, pileo subconvexo supra ex albo sanguineo, in medio sæpe depresso, Røddeskula.* Dens God er hvid, og Lamellerne hvide ansigtfarvede. Den er den smukkeste af de Jslandske Svampe, dog mindre end de forrige, og vorer paa tørre Mosses-Bakker, hvor der er intet Græs. Foruden de ovenmældte, nævnes endnu een Art, som kaldes *Bleikkula*; men jeg har

har ikke seet den. Dens Farve skal være blegagtig overalt. Den vover paa Græsmarker, og spises kun norder paa. Maaden at tillave Svampe er denne, som er den samme overalt: Joden, og den yderste tynde Rand af Hatten, kaster man bort; men Lamellerne og den øverste Hinde beholdes: Hatten vaskes ud i reent varmt Vand, kaages derpaa med lidet gærret Valde, som er spædet med Vand, og Smør til; men der bruges ikke meer af Valden, end Svampene kunne trække til sig, hvilke under Kaagningen stødes eller hakkes, og da kommes Smøret paa. Nogle faa stoe lidet stødt Peber over Stoppen, og dermed er Retten færdig, som smager ganske godt, og er derhos ikke usund, naar kun Svampen tages i den rette Tid, kaages eller indsyldes fersk, og man ellers bruger den fornødne Forsigtighed. 8.) Jordbær findes i Skagsefjorden, men i liden Mængde, f. Ex. paa Thorderhofde. Saa som denne Frugt er rar, og faare lidet at faae af den, er den paa Nordlandet og andre Steder meget afholden. Bærene knuses lidet i kaagt Gløde eller Saaremaak, og fremsættes saaledes, da de og agtes for en meget lækker Spiise. 9.) I Desfjorden eller Badle:Syssel vover paa nogle Steder *Viola martis (tricolor)*; og kaldes af nogle, uden Tvil efter den Tydske Udtale, Sjola. 10.) Madra, var et Urtes Navn, som var glemt i Island; men een af os, nemlig Biarne Povelsen, ved at give Algt paa de Steder i Landet, og især Nordlandet, som ved den første Beboelses-Tid, have faaet Navn deraf, f. Ex. i Desfjorden Madrefell og Madrevalle, og derved at opdage, at der gjærne vorede paa de tørre Ruine Gallium flore luteo, har bragt det for Lyset igien. Vi finde endda ikke ganske fuldkommen Bished herom, forend vi i nogle nyelig udfomne Urtebogers funde samme Navn paa Gallium, hos de Svenske og Norske; end-

fiønt det, som sædvanlig, ved den til meere Blodhed forandrede Udtale, viger noget herfra. At Huusholderster og Bønderkoner i Østfjorden og paa flere Steder, hvor den gamle Madre vøper paa Tuunene, komme saa tidt til forr, ved det Mæssen usfordømtlig løber i Øst, er ikke at undre paa; endfiønt baade *Pingvula* og flere Urter i Island, ere bekiendte for at frembringe den samme Drikning. Dette Tilfælde kaldes paa Gruentimmerets Sprog *Galler*, og man maae iblandt tage det for ildefindede Naboers Hæderie, naar man ikke veed de naturlige Aarsager. Endve andre Tilfælde som Madmodre plages med, og kunne vedholde i nogle Maaneder, tilskrives ogsaa overnaturlige Aarsager, endfiønt rimeligst Kreaturenes Foder aleene er Skyld deri; nemlig naar Floden i Kiærnebyttten ikke kan stilles ad til Smør. I Norge veed man og at sige af denne Banlykke (see *Sondm. Beskr. p. 376.*). Ja endog i Sydskand (see *Graenz. Lex. Tit. Messer Dreykreuzig*). Ligeledes gaar det om Vinteren med Floyter eller Graademæsk, at Bønderkonerne kunne ikke faae Lobemælken til at høves op i tæ og restkaffen Graade. 11.) *Grøde: Sura*, *Plantago Mervia* (§. 257. d), vøper ogsaa i Østfjorden, og er bekiendte der, ligesom i andre Lande, for en god Læge-Urt til Saar og Bylder. 12.) *Miadurt*, *Ulmara*, vøper ved Thvera, men er ellers noget rar nord paa. 13.) *Hvønn*, *Archangelica*, findes vel paa nogle Steder af denne Landkant; men især har den yderste Bynt af Syffelet, *Hvaann* daler, faaet Navn deraf. 14.) *Kræda* kaldes en Urt af Fiældgræs, nærslegtet med den bekiendte *Musco Islandico*, og er *Lichen foliaceus minimus ascendens ramossil. folliis angustissimis convolutis perplexis*, og synes at blive den samme Urt som *Auctorum Coralloides tenuissimus nigricans* (see *Spec. Plant.*

pag. 145. 30. 7). Denne Art findes vel paa mange andre Steder i Jsland, men i største Mængde nord paa, hvor den egentlig bruges til Huusholdningen: allermest og flittigst bliver den samlet af Østfjordens Indbyggere, paa de høieste Fjældklipper. Denne Lichen behandles og tillaves paa samme Maade, som Fjældgræs (§. 248-54 og 590). 15.) *Thingoe* Syffel voxer de fleste af de opregnede Urter, saasom *Millefolium* overalt. Paa *Theslerøke*, hvor der ere mange kaagende Rindvæld og en stærk Fæde i Grunden, staaer denne Art deilig med hoi Purpurfarve. *Archangelica* falder her ogsaa paa nogle Steder; Vi funde den i Nuttsareviger 1752 den 6 Septembr. i stærk Kulde og tilfrosen Jord, hoit oppe i Klipperne, staaende i den beste Væxt. Om *Cochlearia* er før nævnt (§. 589.): den voxer og benyttes, ikke alene paa Grimsøe (§. 700.), men og paa mange andre Steder, paa *Tjornæs*, *Vangsnæs* og der imellem. 16.) *Veria*; *Urve*, er den bekjendte *Decandrist*, *Arenaria*, som ofte har 12 Stamina i Jsland. Den voxer paa næstbenævnte Stænkning, og kaldes i *Kelduhverfe*, *Smedius* *Kaal*; Tegn til, at Indbyggerne have anrettet *Kaal* af den tilforn, og nuomstunder lave de en Drik deraf med lidt suur Balde, hvorved Urten giæres, Saften sies siden fra og spædes med sodt Vand. Urten har meget tykke og faste Blade, hvorfor man og oftestes paa *Vesterlandet* (i *Sodlogsdal*) er falden paa at lave af den Sobe-Kaal, som giver en sund og behagelig Spiise. Naar man ei bruger Salt dertil, smager den noget efter *Bomolie*, og det er ret arztigt, at det Ord *Smedia*, som *Nordlandets* Indbyggere fordem have givet denne Art selv, betegner saadan en Smag. 17.) *Korn-Sura*, *Bistorta* (*Polygonum* §. 590.), voxer meget i *Baardardal*, og er indtil for kort Tid siden bleven samlet og anrettet af

Indvaanerne sammesteds. At nogle paa Vesterlandet have begyndt at bruge den igien, har man tildeels disse Folk, tildeels Born, at takke for, som i deres Leeg gierne anrette Kornsuuren, hvor den salder, da den kommer Korn saa nær i Smagen. 18.) Blaaflucka, Campanula (Patula Sp. Pl. 163.), findes paa Gunnerstade, en Bondegaaard i Ehsfjelfsiorden. Urten horer ellers egentlig til Osterslandet. 19.) Burn, Rhodiola; Roden, knuset og ælter i lidt færf Smer, bruges paa disse nordligste Steder, som et ypperligt Anodynum udvortes, især hvis det bliver varmt paalagt. 20.) Rinebær, Juniperus fruticans, findes her paa nogle Steder; men Bær i allerstørst Mængde giver den paa Thingøe, det af Skiafsandefoden omflødte Stykke Land, som Syssellet har faaet Navn af.

§. 727.

Græstige
Steder og
Urtepladser.

Deilige Græs-Egne og heele Bygdelave findes mangesteds nord paa, endog saa paa de ode Fjælde, saasom Hverevalle (§. 706.) og de nordligste ode Udhuffer, f. Ex. den foranførte Hvanndal og Hedinsfiorden fort dervfra, hvilke Steder tilforn have været beboede. Ifigemaade Natfareviiger; disse Steder sættes gierne ved Siden af de saa meget udraabte frugtbare Strækninger paa Kysten ved Cap de Nord. Man har endog hort adskillige Tabler dervfra om Mælkens overmaade Feedme; Kreaturerne blive der meget flomme. Iblandt de græstige Egne i Bygden ville vi især nævne Midfjorden, Tungen i Skagefiorden, og Flioten sammesteds, et meget stort Bygdelav, hvor der dog staae over 50 gamle Gaarde og Jorde ode. Desfiorden holdes af de Nærboende for et mægt Landskab, den har og været meget bader i forrige Tiider, formedelft Indvaanernes Formuenhed og Jordens Dyrfelse; dog giver den endnu

godd

godt og kraftigt Græs, og Desfiordingernes Naboer i Krællingshviden, naaget deres Egns Frugtbarhed og andre Herligheder, staae dem ikke nær saa vel. Jslandet de fornemste Urtepladse pleier først og fornemmeligst Vindestol (§. 701.) at regnes; men saasom dette Udraab grunder sig meer paa Almuens Snak og Overtro, om visse Urter og Steene, end paa retskaffen Urte-Kundskab, saa er ikke meget at lide derpaa. I det mindste kunde vi hverken paa dette Fjæld, i Hedingsfiorden, eller paa andre Steder, træffe nye Urter, undtagen eetsteds ved Desfiorden østen til, en Thistul, hvoraf ingen Urter ere bleven fundne paa de hidindtil beskrevne Steder. Den er *Carduus Heterophyllus* Fl. Sv. 657. Indbyggernes har ve ikke gode Tanker om denne Plante, maaskee meest fordi den er saa rar: de sige, at den voper hos dem, som et Forbandelses-Tegn fra Syndesalder, og de regne det for et slags Banhæld, at deres Fødested, fremfor saa mange andre Herreder, frembringer saa afstyelig en Ur; men til al Lykke ere der kun saa og ifkun de eenfoldigste, som tage dem sligt nær. Vi have ogsaa sagt dem, at Desfiorden var ikke det eeneste Sted i Jsland, som havde denne Banhæld, og at de deiligste Steder i andre Lande, vare ikke fri fra en utallig Mængde ja mangfoldige Urter af disse Tidseier.

§. 728.

Skov er en betydelig Herlighed, hvilkken den største Deel af Nordlandet maa savne, især de 3de Eysfeler, nemlig Hunevands- Skagafiords og Badle-Eysfeler; adskillige Viile-Urter og Lyng vore snart allevegne. I Fells Sogn i Skagafiorden, og paa Nafkovs strand ved Desfiorden er endnu lidet Birk tilovers, som bruges til Kull. Reidehverfer har og et Stykke Skov, som kaldes Nafkog. Et lidet Stykke af Thingoe-Eysfel, nemlig Fniostedal, og det til-

Skov.

grændsende Lovaas Sogn, har altsaa heri en meget stor Fordeel, thi Sniofsedals Skov har betydeligt Fortrin for al anden Birkeskov, som findes i Island; thi omendskiont Huusfjells Skov (§. 258) kan give nok saa store Træer, blive de dog ikke nær saa ranke og neppe saa høie; men paa begge Steder mishandles Skoven lige stærkt.

§. 729.

Hav-
Uet-
ter
og
Jorddyr-
ningen.

Med Hav-Uet-ter og Jorddyrkning ere Nordlandets Indbyggere ikke komne vidt. Af Hav- og Stær-Væxter bruge de, som paa Vesterlandet, dem der ere adelige (§. 594.), og her ere at saae, som Weechang, Kerlingsøre, Myrekjærne og Sol, dog meest i haarde Aaringer. Den gamle Jorddyrknings Maade, i Hensigt til Græsmarkerne, er meestendeels forglemt; og især Bandleddningsmaaden, som, paa tørre Steder, har været meget brugelig, hvorfor man endnu seer Furer bevoxne med Græs, tværs og langs paa Tuunene, f. Ex. i Midfjord og Øsfjord, og paa dette sidste Sted veed man endnu at fortælle, hvad de ældste have hørt af deres Forældre, at der skal have boet en gammel Mand, som var saa kunstig, at han ved Læderbælge (eller smalle Sække) vidste at bringe Vandet langt bort og paa høie Steder, for i paa-faldende langvarig Tørke at giennemvæde Græsforden. Jord-frugter har man vist nok havt paa denne Kant, ligesom paa andre Steder. Ikke aleene de i det gamle Islandske Sprog bekiendte Talemaader om Raal, tiene til at bekræfte det, men og tillige visse Steder saavel i Historierne, som baade i de geistlige og verdslige Love, fornemmelig Jærnsiden og den bekiendte Jonabog. Om Kornavlingen der, er ligesaa vist, ja endnu flere Bewiiser derpaa, i de gamle Historier og Brevskaber. Men jeg vil kun, ved denne

Lei-

Leilighed, nævne et bekjendt Algerland; kaldet *Vitazglase*: det
 var en *De*, der ligger i *Defjordsaa*, og var en *Elid*, i det 10de
 Hundredaar, ret et *Twistens* *Wble* for *Naboerne* (see *Vigaglumss*
Saga). Det mærkværdigste er, at *Historien* udtrykkelig navngi-
 ver det, som den største *Herlighed* derved, at denne *Alger* blev als-
 drig ufsør, det er, at *Kornet* blev altid modent, rimeligt saæde
 det sig selv, og folgelig voxede der vildt, maaskee ogsaa af *Roden*,
 saa at *Eieren* ikke havde andet at bekymre sig om, end at meie det
 af. For nærværende *Elid* voxer der den foromnævnte *Arundo fo-*
liorum lateribus convolutis acumine pungente, hvilken *Korn-*
art er et Slags vildt *Rrug*. Vi have fundet flere *Steder* i *Jæ-*
land, hvor *Kornagre* have været, ja hvor man endnu seer de gamle
Algerreener. Nu er det vist nok, at de Gamle have faaet paa man-
 ge *Steder*, og folgelig ikke alene hjulpet dem med vildt *Korn*;
 Dog kan let blive *Spørsmaal*: først om dette *Korn* har udartet,
 og er siden blevet vildt og perenneus? og for det andet, om de ikke
 have vidst en *Maade* til at hjælpe *Naturen*, hvor de kun havde det
 vilde *Korn*, til at give aarlig en rlig *Kiærue*, enten ved *Gjødning*,
Banding eller andet? At der blev gjort *Forsøg* til *Kornavling* paa
Nordlandet, for nogle Aar siden, er endnu i frisk *Minde*. Et alene
 de fornemste og meest formuende indenlandske gjorde det, men og-
 saa udenlandske *Bønder*, som *Hans Kongelige Majestæt* til den *En-*
de underholdt og bekostede i nogle Aar, baade her og paa flere *Ste-*
der i *Jæland*; men alt dette kunde ikke hjælpe; de reisede bort igien
 med usorrettet *Sag*. Slutningen blev da denne, at *Korn* kunde
 ikke voxer der, og ved denne *Meening* bliver det endnu. I Aaret
 1755, da vi reisde over en Deel af *Nordlandet*, komme vi just til
 de fornemste *Steder*, hvor disse *Forsøg* bleve gjort, og *Sagen* stod
 endnu

endnu i Uvished mellem Frygt og Haab. Det var nemlig paa 4re Steder i Hunevands-Syssel, at vi besaae disse Gaarde, den 27, 28 og 29 Aug. Den første Gaard var *Vliedalsøringa*, hvor en Bondes-Familie fra Thyland var nedsat. Her var en Have med Raal og Maturter i temmelig god Stand. Den Ager, som her var optagen til Kornavling, var 39 Favne lang og 15 Favne breed; men der var intet Korn voret, undtagne nogle saa Planter begyndte da først at spiire op af Jorden. Det bør anmærkes engang for alle, at de Kornarter som man i disse Aar, fra 1753 til 1756, gjorde Forsøg med, vare fornemmelig Havre, Byg, samt Vinter- og Vaar-Rug. Hoved-Feilen var her begaaet i at udsøge Stedet, dog det var ikke Bondens Skyld. Man vidste, at den aarlig glødede seede Jord, nær ved Gaardene, havde vilst sig for geil, saa at Sæden kom hastig op, og fik en meget høi Stængel, men ingen Kiærne. For nu baade at undgaae denne Ueilighed, og tilslige at spare paa Høeslæts og Beede-Markerne, udsøgte Grund-Eieren, Sysselmanden i dette Herred, en meget maver og tør Plads, af det Slags, som man i Jesland kalder *Holts-Mo*, i Tanke at den skulle giøre den samme Tjeneste, som Lyngheede-Jord, paa Jeslandst *Lyng-Moar*: Græsset var her mestendeels visnet bort; der var vel noget grønt iblandt, men meget lavt, tørt og ganske udartet. Den sorte gode Madjord var fortaaret, og ikke andet tilbage, end en ganske maver rødbleegagtig Leerjord, som paa Jeslandst kaldes *Aur*, og er meget offter-artet, siur og kold. I Norge har man endnu det samme Dreb, omtrent paa den samme Jordart. Men dette er at mærke ved den Jeslandst *Holts* eller *Steenbakke* *Aur*, at den, fremfor den Nordske, gemeentlig er meget skarp og tør, fordi den har Pimpsteensand ved sig. Det værste ved bemældte

Ager

Nger var endnu dette, at Laget af denne Jordart var kun 1 Fod tykt oven paa Holtet. Holt kaldes middelmaadig hoie Bakker og Strækninger, der bestaae af smaa og iblandt store Steene, giærne bevoxne med mædret Græs, og i Fjældbygde eller hoiere oppe, med Moss-Arter, Sphagnis, Hypnis og Bryis, oftest med noget Luusfelyng (*Empetrum nigrum*) iblandt. Holte findes snart overalt paa det flade Land, deels paa Græsmarkerne, deels paa de sumpige Steder, og ere giærne aflange.

I Nabningen af Wiidedalen havde Stedens Sysselmænd udsøgt tvende andre Jorde eller Bøndergaarde, een paa hver Side af Elven, nemlig Næs og Wærdernup, til Beboelse for andre Jydskke Bønderfolk. Her vare de samme urigtige Forholdsregler lagte til Grund, og en Holtemo optagen til Ngerland, hvorfor der intet voksede. Egnen allevegne der omkring var smuk og græsrig, og syntes meget bekvemmere til at giøre Forsøg med. Det siende og fornemste Sted i dette Syssel var Thingore-Kloster, hvor Sysselmændene boede. Her var en stor Have med Raas og andre Madarter, der stode temmelig godt, ligesom paa de næstomnede 2de Steder. Haver til Kloster-Urter have ellers været paa Thingore i lang Tid, og henved Aar 1700 i allerbest Stand, da en Dansk Laugmand, navnlig Lauritz Gottorp, boede her, og drev den Jødske Huusholdningsmaade, tilligemed den udenlandske, saavidt han fandt det tjenligt og fordeelagtigt, satte Gaarden i god Stand og blev riig derved. Den Sysselmænd, som nu boer paa dette Sted, navnlig Biarne Saldorsen, havde her, paa to ulige Steder, ladet saae Korn. Paa den nordre Side af Gaarden, i saadan en Holtemo, som nylig blev beskrevet. Jorden var her i Forveien meget forbløst, ved det (som tidt seer med Holtefjord) de vedholdende,

de Vinde rive Huller i den tynde og løse Jordbær, hvorved Jorden tørres, og saasom den i sig selv er kun tør og stovagtig, blæser den bort. For dette at forebygge, havde han ladet giøde Algeren noget, hvilket vist nok er ganske umisteligt paa saadanne Steder, ja Gødningen skal være baade god og overskødig, om det skal hjælpe. Men her brugde man Koemøg, som ei alene giver stærkt Ukrud af Alve, men har desuden ikke Heede eller Heedme nok ved sig, til at giøre Auren eller den offeragtige Leerjord frugtbar. Jordens Tykkelse af 1 til 2 Fod paa saadan en steenagtig og kold Grund, er og alt for liden; thi neder i Grunden paa de fleeste Holte er Urd, det er sammenkastede store Steene med mange Mellemrum, hvor Luften har sit Træk. Dette bliver da endnu een Aarsag til, at slige Steder ere kolde, og Vandet, som enten regner eller stænkes paa Algeren, bliver strax borte. Sæden var her dog voksen temmelig høit i Halm, men havde ingen Kiærne. Det andet Sted havde en god frugtbar Jord: det laae i Luuet tæt ved Gaarden, og vendte imod Sonden. Denne Plads var kun liden, men Sæden stod her godt: Stængelen var maadelig hoi, og havde temmelig Kiærne; men siden den ikke blev haard, blev Halmen med alting brugt til Foder for Kreaturene. Paa Holum Bispestoel blev gjort et lidet Forsøg, hvilket gik ligesom sidstbemældte paa Thingore; man havde og høst og her paa andre Steder nedkastede nogle Korn for Nysgierrigheds Skyld. Paa Millebø Præstegaard voksede nogle Stængler paa den søndre Kirke-Bøg i Lee af Tager, og her havde de suldboorne Aa faaet en riig Kiærne. Men da flere saadanne Forsøge forekomme paa Sønderlandet, saa ville vi til Slutning give nærmere Betænkning om denne Sag. I Hiorten paa Bard Præstegaard var Aa temmelig voksen i en liden Have.

Ellers

Ellers findes ei Kaalhaver paa Nordlandet viidere end hidindtil er mædet. Men at det kunde blive meget nyttigt for Indbyggerne paa denne Kant, at lægge Bind paa Jordens Dyrefelse, og komme i med at bruge Jordfrugter, det er og bliver diensynligt, allerhelst siden Fiskeriet slaaer saa meget feil, og de maae hente en stor Deel af deres Livs Ophold fra andre Steder.

Indvaanerne.

§. 730.

Om deres Legems Bestaaffenhed og Sygdomme salde her ikke meget besyndteligt at sige. Nordlandets Indvaanere, ligesom andre nordlige Folk, der ere vante til Kuld, reen Luft og Bævergælle, have gjerne sunde Legemer. Deres Hoide og Forligthed er forskiellig, og man kan ikke sige at de ere hoiere end Folk paa andre Steder i Landet. De Sygdomme, som sædvanligst overgaae Island om Hosten og Foraaret (§. 34, 273 ic.), findes her ogsaa: Guulsott mærkes her tidt. Men Brystsvagheder ere her ikke saa giængse, som sonder og vester paa, ikke heller Spedalskhed (§. 494 og 578.) eller den med samme nærslegtede Skjørbug. Dette have Nordlanderne deels deres Himmel-Egn at takke (§. 701., 709. og 710.), deels den Levemaade, som Noden har lært dem, ved det de idelig maae rore dem, ride, og gjøre lange og besværlige Reiser til andre Herreder, og ikke nær saa tidt eller almindelig fare paa Soen eller blive vaade, og endelig kun lidet og sielden spiise blod eller færsst Gist. De Spedalskes Hospital paa Nordlandet er Maadrefell i D. fiords-Eyssel: der har nu i mange afsigte Nar ikkun været een Syg og meest to, ja undertiden slet ingen. I forrige Tiider, da der var god Fiskefangst paa mange Steder norder paa,

Deres Legems Bestaaffenhed og Sygdomme.

vare her ogsaa flere Brystsyge, Spedalske, o. d. Ja, i de allerførste Tider, har man endog vidst af denne sidste Svaghed paa Nordkanten, hvilket de haandskrevne Historier vidne om. Dette er dog egentlig kun at forstaae om Mandfolkene; Fruentimmerne derimod have ikke nær saa god Helbred; thi *Obstructio Menstrum*, især hos de ugifte, er meget almindelig baade her og paa andre Steder i Island. Den alt for stille Levemaade synes at være den fornemste Aarsag; thi foruden det, at Qvindfolk have her ingen Forlystelser, eller Forandringer i Levemaaden, hvorved de blive tvungne, taase og tungsindede i al deres Opførsel og Omgang; saa kan det ogsaa giøre meget, at de, undtagen en kort Tid om Sommeren, blive jævnligen inde og sidde ved deres Arbeide i Uld eller andet. Hertil bør lægges, at de i Almindelighed hverken sidde paa Stole eller Bænke, men paa det flade Gulv eller Loft, paa et Taarestind, Matte eller Pude, ligesom bekiendt er at Skrædderne sidde. Ja der ere endnu flere smaa Omstændigheder, som maafee giøre sin Deel til dette Kiøns slette Helbred, endskjønt ingen mærker dem, eller agter dem noget værde. Hoved-Grunden bliver vel den anførte, og Sagen i sig selv ikke af liden Vigtighed, i den Tilstand, som Island nu befinder sig. Ellers kunne Nordlænderne troste dem derved, at de miste ikke nær saa mange af deres Børn, som hine vester og sonder paa. Den foranførte Børne-Sygdom (§. 34.) vilde de her ikke af, og sielden af de Tilfælde, hvorved saa mange spæde Børn paa Vesterlandet bortrykkes (§. 600). Mange af Nordlænderne naae og en temmelig Alder (§. 559).

§. 731.

J Hensigt til Sindets Bestaaffenhed ville maaffee ikke alle Sindets Beskaffenhed. Komme overeens: Nordlandet har saa vidtloftig en Strækning, og Jndbyggene i hvert Syffel have noget for dem selv, saa at deres Sæder falde meget ulige. Man tillægger gierne i Island samtlige Nordlandets, ligesom andre Gierdingers Jndbyggere, een og den samme Tænkemaade, og især lægges Skagefiordingerne dette til Last, at de have meer Lyst til at flakke omkring, og prange med Heste og andre Varer, end at arbeide hjemme og passe deres Huusholdning; at de ere de største Pralere, hengione til Druffenkab; Slagsmaal, Losagtighed og Bedragerie i Kiøb og Sal, med viedere. Men alle Fornuftige ville vel finde, at det er en stor Ubillighed, at give heele Nordlandet, eller disse Folk især, saa slet en Character; thi ingen kan nægte, at der jo i Skagefiorden findes mange fliffelrige Bønder og andre Folk, der fortjene en Character, som er ganske tvært imod. Men saaledes haver den ubesindige Almue, maaffee ved et vist Tilfælde, tillagt de andre Gierdingers Beboere andre lige saa lastverdige, som usandsfærdige Characterer; thi at der kunne, desto værre, findes i hvert Herred nogle slette Mennesker, som slige Kiendetegn fuldkommen passe sig paa, kan ei afsigjøre den Sag, skient det bliver alt for sandt. Bore Tanker om Nordlandet, og da først om Hegrenæs-Syffel, ere som følger. I gamle Dage vare de anseete for flakke Folk, der elskede meget deres Frihed, og holdte meget over den. At de havde en Biskop, og i visse Maader Jurisdictionen for dem selv, styrkede dem i disse Tanker; thi det er overalt gaaet saaledes i Island, at hvor der ere opkomne mægtige og yndede Øvrigheds-Personer, da have de havt stor Medhold i de fornemste Herreder i Landet: deres Underhavende have

bryttet dem deraf, og ere derved blevene stortalende og dristige mod andre. Scurlunga-Saga viiser Exempler nok herpaa, saavel overalt, som især sonder og vester paa Landet. Men nu i disse Tider er det blevet ganske anderledes. Nordlandet haver udsaaet meget, og Indvaanerne ere ganske blevene forandrede fra det forrige. Hunger og dyr Tiid, i haarde Aaringer, haver nodt dem til at søge deres Næring paa andre Kanter af Landet, og visse store Sygdomme have givet nogle Bygder nye og foranderlige Beboere: Dette kan siges om den største Deel, men dog især om Skagefiorden, og dernæst om Hunevands-Syssel. En forfærdelig Pest borttog i Aaret 1496 en stor Deel af Indvaanerne, saa at Bygden paa mange Steder var ganske uden Folk. Og siden det traf saa underlig ind, at denne Pest kom ikke til Bestfiordene, thi den standsede ved Silsfjord, da drog en stor Mængde af fattige Folk derfra til de 2 nærmeste Sysseler i Nordlandet, og især til Skagefiorden, og satte sig ned paa de øde Gaarde, hvor dem selv lystede. En berømt Annalist vidner, at Nordlandets Bonder vidste endnu i Aaret 1639 at regne deres Herkomst fra disse Folk i 4de og 5te Leed. Dette har da indført en forandret Tankemaade. Men der er atter stor Forskiel paa de 4 Sysslers Indvaanere indbyrdes, og overalt giver man hvert Sted Character i andre Herreder, ligesom de, der komme derfra, føre dem op til. De fra Skagefiorden heede da næsviise, stortalende m. v.; de fra Bestfiorden stille og stikkelige Folk, og de fra Hunevands-Syssel midt imellem begge. Om dem i Norder-Syssel tales ikke; thi de reise ikke til fremmede Herreder. Men fordi de af Skagefiorden reise i størst Antal til Sønder- og Vester-Landet, ved det de have Mængde af Peste, og haarde Aaringer trykke dem mest, da tales mest om dem. Til saadanne

Danne Reiser bruge de de hurtigste af deres Folk, som ofte ere unge, ubesindige og ryggesløse, saa at de undertiden komme i Trætte med dem de søge til, og siden bag efter, helst naar de ere bestiens fede, giøre dem til af disse Lyder. Dette har da givet den fornemste Anledning til ovennævnte slette Character. Det kan heller ikke nægtes, at jo alt for mange af disse Reisende ere hengivne til Druffenskab og adskillige Laster og Uordentligheder, som følge med samme. Eigesaa lidet nægtes, at der jo, iblandt de gode, ogsaa findes slette Bønder i Skagafiorden, der have meer Lyst til at slaae omkring, end at blive hjemme, og holde derfor, saa længe de kunne, deres Heste vel fodrede, men Køerne blive mavre; deres Koner og Børn lide dog meest ved denne slette Huusholdning. Men med at tilstaae dette, forurettes dog ikke de retfærdige Indbyggere, hvilke for bleve nævnte, og som, i det mindste hjemme hos dem selv, udgiøre det største Tall. Man tillægger heller ikke Skagafiordingerne alene alt det som er lastværdigt; thi Druffenskrabet, og deraf følgende Lyder, mærkes alt for meget baade paa en Strækning af Sønderlandet, saa og ved Vesterjökelen, skönt sligt har taget meget af paa dette sidste Sted. Gemytsarten finder man i Dale-Syssel og paa flere Steder af samme Slags som her. Hunevands-Syssels Indbyggere ligne tildeels dem i Skagafiorden, tildeels dem paa Vestfiordene. Vestfiordingerne komme meget overens med dem i Vørgesfiorden i deres Sindsbeskaffenhed, i deres Huusholdning, og tildeels i Levemaaden; de ere af Naturen meget stille og forsigtige, flittige i deres Arbeide, tarvelige i deres Huusholdning, og artige i deres Omgang, baade indbyrdes og imod Fremmede. Deres Naboer i Norder-Syssel lægde dem paa, og de, som boe nordligst og længst borte, ligne meest Indbyggerne i Norderdeelen af Vestfiordene.

Huise og
Bygninger.

Bygningerne paa Nordlandet ere, efter Landets nærbørene de Tilstand, temmelig gode, store, rummelige, og vel indrettede inden i. Drivetommer falder her paa mange Steder, og de brees de Huise kunne bæder staae nord paa, end sonder paa Landet, fordi her ikke falder saa langvarig Regn som der. I Østinden kunne de staae længst; thi Grunden er der fast og tør, og Grønsværen, som tages til Bæggene, ligeledes. Man bruger her hverken Steen eller tyk Grønsvær, men tynd, til de store Huise, og derfor groer Bæggene sammen i eet, og naar Grønsværen ikke spares, og Bæggene er tyk, da kan den staae i 50 Aar eller meere. Paa 2 Gaarde bleve os viiste Øndvegs-Suler eller Høisædes-Stotter, som en rar Levning af Alderdommen. Man bruger disse Stotter, saavidt os er bekiendt, paa intet andet Sted i Jesland. De bestaae af 2de Stolper, som staae paa begge Sider af Indgangen til Bæren eller Gaarden; de blive smiallere og smiallere op ad, og rage henved 3 Alne over Taget: overst paa dem staaer en udskaaen stor Knap, eller og et gammeldags Klæmpenhoved. Herved ere dog 2de Ting at anmærke: først at disse Stolper vare ikke gamle, men, af de den Tid levende Eiere, fornyede efter den gamle Form. Dernæst angaaende Ordet, at da disse Stolper tage Navn af Øndvege, eller Høisædet i Stuen, saa synes, at de burde staae der, paa begge Sider, og naae høit op igiennem Taget, saa at de, der komme til Gaarden, kunde strax uden fra viide, hvor Høisædet var, eller hvor Høsbonden var at faae i Tale. Man holdt det for anseeligst, at have disse Suler meget høie. Et Sted i Landnama-Saga (Part. 2. Cap. 23.) vidner endog, at en af Vesterlandets første Beboere offred sin Son til Thor, eller, som Ordene lyde, gav ham til denne Afgud,

Afgud, for at han skulde skaffe ham Øndvegss-Euler, hvorpaa et Træ drev til ham, som var 63 Alne langt og 2 Favne omkring i Tykkelsen. Det fornemste Sæde i Afguds-Templerne blev ligeledes betegnet med slige høie Stager, og af et Sted i Eyrbyggja-Saga er det klart, at der have de Gamle ikke havt deres Øndvegss-Euler før Indgangen til Huuset. At man ogsaa har brugt høie Dorstolper, synes et andet Sted i Landnama-Saga (Part. 3. Cap. 19.) at bevise, og maaffee denne endnu brugelige Maade paa Nordlander, er en Levning deraf. De daglige Huuse, deres Orden og Indretninger, samt de andre Huuse, Hestes Køer og Gaardestalde, med videre, komme meest overeens med det, som for er sagt (§. 36).

§. 733.

Spiisen og Diæten er vel noget forskiaellig paa Nordlandet, ^{Spiise og} hos dem, der boe nær ved Søen, og hine paa Øplander: det meest ^{Diæt.} kommer dog overeens med Sønder- og Vesterlandets Indvaaneres (§. 37, 278, og 602). At Levemaaden i gamle Dage har været meget ulig den nuværende, kan beviises af Historien. Den største Deel af Nordlandets, ligesom andre Øplandets Indvaanere, spiste meest Mælkemad, Ost, Smør, Skior, Fløter, Striug, varm Mælk, o. s. v., og Kiød med lidet Brød, samt anden Mad, lavet af Korn. Og dette sidste, tillige med Færsk, blev især brugt paa de Tiider og Dage, da man ikke maatte spiise Kiødmad. Ved Søekanten havde Indbyggerne meer af alle slags Fisk, baade tør og blød, eller særsk. Unge og friske Mennesker søgte især til nogle Fiskerpladser, ligesom i de Tiider var brugeligt, paa andre Steder i Landet (§. 636 og 37). Især nævner Vandamanna-Saga Batsnæs (§. 698), og af endel Steder i Sturlunga-Saga saaer

denne Sag endnu nærmere Oplysning. I Norder-Syssel drev man og paa Fiskeriet, fordi der var stor Fordeel ved at gaae derfra til Desforden, naar det lakkede imod Fasten, for at sælge Rav og Ræking, Skreid, eller Tørfisk, Hvalspæk, Haakall, og andre Fiskevarer til Desfordens og Skagefiordens Indvaanere. Hertil brugte man store Baade, og Markedet stod paa Gaasøre, fort uden for den nu brugelige Akerøes Havn. Den gemeene Mand brugde vel Blanda (§. 48.) til daglig Drik; men til Helligedage havde man Æll. Man bryggede selv overalt i Landet, men Miod og Malt fik man gjerne fra Norge. I det 13de Hundredaar begyndte de Fornemme at føre og bestille Viin til Landet, for at bruge det til Gæstebude, og tiidlig i det 14te maaldes derom i Norge. I disse Tiider bruges ickun lidet af Riidmad paa Nordlandet, imod de forrige, men derimod en god Deel af Mælkemad; aleene at Ost er meget gaaet af Moden; ja man har endog glemt baade her og paa andre Steder at omgaaes og tillave Ost paa den gamle, og endnu i andre Lande brugelige Maade. De øvrige nysbemældte Sorter af Mælkemad bruges der endnu, og især laver det Nordlandske Fruentimmer meere af Striug, end hine i de andre Landets Deele. Striugur synes ellers at være de Norskes endnu brugelige Mysses brym (se Søndm. Beskr. p. 377.); den frembæres deels med Floyster, deels mænger med Skiot, og er meget suur og drol for en Arbeider; den vil soulne op i Mæven, saa at hvis En spiser for meget, faaer han ondt deraf. Haard eller tørret Fisk bruges nu daglig til Spiise paa Nordlandet, og Blanda til Drik. Indvaanerne fra Hunevands- og Hegrenæs-Sysseler, og tildeels fra Desforden, hente Fiske med stor Besværlighed og Bekostning fra Sønderlandet og Vesterjökelen; hvorefter de i Thingøe-Syssel og endel i Desforden
hielte

hjelpe dem med det, de faae hjemme, og disse, som rimeligt er, befinde dem langt bader derved. Det var at onske, at de forste vilde forandre Denne kostbare og kummerlige Huusholdning; thi derved vilde vist denne store Deel af Landet komme i Velstand. Det sagde me var og hoist nødvendigt paa mange andre Steder, og dertil vilde ikke behøves store Penge: næst vor HErres Belsignelse, kunde Fornuft og Kyndighed, foreenet med Iliid og Bestandighed, giøre det allermeeft. I Madens Tillavning ere de Nordlandske Fruentimmer reenlige. Brændselet er meeft Torv, og paa endeel Steder Lyng og Krat-Riis. Saudatad, eller torret Saarenmog, bruges iblandt (§. 606).

§. 734.

Angaaende Inderbyggernes almindelige Arbejde, kommer det meefte overeens med det, som er maeldet om Kiosar-Syffel og Borgersfjorden (§. 50-56 og 280-84.), især i Henseende til Landarbeidet paa alle Aarets Tider. Folgende er aleene at anmærke især. I Hunevands-Syffel fanger man overalt Silunger eller Foreller, saasom denne Fisk falder der i stor Mængde; og hvis der vare flere Folk, og Fangsten blev drevet paa den gamle Måde, kunde mange flere leve aleene ved denne Næring. De fornemste Fiskersteder ere Balkenæs, Batsnæs og Skagen (§. 698.), samt Ilioten paa den vestre Kant af Nordlandet. Over Mangel paa Arbeidsfolk klages allevegne i Jsland, men især norder paa, i Borgersfjorden, og hvor man ikke kan leve, uden at drive paa Landvæsenet; og siden Jsland giærne har større Antal af Qvindfolk end af Mandfolk, saa fattes meeft Arbeidskarle: man bruger dem paa Nordlandet til lange Reiser, baade om Efterhøsten, da endeel blive borte, for at fiske, den heele Vinter, ja indtil St. Hans Dags Tid, der,

Almindelige
Arbejde.

og om Foraaret, til ud paa Sommeren, da endog Bønderne selv, og de hjemmleblevne Arbeidere, maa reise til Sønder- og Vesterland, for at hente de andre, tillige med den samlede Torsfisk. Der kunne da være 3, 4 og flere Bønder, eller deres Fuldmagtige, i Selskab, og have 20, 30 til 40 Heste med Byrder: De bringe med dem adskillige Varer, f. Ex. Smør, Røder, dog meest uden Gods, som de sælge til Søekantens Beboere. Af dette sidste Slags Varer, samt af den afblede Torsfisk, sælge de ogsaa noget til de Danske Handlende, som komme længe for til Vesterjokelens og Sønderlandets, end til Nordlanders Havne. De tilhandle sig herimod noget Meel, Jern eller andet nødvendigt, hvilket de da bringe hjem. Men disse Reiser kunne, formedelt indfaldende Regnveir eller andre Forhindringer, være ud paa Høstlæts-Tiiden, til største Skade og Uleilighed for disse Folk. Den Mangel som Nordlandet og Borgersfjorden har paa Arbeidskarle, især om Sommeren, erstattes tildeels, i det endel ledige Personer, eller Tjenestefolk, søge derhen sonden og vesten fra, i denne Tid, da Fiskeriet ikke drives hos dem; disse lade dem betale ligesom de arbeide til, 4 Mk. Croner til 1 Rdt. Sp. om Ugen, foruden Kosten, i Penge, Smør, levende Gaar og Badmel (§. 505). Dette som hidindtil er næst om Hunevands-Eyfel, gielder ogsaa om Skagetsfjorden, hvor Indbyggernes tillige fiske hjemme hos dem selv heele Aaret igiennem paa Skagen og i Fliotene, og om Sommeren ved og uden for Drangoe; thi de Nærboende have Lov til at fange Drangøens Alker og Biærgfugle paa Eeen, og derhos vexelvist at fiske. Der have endog været Bønder i Hunevands og Skagetsfjords Herreder, som i de sidste haarde Aaringer have holdt meget vel ud, ved at bruge hjemme hos dem selv alle muelige Udveie, til at holde dem og deres Folk

ved Live. Haakallefangst drives paa Skagen og i Flotene med største Flid. Men man klager her over, at Fiskertiden er forandret; thi nuomstunder er den bedste Tid, paa Nordlandet, om Sommeren, fra St. Hans Dag til i December og Januariis Maaneder; i denne Tid, og længer ud paa Vinteren, fanges ogsaa Haakallen. Tilforn derimod gik Fisken ind til Landet betimelig om Foraaret; men naar den slemme Hav-Jis besøger Landet, da forrykkes saavel Fiskeriet, som Aarets Tiider (§. 645 og 710). Paa Hofdestrand og tilgrændsende Bygder fanges jævnlig Sælhunde, deels med Garn, og deels med Harpuner. Desfiords Syffels Indvaanere have ulige Arbeide og Næringsmaader. Deres Landvæsen drives godt paa endel Steder; der ere ikke mange, som reise til Sønderlandet, eller leie Arbeidsfolk derfra. Deres fornemste Fiskersteder ere Nafsfjord, Siglenæs og Svarfeddal, og Desfjord imod Vesten, og Østen for (endskjønt den største Deel hører til Ethingøes Syffel) Hofdahverse, Laatrestrand, Flatoe, og paa Pynten Siogretaa (§. 700.), de 2 Fiorde, Thorgerdsfjord og Hvalvatsfjord. Til disse Steder søge Folk, deels for at kobe Fisk, deels for selv at fiske, da de dog ikke blive længer borte end 14 Dages Tid, og meest 1 Maaned. Hav-Foreller fanges her i Trækfegarn i Stranden, hvor Grunden er høj, lige og bedækket med sort Sand. Denne Fangst drives paa Svalbardsstrand med stor Fordeel. I Skagfjorden bruges ogsaa samme Maade, og det var at ønske, at den blev indført paa alle de andre Kanter af Jsland, hvor man veed at Ørreden gaaer i Mængde til Landet. Fra Grimsoe kommer ogsaa Torsfisk til Desfiords Syffel. Lodna (*Clupea lineata laterali prominula villosa*) er et Slags Sild, som ingen i Landet, uden alene Desfiordingerne, bruge til Spiise, men de have

stor Nytte deraf. Dorfsken søger stærkt efter den; og, om Foraaret ved Kaarsmisse, nye Stiil, jager den ind i Fiorden, hvor den ligger om Ebben paa det Torre, i saa stor en Mængde, at Naboerne falte den ned i Kar, og saaledes forvare den, for at spiise den efter haanden. Denne Art bliver nok de Dorfskes Lodde, som i Pontoppidans Naturl. Hist. p. 217. ommældes, endskjønt vi af Beskrivelsen ikke kunne faae nogen Visshed derom. Den falder ogsaa paa Sonderlandet i Jesland, men man har der ikke saa stemme Tanker om den, som benævnte Skribent. Stanken ved den særste Sild er ikke forgiftig, og befindes her ikke stærk. Den er som af Giftrøen, og gaaer ganske bort naar Fisken kaages; Vi have for denne Beretnings Skyld bestilt den levende, for at viide Sandheden; den er 4 til 5 Tommer lang. Desfiordingerne ere gode Harpunere. De fiske paa denne Maade ikke alene smaa Hvale, Andenæbber, Hofrunger og Niser (§. 660 og 661.), men ogsaa Bandede fugle, hvilken sidste Jagt ikke er brugelig andensteds i Jesland. Den Sælhund-~~Art~~ Art, som her fanges, er Vade-Sæl (§. 653. b). Naar Hav-Risen kommer, dræbes en Mængde af den, ei alene i Desfiorden, men ogsaa i Skagesfiorden og Norder-Syssel; man slaar den ned for Gode med lange Rieppe; den harpuneres ogsaa i Desfiorden, baade Winter og Sommer, thi den kommer her 2 Gange, først efter Juuletider, da den bliver borte i April-Maaned, og kommer efter 3 Uger igien. Denne sidste Gang bier den kun 14 Dage, og bliver derpaa borte heele Sommeren. Til denne Jagt bruges Firsmandsfar med 6 Mænd paa; de 4 roe, den 5te sidder ved Roret, og den 6te staaer foran i Baaden med Harpunen; Roerskartene bryde Narene sagte i Vandet, og ingen Allarm giøre, for at kunne komme nær til Badet eller Sælhundehoben, som svømmer

i en Orden, der er meesten trekantet, med Spidsen foran, og gaar gjerne lige frem. Naar en Sælhund skydes, dukke de andre under, og da giver man Agt paa hvad Vel Sælkongen tager; thi under Bandet have disse Dyr heller ingen Bendinger. Man gjør af med den skudte, det snarreste muelig er, og derpaa røe Jægerne det bedste de kunne, for at indhente Baden igien. Hvis Fangsten gaar lykkelig, kan en Baad faae 6 Stykker om Dagen, men undertiden faae de og slet ingen. Man har 2 Harpuner ved Haanden; den eene for at skyde forst med, den anden for at trække Dyret desto vissere til Baaden. En Bade-Sæl giver jævnligt 1 Centsner Spæk, og de største og fedeste 14 Fierdunger eller 140 Pund. De Fugle, som her fanges, ere Svartfugle (§. 673.), som komme hid næsten lige saa tiidlig paa Varet, som Sælhundene. Til at skyde dem bruges en Stang, 5 til 6 Alne lang, med et smalt træehaget Jærn i Enden. Svartfuglen er ved denne Tiid saa fed og tung, at den ikkun besværlig kan flyve. Naar Hav-Jisen kommer, kan man endog tage den i 100de Tall; thi den sidder paa Jisen ganske stille, og ligesom uden for sig selv (§. 673). De foranførte Hvalfiske fanges kun sielden nuomstunder, meest fordi Baadene ere blevne saa smaa og svage; ellers haver man her brugt den samme Maade, som paa Vestfiordene, med at gjøre Baaden fast til Hvalsen. Niser eller Marsvin skydes med Harpuner, ligesom Sælhunde. 3 Thingoe-Spysser har man adskillige Næringsmaader. Alles vegne i Baraaen og flere Bunde falder skion Læsefangst. Ørreder og Foreller falde og paa mange Steder, og fanges saavel i Strandene, som oppe i de ferske Søer. Bygden omkring Myvandet noies aleene med denne Fiskefangst (§. 703). Saltvands-Fiskeet drives meest paa Siogretaen, og snart alle vegne i Spysslets østlige Deel.

Desfor

Øsfiordingernes nysbenærnte Næringsmaade hore ogsaa til dette Syffels vestligste Indvaanere, thi de grændse, som sagt er, til Øsfiorden: Den egentlige Sild, som er bleven kaldet (uden Tvil efter de Tydske) Sævinge, kommer til dem iblandt, men fanges ifskundstælden. Sælhunde ere her allevegne, og især findes de ved store Elvers Udlob, som i Skialfandestlot, hvor de ogsaa soomme noget op i Landet, og ligeledes søge de op i Jøfelsaa i Øsfiorden, og krybe op paa Sandbankerne paa begge Sider. Paa Stetten og alle andre nordlige Kyster, lige til Langenæs, er god Sælhundefangst; der drives og Haakallefangst, samt Torskfiskerie. Dog er den Fangst af Badesæl, som skeer med Garn, den vigtigste. Velbemidlede drivtuge Bønder have fundet paa den. Garnene ere meget stærke, og bruges mange ad Gängen, ligesom Eierne ere formuende til: de sættes inde i Fjorde og Viige, paa de Steder som Sælhunden oftest besøger, og man passer paa, naar Baden træffer paa dem, da Eierne faae en anseelig Binding, saafremt Garnet holder; ellers mistes Garnene tidt, eller dog komme til Skade. Indbyggere paa disse Kyster have og mangesteds Ederfugl, Eg, og Fuglefangst i Strand-Viærgene, især paa Langesnæs, Rødenup og Grimsøe; og med at benytte sig af disse anførte Ting, have de nok at bestille Vinter og Sommer; leve ogsaa temmelig godt. Formedest Sælhunde-Tranen, sem kommer herfra, er gierne Huuseviigs Havn fordeelagtig for de Handlende.

§. 735.

Konst-Arbej-
de.

I Konst-Arbejde give Nordlænderne andre deres Landsmænd intet efter: de ere baade Tømmermænd, Snedkere, Jærnsmedde, Giortlere og Sotofmedde. De bygge temmelig godt, og panele deres Huuse indvendig. Deres Fisker-Vaade danne de og bygge
baade

baade smukt og varagtig, og ligne deri meest Breedefjordens Indbyggere. Deres Indretninger og Orden ved Fiskeriet komme meest overens med Vesterlandets. Til deres Snedkers og Timmermands Arbejde have de god Hielp af Drivetømmer, som salder hist og her, men dog i størst Mængde mellem Tiornæs og Langesnæs, hvor det paa somme Steder endog skal være i Overflodighed, og næsten som paa Hornstrandene. I Hunevands Syssel samt Skage og Desfjorden forfærdiges alleslags Messings Jærn: og Solv-Toi, for at sælges om Foraaret til Sønder og Vesterlandet, og især af Solv, Knapper til Troier og Forklæder, Maller til Gruentimmer-Bælte eller Giorteler o. m. Af Messing forfærdiges sammeslags Ting; og af Jærn-Nedskaber, Knive, Hovler, Navre, Ører, Knibtænger o. m.; og endelig af begge Slags Metal, Beslag til Riddetoi, Stigboiler, Bidseler, Spænder, Hestefoe o. m. Man har fundet iblandt disse Kunstnere sindrige Hoveder. Saaledes har i Mands Minde været en Mand i Desfjords Syssel, der byggede et Skib eller Vogn til 3 eller 4 Personer, som han seilede med paa det Tørrø om Vinteren, da Jorden var tilfrosen og hvor Grunden var liige. Men eengang, da 2de af hans Søner drog i stærk Væst hjem fra Kirken paa denne Måskine, og vilde prøve hvor stærkt den kunde seile, kom den i saa stærk Fart, at de kuldseilede, hvorved Maskinen gik i Stykker og de stodre dem meget ilde. Gruentimmerets Arbejde er ogsaa meget godt (§. 286.).

§. 736.

Det som er maalt tilforn paa adskillige Steder (§. 63 til 71, ^{Tiidsfordriv} 287- til 93, 518-520, 607-611 ^{og} c.) om ^{Lystligheder} Tiidsfordriv og Lystligheder, passer sig og paa Nordlandet. Dog have de Sysseler ikke saa stor Mangel paa Tiidsfordriv, hvis Indvaanere jævnlig

Et et

reise,

reise, og dette bliver maaskee den fornemste Nytte af dette Slags Levemaade. Indbyggerne i Hunevands-Øyssel og Skagafjorden ere derfor mindst tungsindede; men often for er Levemaaden meere stille, og Omgangen med andre Herreder mindre. De lange Vinter-Aftener pleier man at fordrive med at læse Sagar og Edda, det ere gamle Begivenheder, satte paa Riim. Sproget er her temmelig reent, og hvis man havde arbeidet paa, som Biskep Sverdrup Thorslaksen begyndte, at reense samme og forbedre Bogstaveringen, (fordi Bogtrykkeriet var her paa Bispestolen), havde det vist nok gjort megen Nytte. Af Sægerie og Hede-Historier (§. 610 til 617) har man ogsaa haft meget i forrige Tiider; men nu tager al saadan Snak og Indbildninger meget af. Vi mærkede kun eet eneste Exempel, den Tiid vi reisde her over, i det den eene af os saae een Bonde, som var plaget af denne Sygdom. Han var ganske udmavret, og saae bleeg og gusten ud, ja ret som en Dødnings. Han talde meget lidet, men ellers fornuftig, ligesom han og var sædelig og stille.

Dyrene.

§. 737.

Heste.

Hvad der er talt om Hestene i Almindelighed (§. 73, 294 og 646) passer sig og her, saa at vi ikke behøve at igien tage det. Nordlandet haver ellers større Forraad af Heste end nogen anden Deel af Jsland; man finder dog ingen Spor til, at det har været saaledes i forrige Tiider; saa at Indvaanerne vist nok maae have begyndt at opøffe de mange Heste, den Tiid deres Levemaade blev forandret, og de begyndte at søge til andre Fierdingers Tjesterfeder. Det er uimodsigeligt, at denne Mængde er skadelig for Landvæsenet

net i hoieste Grad, og at den er een af de Aarsager, som haver forringet Prisen paa Jorde og faste Eiendomme; en fordervelig Grundsaetning, som man er falden paa der i Landet, at lade nedsaette Grundenes Priis, i Stedet for at riige og fornemme Folk i forrige Tiider holdte det for meget gavnligt, saavel for Eierne, som det almindelige Bæst, naar en Jord eller Gaard var bleven forberedt, at lade den, med visse Vilkaar, forhoie i Priisen. Enhver Fornuftig indseer vel Folgerne paa begge Sider; det bliver og for vidtlostigt at udføre disse paa dette Sted. De Grunde, der saaa, eller have saaaet nogen ubodelig Skade, bør dog her undtages; s. f. Ex. naar Skredfald eller Vandflod tager Grunden ganske bort o. s. v. Der er og stor Forskiel paa, at formindste for en Tiid Afgaisterne af en Jord, og at nedsaette den selv i Priisen. Nordlandets Heste, baade Riidehestene og de andre, agtes ellers for gode til at udholde Arbeide. Den største Mængde af disse Dyr findes i Skagafjorden; der ere ogsaa mange Beriidere; thi Skagafjordingerne ere gierne Eiskere af Heste. Dog komme fra Desfjorden nok saa vel bereedne Riidehæste; Aarsagen er, at Grunden er der overalt tør og liige, Bønderne fodre godt om Vinteren, og paa den glatte Jis kunne blive de bedste Gangere. I de sidste Aaringer døde den største Deel af Nordlandets Heste (§. 710.), da de ikke aleene styrtede af Hunger, men de Fattige bleve og nødte til at slagte dem til Spiise. Dette skeede ogsaa paa flere Steder i Landet, og forarsagede overalt Efterratelse iblandt Folk, især hos Geistligheden, som forbød alle og enhver at æde disse ureene Dyr; det er og forbudet under strenge Straffe, i de endnu brugelige Kirkelove, fra de papistiske Tiider. Det, som ellers foregæde Skhydten, var, at de Fattige gjorde dette hemmeligt; at jo mange Uvagtige stiale Heste

til samme Brug, var ei at nægte. Men overalt spørger Hunger og Dyrthid ikke efter Sligt; thi man har Exempler nok hos andre christne Folk, at de have maattet nodes til at spiise disse og andre affkeiligere Ting. At Hestenes Mængde paa Nordlandet og især i Skagafiorden haver været skadelig, er erkjendt af Indbyggerne selv; da disse Dyr æde ikke aleene Græsset, men ogsaa beskadige Roden, især enkelte Rodder, og dem der ikke er faste nok i Grunden, hvilkken de gaae saa nær som de kunne, og ødelægge gierne de tilkommende Planters Siemne og Winterkammere. Det haver ikke været rart, at en Bonde haver havt 50 til 100 Heste, og derover, da han ikke har eiet meere end 4, 6 til 8 Koer. Alle viide, at dette strider tværtimod andre evropæiske, og især de nordiske Nationers Brug; da Antallet af Heste og Saar skal være det mindste mueligt, mod Hornkvægets. Za man kan beviise, at de gamle Isændere have fulgt samme Regel.

§. 738.

Saar.

Om Saarene er meget talt i Forveien (§. 75, 298-325 og 648); at de ere nyttige for Landet, kan ikke nægtes; men at det ogsaa kan være skadeligt at have alt for mange af dem, ville vel andre Nationer, der drive Kvæg-Nølingen med Indsigt, ikke have noget imod. I Island vil dog denne Meening blive agtet saaløst, maaskee ogsaa skadelig for Handelen. Dette skrives ellers i Anledning af, at der holdes en stor Mængde Saar paa Nordlandet, saalt for stor mod Hornkvægets Antal, og dette samme kan siges med Visshed om mange andre Steder i Island. Man seer sig saa meget meere tvungen til at fremsætte denne vigtige Sandhed, som nogle anseete Mænd have søgt at indprænte Nationen, at det var meest fordelagtigt at lægge sig efter en Mængde af Saar, i Ste-

det

det for Hornkvæget. IIndbyggerne selv meene ligeledes, at det er dem fordeelagtigt at have mange Saar, især for at handle med, siden disse Dyr koste dem ikke noget. Men ingen betænker, eller regner efter, hvor meget Saarene have ødelagt Græsjorden, siden de bløve saa mange i Landet. Ingen regner heller efter, hvor stor Mængde der styrter, som ingen har Nytte af. Hornkvægs-Vollingen derimod er vis. Den Umage man haver med samme, betales riigelig; Græsjorden ødelægges ikke, men holdes ved Ege, og efter Koernes Antal kan Bonden altid holde et vist Antal af Fok. At denne Green af Handelen i Jsland er nu ganske borte (§. 74, 297. 647.), maae baade IIndvaanerne og de fremmede Handlende tilstaae, som have saret derpaa i forrige Tiider; og man maae spørge, hvoraaf det kommer, da det hertlige Saareavlings-Værk er drevet til den høieste Spids, at der nuomstunder baade kommer mindre og flattere Sammekios fra Jsland, end i forrige Tiider? thi at der kommer saa meget fra et enkelt Sted; eller at IIndvaanerne, den Tiid dette blev skrevet, af Frygt for at Saarepesten (en tilforn ubekendt Sygdom) skulde tage alting bort, leverede hvad de havde ind i Handelen, vil ikke sige noget. Her er ikke Tiid eller Sted at udføre denne Sag videre: men vist nok er og bliver det, at IIndbyggernes Tall haver heele Tiiden taget af og til, efter Hornkvægets og især Koernes Tall; ja ydermeere: Jordens gode eller flatte Tilstand haver ogsaa rettet sig deraf.

§. 739.

Geeder have egentlig hjemme paa Nordslandet i disse Tiider; Geeder og
og de saa, som nu findes paa andre Steder, ere af Forsningen komne her fra. Her findes dog kun saa af dem, og ikke uden paa eet eller to Steder, nemlig i Svarfeddal, og især i Juioskedalen. End-

Svinn.

skiont disse Dyr giøre Skoven Afbræk, ere de dog i visse Maader fordelagtigere end Faar: de give megen Mælk, ere gode at slagte, og holde Vinterens Strængthed snart utroelig ud. Hvis man kunde have dem uden Skov, saa at de kunde trives, vilde saadant blive tienligt og tenne Umagen. Sviin har man havt paa Nordlandet i gamle Dage (§. 77.).

§. 748.

Udfællige an-
dre Dyr.

Sunde, Ræve, Muus og Rætte, ere, ligesom andens-
steds, almindelige paa Nordlandet, og intet Nytt om dem at til-
lægge. Om Sælhunden er handlet i Forveien (§. 734). Indvaas-
nerne have og samme Nytte deraf, som paa Vesterlandet og paa
fleere Steder (§. 652 til 656.). Rostungen (§. 653. a) har man
fundet, skiont ikkun sielden, paa denne Kant. Den almindeligste
Maade at fange Sælhunden er at sætte Garn for den, eller og
at skyde den, og begge Deele bruges i Skialfandeshiot, Hergaa og
Heredsvandene. Men i Svarfeddal har man endnu en nye Maade:
Sælen svømmer der langt op ad Elven, og kryber op paa
Græsbakkerne, for at hvile sig og sove; den kan ikke komme op,
uden hvor der er Skaar i Bakken, og tage sig derfor Leie kort der-
fra, for at være nær ved Vandet. Disse Steder har man da
lagt Mærke til, og gravet Graver, hvor Sælen enten skal over,
eller hvor hans Leie er: Jorden har man reenset bort, lagt svage
Lægter over Abningen, og dækket det saa tæt til med samme
Grønsvær, som før har været over den. Naar nu Sælen kommer
falder han ned, og kan ikke komme op igjen. Ved denne Leiligh-
hed kan man nævne en anden Maade, som uden Tvil er gammel,
men er sporet op og sat i Værk i disse Tiider; nemlig, at hugge
Guller i de Strandklipper, som Sælhundene pleie at ligge paa, og
fæste



Accipiter, Ula



fæste et skarpt tveehaget Jærn deri, eller og at fæste samme Jærn i en Kiste. Erfarenheden haver lært, at Dyret ikke veed at tage sig i Agt for dette, naar det krybder der op paa.

§. 741.

Al Zvalfske sees her allestags i Havet, men fanges ikke, Hvalfske. undtagne de smaa, og det kun sielden nuomstunder (§. 734), nemlig Andarnesier og Hnysier. Det sidste Slags Hval er allevegne nord paa, og den første besøger især Østfjorden. Drivehval faae Indbyggerne undertiiden, meest paa Skagen og i Østfjorden, hvor en Sværbanke løber ud i Fjorden fra Lofaas Præstegaard. Paa Langenæs, Sletten, og Kysterne der i Nærværelsen, falder den oftest. Een af os faae i Aaret 1757, paa sidstbemeldte Næs, et Rindbeen af en Hval, som var 18 Alne langt; Dentes incisores vare 10 i Tallet, Molares 4.

Fuglene.

§. 742.

De fleste af de andensteds i Landet bekiendte Fugle findes ogsaa nord paa, som Ørne, Falke, Svaner o. s. On den ^{Nordfugle} ^{finke, især} ^{Sværdfuglen} Ugle, som er bleven bekiendt i Nordlandet, ved det ^{paa Drangø.} Anderson har ladet den stikke i Kobber, ved man endnu ikke med Visshed, hvilken Art det er; thi bemeldte Skribent giver ingen Beskrivelse over den. En anden liden Ugle er bleven seet paa Sønder og Vesterlandet, skiont ikkun sielden. Den er af Farven gulbrun, hvidt og sortspraglet overalt. At tamme Gæs have været paa Nordlandet, ligesom paa flere Steder i forrige Tiider, beviiser Landets Historie. Vildgæs, af de 3de foransførte Arter, komme ogsaa til denne Kant, og skydes iblandt med Glinte. er

er her paa mange Steder. Om Svartfuglen blev nyelig mædet (§. 734.). Den lægger Æg paa nogle Steder nord paa; men de fornemste ere dog Grimsøe (§. 700.), Skorevigs-Viærg paa Langesø, og Drangoe; Naaden at fige og fange den i Viærgene er omtrent den samme overalt, som er mædt i foregaaende Stykke (§. 673. & seq.). Paa Langesø siger man ikke meer end 30 Favne eller sidet derover, thi Viærgen er der ikke meget høit. Men, vi ville især tale her om Drangoe. Naar man betragter, at den er saa liden, bliver den uden Tvil det fordeelagtigste Stykke Land, som man veed af i Jsland; thi den holder mange Menneſter ved Live, og giver Skagefiordens Indbyggere paa adskillige Maader deres Næring. Den var tilforn en Alminding indeil 1030, da den Klæmpe Greter, der havde holdt sig her i nogle Aar, mod Indbyggernes Blikke, blev ombragt; man seer der endnu Levningsger eller Grunden af hans Huus. Men efter den Tid fik Høls-Gaards Eier Den, og derfor har den siden ligget under Bispestolen. Drangoe er en Klippe af lysegraa blegagtig Sandsteen (§. 713. b.), uden paa besat af en utallig Mængde Fugle; men oven paa bedækket med 3 til 4 Fod tyk sort Jord, som giver det deiligste Græs, saavel til Høeslæt, som til Fode for Faar om Vintertiden, hvilke blive her overmaade fedte, og saa vilde, at de springe ud af Klippen, naar man vil tage dem. Man forsikker her det samme, som blev mædtet om Fuglebiærgen (§. 673.), at Bugen brister ud paa Menneſter og Faar, naar de falde der ned igiennem Luften. Dens Bredde oven paa skal være henved 400 Favne i Firkant; men Eierne have regnet det Græstige af den for 72 Dagstætter (§. 52.). Jorden er her meget udhullet med runde 1 Quarter vilde og Alne lange Gange, hvilke Lunden gjer med hans stærke

stærke Næb og Kloer. Klippens Høide regnes til 100 Favne, og derover. Viærgfuglen hugger den selv ud til Nædesteder, og Maaden at fange den paa er den samme, som ved Laatrabiarg (§. 673). Visperne holde paa Drangoe 7 til 8 Karle, som ligge der fra Kaarsmisse til St. Hans Dag. Fæsten eller Tovet til Fuglesangsten bør følge Bispestolen, som Inventarium. Det vurderes for 5 Huudrede, eller 20 Rdsr. Sp., naar det er gjort som det skal være, nemlig at Fæsten selv bestaaer af 7 Taatter eller Remmer, hver 80 Favne lang, naar de ere sultstrækkede: de skæres ud af Drelæder, det tykkeste i Huuden, hvortil man behøver 16 saadanne middelsmaadige Huuder. Fæsten, naar den er tør, veier 1½ Bætt, det er 120 Pund. De 6 Karle holde Fæsten, og trække den op og ned paa en udstaaende Viærgstok. Den 7de staaer paa Vabbiærg, d. e. paa Bagt, og giver Agt paa de Tegn, som Sigemanden gjør (§. 673. o. f.).

§. 743.

Alt den Fugl, der fanges ved Sigemanden, samt Eggene, og En befinde-
 de Papegoier, som opholde sig oppe paa Den, tilhøre Bispestolen, lig Maade at
 og endskjønt denne Fangst giver aarlig en anseelig Binding, saa er fugl.
 dog den, der drives paa Soen omkring Den, meget større og nyttigere, i Hensigt til det Almindelige. Maaden er denne: Slette, eller Glode, kaldes et firkantet og af tynde Bredder sammennaglet Stykke, 2 Alne langt og 5 Qvarter bredt. Vidurstada kaldes et Tov, som, med en Stiore, eller Steen-Anker, nedsenkes til Bunden (§. 95). Til den øverste Ende af saadant et Tov hæftes 5 Slette med smallere Liner, saaledes, at den eene kommer til at flyde lidt længer borte, end den anden. 3 ovennævnte Liid begive Indvaanerne dem til Den, allesteds fra, Iislotene undtagne

U u u

(thi

(thi denne Bygd er længst borte, og der drives Fiskerie paa Havet), paa store Baade, til 6 eller 8 Mand: hver Baad har 5 Nederstader, som den nysbeskrevne, og een foruden med 6 til 8 smaa Flesker eller Gloder, hvilke hore Roerskarlene til, saa at Fordeelen af dem kommer ikke til Deeling. Altsaa hore til hver Baad henved 30 saadanne Gjudebretter. Fleskerne ere giennemborede med mange Huller, paa en vis Længde fra hverandre, og hvert Stykke besat med 100 til 150 Snarer eller Strikker, af stivt Hestehaar. Paa hver Nederstade staaer een Løkkesugl paa den middeste Glode, og derved formaaes de andre Svartfugle at sætte sig her, for at hvile dem; thi der svømmer paa Soen saadan en stor Mængde, at de gierne trykke hinanden. Naar en Baad er færdig med at sætte sine Flesker eller Gloder i Lave, gaaer den bort for at fiske, og lægger førsteds Lodliner, med mange smaa Angler, ligesom de der bruges i Norge (see Sødm. Vestr. p. 437.), samt paa endel Steder her paa Nordlandet, ligesom og ved Vesterjökelen om Vinteren. Fiskerne besøge da disse Liner og Flesker 2 Gange om Dagen, og fiske imidlertid paa enkelte Neebekroge. Paa en Fiske kunne de faae en Snees Fugle ad Gangen. Det er besynderligt, at ligesom Snarerne maae gøres af allelags Hestehaar, som hvide, graa, brune og sorte, saa bliver og Gangsten forstieellig derefter; thi altsid fanges de fleeste Fugle i de sorte Snarer; enten at Svartfuglen er mindst bange for denne Farve, eller og at den haver Tilboielighed til den. Vesten til paa Drangoen, uden for Klipperne, have Indbyggere en Stade, hvor de kunne lande med deres Baader. Men paa Den kunne de ikke komme, uden deres Tilladelse, som ere der oppe; thi Klipperne ere steile overalt; der ere alene nogle store Som slagne ind i Sandsteenene, hvorpaa en af de smidigste og dets

stigste

stigste Klavrer op om Foraaret med en smal Line, for at trække Stierne op med, hvilke da staae der, saa længe Bispestolens Fokk blive paa Den. Dette Slags Fuglesangst kunde blive til stor Fordeel paa andre Steder i Landet, især ved Fuglebiærget, hvor der opholder sig endnu en langt større Mængde af Svartfugle; men Soen er der gjerne uroelig, og man kan kun stælden lande under Biærget.

§. 744.

Lunden fanges ei andensteds paa den Maade, som her: man lægger nemlig Lundegarn over Huulernes Abning, af hvilke mange staae sammen, tæt ved hinanden; i disse besnæres især de Fugle, som ville ud af Huulerne. Maagen (§. 674. c) boer for sig selv i Karlen, en meget høi og smal Klippe tæt ved Drangoe, hvor intet Mennecke kan komme. Her seer man de unge Fugle meget forskiellige i Farven fra de gamle. Disse blive her i Landet heele Vintere, da de unge tildeels trække bort, og dette er Aarsagen, hvorfra Larus glaucus (hvilken ikke er nogen særskilt Art, men kun den fuldvorne Fugl) er saa rar hos Skribenterne. Rysa, Larus albus, extremitatibus alarum nigris, beboer et Stykke af Klippen paa Drangoe, og findes desuden paa Rysterne ved Langenæs; men i størst Mængde paa Rodenups Forbiærg (§. 698.), hvor man derimod ikkun har lidet af Svartfuglene. Klipperne, hvor Fuglene boe, ere heller ikke høie, thi de holdes for at være kun 60 Favne. Det er ellers værd at mærke, at Larus canus og Larus tridactylus Auctorum er een og den samme Art, og just den foranførte; men de have taget den for 2de Arter, ved det Klok paa den lille Bagtaae findes ikke paa mange af dem; thi paa nogle har den aldrig været voksen, paa andre er den afbrudt, ved det at Fuglen stor

der den saa tidt paa Klipperne. Silingen, eller den transpudende
 hvide Procellaria, findes paa Grimsoe. Denne Art er hverken
Linnaei Procellaria (glacialis) Faun. Svec. 49.; ikke heller, som
 Hr. Ström formoder, Kleins Malmøke; men ganske vist den af
 ham under neden i Noten beskrevne Fugl (see Søndm. Beskr. p. 231).
 De tvende store *Colymbi*, nemlig Simbrynen (*Colymbus dorso*
nigro, *maculis quadratis albis*) og Lomen (*Colymbus collo*
antice ferrugineo), fanges tidt i Forellegarn i Myvand, naar de
 usorgtig dukke under, for at søge de smaa Fiske. Ryper (§. 677. i)
 findes i Mængde paa Nordlandets Fjælde: vi have især seet en stor
 Mængde af dem paa Badlaheide og Arndisfjadsheide (en Fjældvei
 imellem Liosavandsfjard og Myvands-Hygden); de fanges her paa
 felsefanne Maade, som er nævnt i næste Stykke (§. 677.), og i
 Aaret 1752 boede en Mand nær ved Heiden, som fik aartlig en stor
 Mængde; han opholdt sig og sin Familie aleene med denne Næring
 i nogen Tiid, i de haarde Væring.

Fiskene.

§. 745.

De fleste
 Slags Fiske.

Alle de Fiske, som ere opregnede i det tredje Stykke (§. 538.),
 findes og paa Nordlandet, undtaget No. 20., som er os ubekendt.
 Rollien (No. 4.) er der meget almindelig, og fanges meest med Lod-
 liner (§. 743.). Reila (No. 6.), Steinbitr (No. 12.), Rørse
 (No. 13.) og Saamær (No. 21.), ere der rare. Lodna (No. 8. og
 §. 734.) er omtalt tilforn. Endeel af de, i det 4de Stykke (§. 680.)
 opregnede Savfiske, findes der ogsaa. Rognfelsen (§. 681.) fan-
 ges her paa mange Steder stittig; man bruger dertil gamle Sæt-
 hunde-Garn. Om Broddemysen (§. 682. a) og Daagmærren
 findes

findes der, viide vi ikke (§. 684.). Alle de sammesteds (§. 685.) opregnede *Ferskvands-Fiske* findes i de mangfoldige fiskeriige *Soer*; undtaget at *Jndbyggerne* viide ikke meget at sige af *Nalen*, og endnu mindre af *BrandEoden* (ibid. h). Den lille *Fisk* (ibid. i) er der ogsaa ubekjendt. Om de *Saltvands-Fiske*, der fanges i den mærkværdige ferske *Soe Olsøfiords-Batn*, er berettet her foran (§. 703.). Er det rigtigt, som nogle *Historier*, eller retter *Reisebeskrivere*, fortælle om en *Soe* paa *Hispaniola*, at man finder *Havfiske* deri (see *Alm. Reisebeskr.* 17 Part p. 238.), da har man her et andet Exempel; men *Marheden* formindskes meget derved, at bemædte *Soe* skal være salt og have *Samsund* med *Havet*. *Saa-Fall* (§. 687.) er en bekjendt *Fisk* norder paa, og fanges der meer almindelig, end andensteds paa *Landet*, *Trefyllisviig* (§. 629.) undtagen. De fornemste *Pladse*, hvor den fanges ere, foruden *Skagen* og *Floten*, *Siglenæs* og *Kysterne* ved *Langenæs*. Maaden at fange den er anført tilforn (§. 687. a), og kommer overeens med den *Norffe* (see *Strøms Søndm. Beskr.* p. 84.), ligeledes *Riodets* *Behandling* til *Spisning*, som beskrives paa dette *Sted*, den samme som i *Jsland*. *Stryia* er en her i *Landet* nuomstunder ganske ubekjendt *Fisk*, ligesom dens *Navn* er reent forglemt, endskjont det tilforn har været til i *Sproget*, hvorfor det nu føres ind igien, siden en af os, nemlig *Biarne Povelsen*, traf *Fisken* af en *Hændelse* paa *Langenæs-Kysten* hos en *Bonde*, der havde fundet den oppdrevet, men meget beskadiget: *Arten* var en *Sæstør* (*Linn. En. Sv.* 271.), og skal ikke være saa meget rar i *Norge*, hvor den kaldes *Sæstørre* (see *Søndm. Beskr.* p. 286.), og *Stryia* i *Jydsk Lov* (*Membr. c.* 81.). *Natur* (§. 78) skal være seet paa *Nordlandet* i indeel ferske *Soer*. Man veed ogsaa at tale om saadant et *Udyr*

paa nogle Steder i Norge; men vi have endnu ikke faaet nogen Bished om dette saa kaldte Dyr, hvorfor det bliver ved den forangjorte Slutning.

Insecter 2c.

§. 746.

Almindelige
Land- og Hav-
Insecter.

Denne Post have vi ikke faaet Leilighed til at agte paa i Nord-landet. Dog have vi deels ved Brevvevling, deels ved egen Erfarenhed, faaet Bished om de almindeligst bekiendte Arter af disse: Her findes da allevegne af dem, som ere nævnte i næst forrige Stykke (§ 688.), disse efterfølgende: Tætte-Oren (I. c), Brunkluten (ib. d), Jærnsmeden (ib. e), Vandfarten (II. a), Ridsmands-Sidrild (III. a), Græs-Sidrild (ib. b), Melslugen (ib. c), Sonningslugen (IV. c), Møgslugen (V. B. b), Madditefluene (ib. d), Myslugen (ib. e), Saareluus (V. C.), Luus (VI. A. a), Hestesluus (ib. c), Lundeluus (ib. d), Mør (VI. C. a), Steenluus (ib. b), Kongelvæver (VI. D. a), og Dorgdingelen (ibid. d). Af Hav-Insecterne ere her bekiendte: Krabben (VI. E. a), Marsfloen (ib. d) og Pnskebjørnen (ib. e).

§. 747.

Andre In-
secter.

Als andre Insecter haver Nordlandet disse i Besynderlighed: a) My, er den skadelige Vandmyg, som plager saa meget Myrvands-Bygdens Indvaanere og deres Creature. Den Tid vi reisde her forbi, i Aaret 1752, var Sommeren forbi, og disse Insecter borte, hvorfor vi ikke have faaet dem i Hænder, for at beskriver dem. Arten kan dog neppe være i Stægt med den mygliggende Tipula, eller Toesluen (§. 688. V. A. d), siden den saarer Creaturene, især Heste og Køer, saa stærkt, at Blodet rinder dem ned

ned fra Vinelaagene og Bagdeelen, hvorfor de løbe frem og tilbage, ligesom rasende, og styrte eller komme til Skade. Naar Sølen finner omkring Søen, og det er varmt og stille om Sommeren, da komme disse slemme Gæster frem, opfyldte Lusten og skule Sølen. Men naar det blæser og bliver tykt, falde de ned; naar Sølen finner oven paa Regn, ere de allerværste. Ellers ligge heele Dynger af dem langs med Soebredderne. Siltungen søger meget efter dem, som den søkkerste Fode, og naar den mærker, at Myggene søve oven paa Vandet, kommer den op og søger dem allevegne. Fiksen løber denne Tid allermest i Garnene, og bliver saa Indbyggerne til Deel, og det er da en Nytte, som de have af disse Insecter, for den Uleilighed, som de forarsage. Det hændes sig tit, at de reent dræbe Hestene, ikke saa meget ved at saare dem, og æde sig igjennem Huden, hvor den er tynd, men som os synes (thi Indbyggerne kunde ikke oplyse dette Tilfælde), ved ganske at opfylde og tilstoppe Sandserne, nemlig Næse, Øren, Næse og Mund, hvorved Lusten betages og Dyret qvæles. Vist nok er det, at naar en Hest er i saadan Angest, og løber fra et Sted til et andet, bliver den ganske træt, og da Næseboerne ere tilstoppede, maae den aabne Munden, hvor da Myggene strax søge ind og komme ned i Struben. Tidt løbe Kreatturene bort, og findes aldrig igien. Folkene flygte gierne til de Huuser og Kister, som her findes overalt, og hvis de ere nær ved Gaarden, søge de til Faarchuuset, hvor Myggene komme mindst hen. Ingen Raad have hidindtil fundet hielpe mod denne Plage; dog sige nogle, det skulde være godt at smøre Hestens Øren, Vinelaage m. v. med gammelt harstet stærkflugtende SaareSmør; men mon ikke Tiære var endnu bedre?

b) *Svera Luus.* I Mæret 1757, da een af os besaae Egnen ved Øfeste

Thetereyke, (en Gaard som ligger nogle Mille fra Myvands-Bygden), som haver overalt en hæftig Underjords-Varme, mærkede han i Grunden en stor Mængde af et slags lysebrunne Luus, som krobe frem og tilbage. Det var Skade, at han ikke havde Leilighed til at beskrive dem. Hans egne Ord ere disse: *Pediculi erant innumeri, magnitudine pediculi humani, coloris brunni dilutioris, antennis duabus exiguis, quas inter ambulandum, uti pedes, movebant.* c) Lodpurka. Af dette Insect har man hidindtil ingensteds vidst at sige, uden paa Nordlandet, og det ikke kun i Gliorene, inden Hegenæs-Byssel. Ordet betyder en lodden Sø: det opholder sig gjerne i Huusene ved Barmen, især i Køstalde, og i Vinduerne paa disse Bygninger. Da vi saa dette Insect, toge vi ikke i Tøll, at det var den i andre Lande bekendte *Oniscus cauda obtusa bifurca*, Fn. Sv. 1257. Denne Art er i Sælland meget almindelig i Huusene, især hvor der er noget fugtigt, samt paa gamle Muure og i Priveter. Formodentlig er dette Insect kommet hid med nogle fremmede Varer, maaskee fra Hollænderne, som søgte hid i forrige Tider. Lodpurken gjør her ellers ingen Skade. Den synes, ved første Biektast, at være lodden.

§. 748.

Orme.

Af Orme salde vel ogsaa her de fleeste i det Stykke om Bestiordene (§. 689.) opregnede Arter; men med Visshed kunne vi aleene nævne om følgende. a) *Amumadkr*, *Lumbricus Terrestris*, er baade her og overalt bekendt: den store og lille ere kun Forandringer, som *Linnaeus* (Sylt. Nat. 246) beretter; dem som findes i Mennesker har man ogsaa truffet i Jsland, endstønt ikke nær saa tidt eller jævnlig, som paa andre Steder. Man meener,

at

at det Jslandske gamle Navn kommer af Nama, som betyder Rosen, mod hvilken de røde Jordorne agtes som det almindeligste og beste Lægemiddel: de tages levende, lægges paa Legemet, og bindes om med en Klud. Efterat de ere døde, og begynde at tørres, tages de fra; og hvis Rosen endnu ikke vil give efter, samles friske Drme igien. b) *Reitumader*, *Lumbricus Litoralis* (S. 104. og 689. b.) er her paa mange Steder. c) *Brekku-Snigill*, *Limax Agrestis* (Fn. Sv. 1279. v. 5. 689. *) er her og alle vegne paa Landet almindelig: af den bereedes paa mange Steder den bekjendte Lægedem, som kaldes her Sniglavarn, bestaaende i Saften af de med Salt bestrøede Snegle; den bruges udvortes til Borter, Hæveser, Bylder og Saar. Man har ellers gamle Tabler om denne, ligesom om den sorte Art, at naar man har lagt Guld under dem, og forvaret dem i en Væske, have de voxet overmaade; men allerøstest tillægges Slanger og Drager denne Egenskab. Anførte Sagu er ligesaa troværdigt, som dette, at hvis man kan faae fat paa Sneglens 2de Horn, naar han rækker dem frem, da skal man kunne onske sig hvad man vil, medens man holder om Hornene. Men de, som af Begyndelsen have digtet dette, have ventelig vidst, at Sneglen laaner ugierne sine Horn til denne Brug. Den er meget hurtig at trække dem tilbage, og hvis en af Hændelse kan faae dem fat, slider Sneglen dem strax i Stykker. d) *Kolkrabbe* kaldes, uden Tvil af dens morsagtige Saft, *Sepia Tentaculis decem* (loc. cit. 7). e) *Marglytta* kaldes de 3de Arter af Meduser (loc. cit. 9) fordi de skinne i Morke i Havet. De smaa blaa og violet-røde kaldes *Risbmands-Suner*. f) *Krosesifster*, *Stella marina* vel *Asterias* (*Ophiura*) *radiis quinque, purpurea, echinata* (v. Syst. Nat.

264-9.). De hvide store Maager tage iblandt til takke med den g) *Echinus esculentus*, Fn. Sv. 1289, er her allevegne, men spiiſes ikke. h) Stelsiftur kaldes i Island alle Testacea. De ovenanførte (ſee l. c. λ) findes her, men spiiſes ikke ſædvanlig, undtagen den bekiendte Muſſling. Roeskallen (ſee ibid.) er her rar. Redduſtel kaldes paa Langenæs Smyrſlingen (§. 99.), og ellers almindelig Sandmigr; den bliver, efter *Linnæi* Syſt. Nat. Ref., *Mya Truncata*. Den bruges til Spliſe paa Langenæs, og ingen andenſteds i Island: den ſkal være ſød i Smagen og fordeielig, undtagen Snabelen, hvilken er ret ſei og haard.

§. 749.

Et Vidunder.

Man haver regnet hertil et beſynderligt Dyr, ſom de i Natur-Hiſtorien beſelbne, uden Tvil ville kiendes ved, og henføre til Ormene. Det er ikke Under, at det blev holdt i Island for et Vidunder, ſiden det var ſaa overmaade ſtort; og et andet meget mindre, dog uden Tvil af ſamme Slægt, er blevet taget for et ube-kiendt og forſkrækkeligt Hav-Under, hos en berømt Nation, hvor der var nok af naturkyndige Lærde ved Haanden. Den Islandske Aret har een af os ſunder i Landets Hiſtorier, ſom fortæller, at der i Aaret 1639 drev op paa Thingore-Sand en underlig Skabning eller Uhyre, hvis Krop var ſaa lang og tyk, ſom et Menneſkes Legeme, og havde 7 Haler, hver 2 Alne lang, beſatte med Knapper, der lignede Dienſteene, og ligesom Dineſlaage omkring hver Knap, hvilke havde en Guldſarve. Foruden diſſe 7 Haler var der een, voven ud oven for de andre, overmaade lang, til 4 eller 5 Favne. Der var intet Been eller Bryſſe i dette Legeme; men det var at ſee og ſole paa, ſom Bugen paa en Dvapſe. Til Hovedet kunde intet Kiendetegn ſees, undtagen een Abning eller vrende,

toende, der vare bag ved, eller fort fra bemeldte Haler. Denne Skabning bestuede mange troeværdige Mænd, og een af dens Haler blev bragt hjem til Thingore Kloster for at besees. Her har Læseren Beskrivelsen saa god, som den høves. Den største Seil har Annalisten vist nok begaaet i Begyndelsen, da han gjør det til Bugdeelen af Dyret, som uden Tvil har været Fordeelen; hvilket, naar man antager, blive de knoppede Appendices ingen Haler, men Tentacula eller Arme; og siden der opregnes kun 7, saa har den 8de været borte, og ligeledes Magen til det lange Tentaculum. Hvo seer nu ikke, at dette Dyr har været en meget stor Sepia; men hvilken Art, det kan man ikke bestemme; thi hverken beskrives Bugens Skabning, ikke heller Munden, og rimeligst er det, at den har været forrykket og beskadiget. Det artigste er hvorledes Knopperne og Cotyledones beskrives, som dog maae være sandt, siden deres Farve m. v. anføres saa noiagtig. Den Art af samme Slægt, som blev fangen etsteds i Holland 1661, gjorde der stor Opsigt, og blev tagen for et forfærdeligt Vidunder. I det Middellandske Hav falder en Art, som bliver meget stor, til 2 Alne lang, hvilken *Aldrovandus*, *Jonston* og flere tale om, og den skal have 10 Tentacula, ligesom denne Islandske har haart. Jeg har seet en Tegning over dette Dyr, forfærdiget af en i Tegnekunsten ganske ukyndig; dog hjalp den saa meget, at jeg strax fik Begreb om Skabningen; det som her er anført, kan vel og tiene til, at dette Dyr, hvis det skulde træffes herester, skal ikke meer komme Folk saa fremmed eller forfærdeligt for. Annalisten meener, at det har været de gamle nordiske Nationers Tgull, hvis Navn endnu er til i Edda; men det har ingen Grund; thi de Gamles Tgull bliver snarere *Echinus maris*, paa Norsk Jilkaar, et for-

andret Ord af Iguller, som endnu bruges i Jesland, dog kun for at betegne Soe-Jgelens Skall, hvilken der findes tørret, og uden Takker eller Spidser, paa Strandsbredden. Det heele og ubeskadigte Dyr heeder da Igull, og er opkaldet af Forskningen efter Land-Dyret af samme Navn, som ogsaa paa Eydsø kaldes Jgel.

Reisen til Myvatn 1752.

§. 750.

Myvatns
Bygden i Al-
mindelighed.

Myvats-Sveit kaldes Bygden omkring den bekjendte Soe, som af den uhorlige Mængde skadelige Fluer, som her opholder sig, og nyelig blev nævnt (§. 746.) har, strax ved Landets første Besøelse, faaet Navn af Myvatn, det er, Mygvandet. Denne Soe og dens Egn er een af de mærkværdigste Steder paa heele Landet, formedelsk den underjordiske Heede, og dens adskillige forunderlige Virkninger og ret mærkværdige Omstændigheder. Naturen synes her at have anvendt de yderste Kræfter, for at underrette Tilskuerne i denne Post; men det blive fornemmelig ifkun 4 Ting, som vi ville her beskrive, nemlig først Myvats-Egnen overhovedet, dernæst især Soovelminerne, for det 3die de Ildsprudende Bierge, og endelig de sidste Ildsprudninger, som der ere skete i Mands Minde. Enhver af disse Poster fortienede en vidtloftig Beskrivelse, men vi maa være korte.

§. 751.

Egnens Be-
kræftelse.

Da vi i Aaret 1752 reisde til Nordlandet, var vor fornemste Hensigt at besøge Skagafjords- og Hunevands-Syssel m. v.; men ved det vi, paa de øde Fjælde, toge Seil af Veien, og komme til Desfjorden (see §. 697.), forandrede vi vort Forsæt, og drog da derfra

derfra lige til Myvatn. Vi reiste fra Hals Præstegaard, gien-
nem det Bygdelað Þiofevatns Skard, en Dal, som er aaben tit
begge Ender, og frugtbar paa kraftigt Græs. Paa Hals saae
vi først oppe ved Roden af Bjergene smæltede og af Jordbrand an-
grebne Steene, og siden saae vi heele Beien igiennem samme Slags
Steene og Klipper i Grunden, som bestod af et gammelt Graun;
men dog for den største Deel skult med Urter, Krat af Birk, og
frugtbar Jord. Den store Flod Skjalafandeflot vüiser paa Bunden
samme Slags Klipper, og Arndisstad-Heide, som vi derpaa reise-
de over, bestod af nærlægtet Græs, endskjønt der ikke vare
Graustrækninger. Da vi komme ned af Heeden, laae Myvatns
Eggen for os, sort og fæl til Anseelse. De mørke Graustrækni-
ger, som ere nye, skillede fra de gamle, som endel Steder
(Enarr. Hist. Isl. §. 42. p. 45. §. 48.) bevise, at have været her
endog for Islands Beboelse. De ere hviide, formodest det
Overtræk de have af Gamber-Moss, som er et slags Bryum (Fl.
Lapp. 396.); hvorimod de nye ere endnu ganske bare. Dalene
imellem disse Strækninger ere grønne og frugtbare, og det er der
Gaardene staae. Mange store, dog meest smaa rundagtige Bjær-
ge, deels røde, deels graaagtige, tilligemed den mangfoldig op-
stigende Røg af Jordens udvortes Heede, adskillte disse mørke
Strækninger, og denne Blanding af saa besynderlige Forandrin-
ger, opvækker baade Forundring og derhos et slags Tungtsindighed
hos fremmede Besøkere, især dem, der have Begreb om, og vilde
at forestille sig de overordentlige Omvæltelser i Naturen, der have
frembragt alle disse Ting. Søen Myvatn er her i Midten, 3
Meile omkring, med mange smaa Bøiger og Næsse, som efter-
haanden ere opkomne af den fremvindende smæltede Graun-
Ma-

terie. I Søen ligge mange smaa Det, som høre til de nærmeste Gaarde. De ere bevoxne med Græs og Angelik. De vilde Ende der give Eierne Eg og Duun om Foraaret, om Sommeren falder der Hoeslet, om Efterhøsten opgraves der Angelik-Rodder til Vinter-Kost for Indbyggerne, og om Vinteren gaae Faar og Lam der paa Græs. Søen bringer en stor Mængde Foreller, hvilke giærne falde noget større og bedre end paa andre Steder. For at fange dem, bruge Indbyggerne Garn og smaa Baade heele Aaret omkring, og leve fornemmelig af denne Næringsmaade: Fisker spises deels fersk, deels haard og tør, med lidet Smør til, ligesom Stokfisk paa andre Steder, og saadanne tørrede Foreller holdes paa andre Steder for en lækker Spiise, og bestilles derfor herfra af de Fornemste, under det Navn *Nyvats*: *Keydar*. Søen er nuomstunder kun 5 Favne dyb, har overalt sorte Lava-Klipper i Bunden, med meget dybe Rifter og mørke søle Steder, hvor Fisken opholder sig, især om Vinteren. Af den Røg, som paa nogle Steder opstiger af Søen, veed man, at der er bestandig Hede i Grunden; og dette gjør, at Søen fryser saa tidt til, og Fisken bliver mør og feed i Riedet (§. 703.). Indvaanerne berettede, at Søen havde taget meget af, siden de sidste Jidsprudsninger, og at Fiskeriet var blevet siden langt flattere end tilforn; thi Fisken omkom den Gang, og haver siden den Tid ikkun lidt formeeret sig. Det nye Graun viser store Huuler og dybe søle Rifter, hvoriblandt een er størst, omtrent 15 Favne dyb igiennem Klippen, dog etsteds med en naturlig Steenbroe, hvor de Reisende viide over. Op af denne og flere Rifter stiger jævnlig Røg og Damp, og Bredderne ere paa de Steder overtrukne med saadan en Skorpe, som Hverevand ellers sætter (§. 225.). Nordost fra
ligger

ligger den Egn, som kaldes Tamar, eller Svovel-Minerne. Op af denne Strækning staae mangfoldige store Røg-Stotter og Damper, som kunne sees langt borte. Indvaanerne have bragt en Mængde Svovel detsfra i forrige Tider til den nærmeste Havn Huusvig, hvorfra det blev udført, og raffineret i Kiøbenhavn. Deres Handel nuomstunder er kun Kvæg og Uldengods. Bygden udgjør eet Præstekald.

§. 752.

Da vi havde besøgt Bygden, reisde vi til Svovel-Minerne, Svovel-Mi-
nernes De-
skrivelse. som ligge her ved 1 Miil fra Præstegaarden Bogum. Deien faldt op ad: først over en sæl Lava-Strækning med Nisser i Klipperne, hvoraf nogle ere $\frac{1}{2}$ Miil lange. Naar man kommer her oven for, seer man Tamerne eller Minerne selv, som bestaae i en stor, op ad gaaende Bakke, 1 Miil lang, 1 Fierdingweis breed, og besat med mange smaa Høie af alle slags Farver, hvid, gul, rød og blaa, fordi de ere overtrukne med fint Leer af adskillig Farve. Vi havde disse Tamer lige for os, og oven for dem, imod Osten, vare andre endnu hoiere Steder. Man træffer her ellers smaa Tamer paa andre Steder, baade nær og fjer, omkring Krabla, ved Leirhnuk o. s. Paa dette Sted bleve vi i 4 Dage for at beskue alting, og for at grave i Grunden, havde vi bestilt nogle Mand fra Bygden. Vi funde da, at Naturen, endstønt med jævnlig Forandring og Usvigelse, tager her meest i Aft efterfølgende Orden i de farvede Jordarters Læge. Først er den heede Jord giærne overdragen med den udblomstrende Vitriol og Alun-Jord (§. 721. 2). Disse Blomster (som iblandt spiire her op af de heede Klipperister og kunne samles paa Bredderne) have adskillige Farver: først ere de hvide, naar de spiire op, dernæst safran-

safrangule, og tilsidst grønne, hvilke sidste ere de allerstureste og utaaleligste i Smagen. Blomsterne have Skikkelse af Theekopper eller omvendte Underkaaler, runde, og 2 til 3 Linier breede; de samles oven paa hinanden til en Fingers Tykkelse, og hvor vi have traadt noget dybt i det bløde Leer, saa at Heeden fik Lust; og hvor Svovelsfyren var i Grunden, der funde vi, efter 24 Timer, udspirede ganske nye Blomster til 1 Linies Høide. Næst under dem ligger den hvide, bløde, suuragtige Jordart, 6 til 8 Tommer tyk, ja ofte 1 falkun 1 til 2 Tommer; den er tidt broget med røde og undertiden blaagraae Striber. Imellem dette Lagen og Svovels falder Jorden meer blaatlig. Svovels Lagen ere ulige, fra $\frac{1}{2}$ til 2 Fod i Tykkelsen; oven paa spirer det ud i højcitrongule Striber, 1 til 2 Tommer; men der under er det urenere vel guult, men mættet med et slags bleeg Jordart, som synes at være Støv af den hærdede, optørrede og igjen til Støv blevene Bolus. Under Svovels Lagen kommer en guulagtig 2, 3 til 3 $\frac{1}{2}$ Fod tyk Jordart. Fremre Namar kaldes et Sted, nogle Mille længre borte, mod Østen, henad Ørkene eller de store Drovfielde. Herfra have Indbyggerne bragt Svovel til Huseviig, i forrige Tider, fordi der var endnu større Forraad, og Lagen meget tyk, og (som Folk berette) smeltet. De have faaet 1 Bætt eller 5 Mark Sp. for hvert Centner, som de bragte til Havnen. Nu er man kommen paa at raffinere Svovels her i Landet, og det første Anlæg dertil haver det Jeslandske Interessentkab gjort, efter Kongelig Bevilling paa Sønderlandet; men nu for nogle Aar ogsaa norder paa. Vi gjorde her det første Forsøg, som lykkedes vel, hvoraf en Prøve blev nedsendt til Societætet. Svovels sandet skal rores om i en Jærngryde, og det allerfintigst, i det det smelter; man kommer noget Olie deri, hvorved det urene samles i Skum

i Skummet oven paa, men det reene Svovel bliver neden under. Man har nu ogsaa fundet paa at bruge Tran dertil. Under Svovet og den bleeg Jord er gjerne et tykt Læg, 2 til 3 Fod og derover, af rød-guulagtig Bolus; under denne er et tyndt Læg af bleeg eller lyseguul Jord, og derunder ligger et Læg af en hvid meget fin Art, som neden til bliver blaastrøbet, og dette Læg sluttet med grov sandartet Blaakeer, som forandres til Steen. Her er Heeden allerstærkest: vi tænkte at brække igjennem dette Læg, og lode vore Arbeidere blive derved en heel Dag, men de kunde ikke komme dybere ned end 2 Fod; thi Heeden var saa utaalelig, at de kun kort Tiid ad Gangen kunde arbejde. Dette var en Loverdag; Mandagen efter begyndte de igjen: Heeden blev da endnu stærkere, saa at det buldrede og suusede i Groften, eller rettere, i Klippen selv: vi maatte da endelig staae fra vort Forsæt; Dybheden fra den øverste Skorpe var i alt 8 Fod, og ned i det blaa Læg komme vi 5 Fod. Indvendig i Klippen satte sig det hvide udspirende Salt (§. 721. d). Saltet blev ned i Groften rødt og forgyldt; men Messingen nu som forsvundet, nu igjen sort. Vi saae her ogsaa i dette Læg en Mængde af de smaa messingsfarvede Svovelskis-Avner. Denne var de levende eller heede Namers Beskrivelse; men de saae kaldte dogde Namer, hvor Heeden har udraaset, ere udbvendig røde, af en fin Jordart, sammenslags som den skønne Bolus ved Ørehver (§. 712. i). Den treffes iblandt oven paa Jorden, bleven til en haard Steen, og undertiden halvsmaattet, da den er udhullet, meget mørkerød, og ellers som Lava. Tykkelsen er ulige 1, 2 til 5 Tommer, og derunder ligger det kiolnede Svovel i 2 Læge, og da først en Skorpe af det beste Slags; $\frac{1}{2}$ Tomme tyk, og dernæst Svovelsand, som er henfalder i Støv, og meget urent eller gruuset. Undertiden treffes

en gulv Bolus oven paa det kiesevede Svovel; det er Tegn til at Heeden er borte for en Tiid siden; thi ordentligst har denne gulve Jordart været rød af Forstningen, og denne har atter været hvid. Under Svovelet fornemmes Varmen de fleeste Gange i et gulv og blaa-mængdet Lag. Paa somme Steder er Svovelet enten reent udtørret, hvidt og støvagtigt, eller ogsaa ganske borte, da der i dets Sted treffes en hvidagtig Tophus; overst paa den er en hvid meget fin, dog tør og lidet suuragtig Jord, som synes at være en Leaning af den udspirede Alun og Vitriol; og naar denne igjen er ganske udtørret, saa at den underjordiske Heede dog holder ved i nogen Tiid, da bliver den til en hvid gipsartet Steen, hvilken efter Afseelse er meget lig den Krystallartede Steen, som er funden paa Vesterlandet (S. 568. n). Denne Gipsart voper glæerne i en Rundsdeel omkring Namernes Nabning, til $\frac{1}{2}$ Fods Høide eller Tykkelse, og derover. Blæk forsøgte vi at giøre her paa Stedet med dette Vitriol-Salt; vi skænkede derpaa stærk Thee, som paa Diebliffet blev sort; men malede dog ikke sort nok paa Papiret. Solutionen varm, kommen paa stødte Mølninger (*Linnei Arbutus uva ursi*), gav temmelig godt Blæk; men da Bladene af denne Urt bleve hakkede smaa, og derpaa kogte, med lidet reent Vand, som vi gydede varmt paa oftbemældte Salt, finge vi der beste Blæk. Alu, som ligger i dette Vand en Times Tiid, faaer en sort grønagtig Farve. Alun, i cubiske Krystaller, finge vi siden udaf Solutionen, ved den bekiendte Behandling med Urin. Et tørt Bad, som brugtes af Indvaanerne, blev os viist kort fra Tøttet, i en Huule, forbedret med opstablede Grønsteene: Man skal sidde paa Gulvet, som er sandigt oven paa, men en Graunklippe er neden under, som igiennem tvende Huller damper op en overflodig Varme: disse

Dam-

Dampe ere vel temmelig sugtige, men uden stem eller usund Lugt. Saadanne Bade kunde bygges paa flere Steder her i Nær-
værelsen.

§. 753.

Endsliønt her ere kun 2 eller 3 *Viærge*, som i disse *Liider* ere ^{Ibsprudende} *bekjendte* for at være *ildsprudende*, saae vi dog endee andre, som ^{Viærge nær} ved deres *Ørne*, *Skabning* og *Graunernes* *Beliggenhed* gave til-
kiende, at de eengang have sprudet *Jid*. Her viises ogsaa nogle
andre *Steder*, end *Viærgene*, som i de sidste *Liider* have sprudet
Jid, s. *Ex. Sitahol*, *Viærneslag*, *Sorfedal* o. s., men vi vil-
iser tale om *Viærgene*. a) *Kafninnusfiell* er det største iblandt
disse, og deri mærkværdigt fremfor alle *Jslandske* *Viærge*, at der
kan fremviise *Kafntinner*, eller de sorte *Glas-Ågater*, i deres op-
rindelige *Lage*, og i langt større *Mængde* end sædvanligt. *Viærget*
ligger 2 *Miile* fra *Svovelsminerne*. Vi reisde derhen over en sort
sandagtig *Bei*, hvor den stødte *Pimpesteen* og *Gruus* var paa no-
gle *Steder* bevoxen med *Moss* og *Græs*. *Fjeldet* har overst, lige-
som *Draapehøfjeld* (§. 441.), en skarp *Klipperng*, som ligeledes
boies imod *Vest*. Man finder der adskillige, ogsaa udbullede, *Toph-*
steene, og en *Breccia*, som er meget rar, nemlig en hvid fin *Steen*,
der seer ud som *Kalkstykker* af en gammel *Mur*, med sinde *runde-*
agtige sorte *Ågater* inden i. Høiest oppe seer man 3de *Lage* af *Åga-*
ter nær ved hinanden. Først det øverste tyndt, vekselsvis med en
Linie tyk *Ågat* og *Lava*; en nogle *Favne* høi *Klippe* ligger dog her
oven paa. Det middeste *Lag* er tykkest og best, 1 *Alen* og derover,
ganske sort, fint og flørere end man ellers træffer i *Jsland*: i dette
Lag falde blaaagtige *Forandringer*, men meget rare. Naar *Styk-*
kerne falde ud, ere de rundagtige. Det eene som vi stiktede til

Y y y y 2

Kiøben

Kiøbenhavn, var blaat og veiede 103 Pund; det andet sort, til 93 Pund. Det 3die og nederste Lag var grovt, dog sort. Alle disse 3 Lags vare horizontale og jærnsides liggende. b). Krabla staaer tæt herved, og er meest bekiendt formedelst dens nye og forstærkede liggende Jidsprudninger fra 1724 til 1730. Den bestaaer meer af Leer end Klipper, og er nu tilsidst bleven meget lav og uanseelig; dog dens gamle Navn gjør den endnu bekiendt, tilligemed 2 søle Søer eller Pole i dens sydøstlige Side: disse kaldes begge Viite, per Apharelin for Helviite, hvilket betyder Helvede; rimeligt, at Navnet er en Levning af den gamle Overtro. Endskiont der vare Folk nok paa Nasutinnebiærget, kunde vi dog ikke, for Betaling, faae nogen til at følge med herhid, for at viise os Veien; thi de paastode, at det var umueligt at komme herhen, allerhelst med Heste, da man kunde synke ned i de skjulte Leerpole; Saar synke her og ofte ned og blive borte. Vi forsogde det dog, saasuart vi havde faaet nogen mundtlig Underretning om Veien, og vor Reise gik ganske godt lige til Siældet, da vi steege af, og ginge med Varsomhed til Gods; vi trusse ogsaa nogle af disse Pole, men uden at blive fiddende deri: de vare allesammen huede neden i, med rød Jordstørpe oven paa. Men vi naaede kun til den ene Nabning, hvilkens vi kiendte af den opstigende tykke sorte Røg langt fra: den saae ud som en overmaade stor Kiedel, hvis Bredder vare henved 5 Favne høie over Vandet, der er blaaagtigt, og tykt som Belling; der siene Leer, som i Dampene føres op paa Bredderne, er suurt. Man kan ikke see her med, uden naar det blæser, da Røgen imelsken drives bort. Denne Egn kommer ganske overeens med den bekiendte Solfatara i Italien, hvormod Indbyggernes have den samme søle Indbildning, som man har havt her, at der er enten Skjærs-

Jid eller Helvede: Hedningene kaldte den kaagende Soe sammesteds Ollam Vulcani. Men intet er rimeligere, end at jo de Pole i Krabla kunde bringe sammeslags Nytte, som den Golsfatariske Soe, nemlig Vitriol, Alun, Salmiak o. m. c) Et Viærg med Etager. Kort fra Krabla, paa den nordre Kant, staaer et høit smalt Viærg, oien synligt et iblandt de nye (S. 4.) og ved Jordbrand opkomne. Siderne ere skulde af røde og sorte smaa Steene, som alle ere smæltede, meget jærnagtige, og overst paa seer man tvende ordentlige, dog af Jlden angrebne Klipperader, hvormed Toppen sluttes. Man regner baade dette og Agatviærgen iblandt ildsprudende her i Egnen. Saa meget er og rigtigt, at Jlden haver været ved dem; men det første har været et Værksted for Jid og Vand tillige, og det er nok det allerældste af de Viærge, som findes i Myvands Egnen. d) Leichnukr, som var begroet med Græs før 1725, da det første Gang sprudede Jid, er nu omstunder, næst efter Krabla, det meest bekiendte og farligste ildsprudende Viærg i denne Egn. Det ligger en Gierdingvejs fra Krabla, imellem N. og N.B.; men det er kun lavt, og bestaaer meest af soovelagtigt Leer og Sand, meget foræret og giennemiboret af Jlden: formest Grundens Usikkerhed og skulde Pole, sagde Indbyggere, at man ei kunde komme derhen. e) Sandfell er et artigt Viærg, hvor Jlden nyelig har udraaset: det staaer ved Veien imellem Boga og Ramerne: det er lavt, bestaaer kun af Sand og lidet Leer, og er dannet som en Skaal, thi det er aabent og seer ud som et rundt agtigt Giarde; midt i Bunden af Skaalen er en stor Hoi eller et lidet Viærg, hvist Jlden har opkastet til Slutning. f) For at gaar forbi de mangfoldige smaa kugeldannede, røde og oven i Toppen nedtrykte smaa Viærge, som denne Egn vliiser overalt, og som

deels i Mands Minde, deels for, have sprundet Jld, og ere dannede af nyt ved denne Sprubing; ville vi kun nævne et lavt Biærg, eller rettere Eamin, ført fra Sandfæll og tæt ved den næstbenævnte Bei. Den er af samme Art som Jldborg (§. 533 og 34.), aaben inden i, og omgiben med en rund Muur af smæltede sorte Klipper, hvilke have en Port paa Nordkanten, hvor den smæltede Steenslod har styrret sig ud, og over den nærliggende Egn. Det rareste er, at denne Kamin bestaaer ogsaa af smættet Steen i Bunden inden i, uden noget Gruus eller Opkastning: Heeden var, den Tiid vi komme her, ikke aldeles udsuget, thi Regen steg hist og her op indvendig af Muurens Sprækker.

§. 754.

De sidste,
eller disse Eil-
ders Jld-
sprubninger.

Al saadanne Naturens Virkninger, som Jldsprubningerne ere, maae man nøies med at forestille sig de fleeste aleene ved Indbildningens Hielp, siden de ere skeete for lang Tiid siden, og ifkun løslig beskrevne i Landets Historier; men af den Jordbrand, som kom op ved Myvatn Aaret 1724, og holdt der ved til 1730, have Indvaanerne faaet et nyt og rigtigst Begreb om denne Sag; thi mange af dem, som vare den Gang fuldborne, og betragtede noie de ofte igientagne Jldsprubninger, leve endnu. Krabia og Leitzhnufr vare de fornemste Jldbiærge; især sprubede det fæste en forfækkelig Jldlod, (kalbet af Indbyggerne Steenaa), som i mange Arne oversvømmede den underliggende Egn, opfyldte Seen for en stor Deel, brændte i Vandet som Olie i nogle Dage, og dræbte Fiskene. Den største Arm af Jldfoden var en halv Miil breed, og i Længden, fra Biærget til Seen, 3 Miile. En anden Arm traf Kirkestedet Keyksliid, slofede Gaarden, og forvandlede Husene til sin Materie, saa man nu ikke seer her andet end søle Drumn-Klipper.

Klipper. Det mærkværdigste var, at denne forfærdelige Ildflod maatte lade Kirken urørt, som dog stod tæt ved Gaarden, paa nogle Skridt nær. Graunfloden har stroget Kirkegaarden saa nær forbi, at der ere kun to Fod imellem. Indbyggerne vidste at beskride disse Graun-Floder meget livagtig: Materien vandt sagte frem, og tog alting med som stod i Veien, uden at forandres noget derved; thi dette Graun er overalt sort, og hvor forbemædte Gaard har staaet, kan intet andet Tegn sees, end at de smættede Klipper ere der paa Stedet meer rødagtige end ellers. Om Dagen brændte Steenaen med blaa svovelagtig Ild, som man dog ikke saa meget til, formædelt den tykke sorte Røg, der svævede over Materien. Man kunde tænde en Tobakspibe ved denne Ild; men Smagen af den indslugte Røg var usund og ubehagelig. Om Natterne stod den ganske Strækning i lys Lue, saa at den øverste Himmel-Egn var rød deraf, og der flødtes baade fra Ildfloderne og de brændende Viærge saa store og klare Funter, at det lysnede overalt, og baade disse hastige Lysninger og Lustens bestandige Rødhed saaes paa andre langt bortliggende Steder og Herreder i Landet. Hvor Materien standsede i en Dal, eller Strømmen sagtedes imellem, da satte sig strax, ligesom Skind paa varm Mælk, en steenhaard Skorpe, 1 til 2 Fod tyk, oven paa; men naar Strømmen begyndte igjen, og den øverste Materie trængede sig frem, sprang denne Skorpe i Stykker og flød frem tillige med, ligesom naar Iisstykker drive tæt sammen i Havet. Denne Skorpe haver faaet i Styrningen allestags Figurer, iblandt meget smukke, som Blomster, og adskillige Billeder af Billedhugger-Arbejde. Efterat Udstyrningen horer op, og Materien storknes oven paa, er den i lang Tid varm og smættet neden under, og hvor Grunden hælder, og

Mate

Materien faaer Luft, rinder den frem, og glærne, ved Udgangen, brækker noget op af Skorpen: heraf kommer det, at der findes saa mange Huuler paa deslige Steder, at de ere glasserte indvendig, og nedhængende Drypsteene oppe i deres Hølvinger. Af samme Aarsag ere slige Underjords-Gange rundagtige, undtaget paa Gulvet. Iblandt drives den smæltede Materie frem, blot ved Luftens Bevægelse, skiont Grunden ikke hælder, og naar den ikke kan komme frem, sprænger den og det stobte Klippetag, som er oven over, iblandt med utroelig Styrke, da Klippen kan have nogle Favnets Tykkelse. Denne yderste Grad af Smælte-Tid bringer i Glas og Afse alt hvad den naaer til: og hvor den brænder ud inden i en Klippe, finder man den smæltede Materie udbrændt til Afse; det træffe vi meest ved Myvatn i de Klipper, som naaede op i den frie Luft. Inde i de smaa Huuler og Rister, som ligge oven paa Jorden, hvor Regn eller Vand ikke ere komne til, træffer man i de nye Graune den ovennævnte Saltart (§. 483.), hvilken her, som paa flere Steder i Landet, kaldes Saltpeter, men er i sig selv Salmiak; nærmest ved denne Sort ere Klipperne meget udbrændte, og glærne rødagtige. Dette Salt er her dog rart at faae. De andre Materier, som denne Tid frembringer, ere den bekjendte sorte Afse og Graunsteen-Smuuler med afskillige Skuursteene; Krabla og Leerhnufr frembringe især noget af den hvide Steen.

§. 755.

Myvands-
Reisens Slut-
ning.

Vi forlode da Myvands-Bygden, og maatte rose Indbyggernes for deres venlige, og tillige ærlige og aabenhjertige Omgang og Tienstagtighed: de ere flittige og sparsommelige; hvortil deres Fødesteds Traliggenhed og Levemaaden hjælper: nogle af dem bruge Tobak; men Druffenskab har der ikke hjemme; Sproget tales ingen-

ingensteds paa Nordlandet reener end her. Osten for Bygden begynder den Orken Madredals-Grøve, som strækker sig henved 20 Milie til Østerlandet. For de Reisendes Skyld have her staaet nogle Gaarde, som nu ere forladte; især have der været i Mands Minde 3 Bebyggte, imellem Myvatn og bemældte Dal; men nuomstunder er der kun een, som holdes besat, og det alene for den store Elvs Jokelsaaens Skyld, hvilken de Reisende ikke kunne komme over, uden paa Færger, som Opsidderen maa passe paa (§. 703. og 726-5.). Paa denne Orken, som ellers er ikke hoi, staae nogle særskilte Fjælde og Bjerge. Da vi reisde fra Myvatn, drog vi over en Hraun-Arne fra Krabla: den var kun 10 Favne breed af Begyndelsen, men bredede sig strax utroelig ud. Smaat Birk og Krat-Ris vøper her i de gamle Hraune. Fra Myvatn reisde vi over en lav og slet Heede, kaldet Myvats-Sandur; den er ufrugtbar, og bestaaer meest af sort Sand og Aske fra Jidbiærgene. Til høire Hånd, eller imod N. fra denne Wei, ligger tvende Bygde, Kelduhverfe og Giskelækhverfe, hvor den Gaard Ehesteyker viser de samme Forandringer af Jordheede, Svovel, Saltarter og Bolis, som findes ved Myvatn; dog i langt mindre Mængde. Vi komme om Natten ned til Lapaadal, hvor endnu sees forfrækkelige Virkninger af Jidbiærgene. Lapa har sit Udspring fra Myvatn. Den er af de største Elve nord paa; dog seer man ingen Elv at vinde i denne Søe. Dette maae altsaa see under Jorden, thi ellers maatte Søen strax blive udtømmet. Krabla har tilføren styrtet en Hraunflod ned til Lapaadal, igiennem Elvens Rende, som er ikke andet end en stobt Klippe, temmelig jævn, lige ud til Skialfsandefjord. Paa begge Abredderne sees det samme Hraun, ligesom opstaaet i en hoi Muur, ned til Dalens Ab-

ning, hvor Materien har breddet sig meer ud. Disse vare da de fornehmste Ting, som vi saae og optegnede paa Reisen til og fra Myvand.

Andre Naturens Mærkværdigheder.

§. 756.

Tordenflag,
Jordbrand,
og Blod i
Havet.

Islandt disse ville vi nævne: a) Tordenflag. Man ved i Island ikkun sielden at sige af Torden; dog har man nogle betydelige Virkninger af Lynild paa Sønderlandet, og etsteds ved Besterfjoklen slog Tordenen 1631 ned paa en Fiskerleie-Gaard ved Bredefjorden; Stedet kaldes Brunnilsvaller. Det mærkværdigste var, at Tordenen borttog af et Huus heele Gavlén, som var bygget af Gronsvær. Det Tilfælde, der rammede nogle Personer ved Myvatn 1618, kommer meer overeens med dem der treffe ind i andre Lande. En Bønde blev der slagen ihjel, uden at man saae mindste Tegn til Skade paa hans Legeme. En Vige, nær hos ham, faldt til Jorden, og 3 Karle, noget derfra, fulde ned af Hestene; men ingen af disse døde. Denne Sommer lignede det forfærdelig norder paa, og Jordstøtse gjorde stor Skade paa nogle Steder. Disse Ting have ventelig været Forspil for Hælsesældets Ildsprudning, skiont den ikke brød ud førend Aaret efter. b) Jordbrand. 1716 berette nogle Aarbøger, at Nordlandets Jisblærge have sprudt Ild; men man finder intet videre derom; rimeligt er, at det har været Hofsjokel og Baldjokel norden til; thi hvis det havde været de smaa Jøkler nær ved Bygden (§. 698.), havde Aarbøgernes Forfattere vidst meere at fortælle om Ildens Virkninger. c) Blod i Havet. Dette Tilfælde er bekiendt nok i andre Lande, men i Island rarere. 1712 mærkede man dette paa Reykstrand, fra

fra Strandbredden af, og et godt Stykke ud i Soen, da Fiskerens Narer bleve røde deraf, og i Flæren satte sig om Ebben Blod-Lisfar (for at bruge Forfatterens egne Ord, som viise, at han og andre have taget dette for Blod), det er drevet Blod, paa Zhang og Steene. Paa Vesterlandet havde man for mange Aar siden, nemlig 1649, mærket dette samme, 2 Mile langt ude i Havet, og nu igjen samme Aar i Seydisfjord og Alptrefjord paa Vestfiordene. Soen i bemældte Fiorde var blodrod om Morgenen, og Natten forud. saae Havvandet ud som Blod, seltselig har der været noget Phosphorescerende. Men om noget Slags Hav-Infecter, eller og Væxter, for Exempel en Jungermannia, have forarsaget denne Rodhed, kan her ikke bestemmes. Paa Sonderlandet har en af os bemærket noget saadant, hvorom siden skal nævnes. I Skov. Skov. haver været mængstedt i forrige Tider, og Landnams-Saga giver etsteds (P. 1. Cap. 1.) tilkiende, at den har været alle vegne lige saavel nord paa, som andensteds i Island. Gran, siger man, har været i Thinge-Syssel ved Høfforden, paa Kalbaks-Bjærg, og Grenevig's Gaard, kort derfra, skal have faaet Navn deraf. Med meere Bished nævnes, at der have været Egetræer i Svarfeddal; fordi Svarfðala-Saga siger, at der blev hugget Rødtvæ i Skoven, til et stort Skib, og at dette Stykke Træ blev lagt i en Kilde, for at hørdes der; men siden Grunder er her overalt martialisk, er det rimeligere, at dette har været en anden Træart; thi Eget behøvede ikke at hørdes: overalt vokser ikke Eget saa nordlig; og desuden kaldes baade i det gamle og nye Sprog, Eget hvert stort Træ. Hvorledes Birkestoven har taget af paa Norderlandet, er omtalt tilførn (§. 728.); men derhos ere og Træerne nu

Skov.

omstunder mindre, end i forrige Tider. For 100 Aar siden have Træerne i Sniofsedals Skov havt 20 Aln. høi Bull op til Greenene. Modrevalls Skov i Dyfjorden havde de største Træer, hvoraf man endnu seer tykke Stotter og Diælker i Gaardens Huuse; men denne Skov blev ødelagt paa een Dag, omtrent 1667 om Vinteren; da Træerne først vare frose istive ved Jisning eller Jislag, hvorpaa der kom en forfærdelig Blæst, som brækkede dem reent af. Sniofsedals Skoven er af den beste Art, og hvis den blev opelsket, og brugt til Plantning paa andre Steder, skulde det maaskee blive til Nytte.

§. 758.

Foretagne Al-
derdoms-Løv-
ninger.

I Islandt mange saakaldte Alderdoms-Løvninger vilse vi opregne paa Nordlandet: a) *Tröllkonu-Rim*, eller Klæmpindens Sång, som siges at være udhuggen i en Klippe i Blidedalsaa, 15 Aln. lång og 8 Aln. breed; men Vandsfaldet har givet dette Hull. b) *Manahaugr* udgives for en Klæmpes Hoi, ved Naðn Mana; men det er en blot naturlig Hoi af Steene, og bor, efter *Landnams-Saga*, heede *Mana-Thusa*. c) *Selgahol* i Stortun, udgives for et gammelt Græfsted; dog det er intet andet end et Holt. d) Om *Ingolschaugr* i Svartsfæddal fortælles det samme: den er et rundagtigt Holt paa den østlige Bredde af Svartsfæddalsaa, og kaldes almindelig Ingolsfæfde. Hølet er naturligt, 3 Favne høit, 16 Favne långt og 16. breed; og saa stort, at deri gærne kunde begraves eet eller fleere Menneſker. Man fortæller, at Dobefædet i Badle-Kirke er grævet op af Jøien, hvor man og seer Tegne til saadan en Groft. Vi besaae dette Fad, som er af Messing, og rundt omkrængt paa Bredderne besat med 4 Gange tjugentagen Skrift, som ingen kunde læse, hvorfor den og er bleven anseet

anseet for etslags Characterer eller Runer fra Hedenkabet. Bogsstaverne ligne meget dem, som endnu bruges i Jsland og kaldes Hsfda-Letur, det er Literæ capitales, og findes paa Rulletræer og vævede Waand. Nogle af disse Bogstaver ere kiendelige, vi i det mindste have læst dem: Nw vetter enhver (conf. §. 627). e) Naatsfare kaldes en Klippe uden for Skaaleviig, som disse Viiger fortælles at have taget Navn af, og som foregives at have været en Klipspe, der er bleven til Steen. Landnama: Saga (Part. 1. Kap. 1. og Part. 3. Kap. 19.) lærer derimod, at Naatsfare heed en Træl, som allerførst bebyggede de ovennævnte trende de Viiger.

Markværdigheder om Indbyggerne.

§. 759.

Alf Alderdoms-Løvninger viises her vel nogle, men de ere ^{Virkelige Alderdoms-Løvninger.} baade ukiendelige og af liden Betydelighed. a) Paa Bispestolen er den gamle Muur omkring Kirken temmelig smuk, af firkantede hugne Steene (§. 714. g). Kalken deri er meget varagtig. Man siger, den er brændt af Musflinger, men det er uvisst, endskjønt der ere brugte ubrændte Musflinger til at blande den med. Bispestolen paa Holum blev stiftet i Aaret 1106, og den første Biskop var Jon Dgmundsen, som siden blev dyrket som en Helgen; nogle ville sige, at han har ladet bygge den ovennævnte Muur; men det er uvisst. I Domkirken have, indtil for-fort Tiid siden, været gamle Tapeserier med artige Historier paa: man har seet der de gamle Nordiske Skibes Dannelse, med flere Ting, samt nogle Inscriptioner. Af den gamle Bispestue, bygget af Tommer 1315, ved Biskop Audun, Stof paa Stof, staaer endnu Underdeelen

uforandret. b) Paa Nordlandet have været 4 Klostere, hvilke nu ere seculariserede. Det ældste var paa Thingsøre i Hunevands-Syssel, stiftet 1135. Der viises endnu en gammel Hielm og forslidt Ringebyrnie. Det andet var paa Thveraa, som nu kaldes Munk-Thveraa, stiftet 1154. Det første stiftede Biskop Kcill, det andet Biskop Björn. Det tredje paa Reine i Skagafjords-Syssel, nu Reinestad, blev stiftet 1295 af Biskop Þorund, til Nonne-Kloster; og det fjerde paa Madrevall i Horgaardal samme Aar. c) Paa Hof, i Midfjord; viises endnu Toften af den gamle Afguds-Tempel, og Offersteenen der uden for (§. 535.); og paa Hof, i Goddale, en anden Tost. Paa Bidvík, en Gaard kort fra Holum, en Offersteen og den gamle Laugrettr paa Hegrenæs. Men Borg i Biidedal (§. 714.), en Levning af et gammelt Kastel, er langt mere mærkværdig end nogen af disse Ting. Den staaer vesten for Aaen, paa et høit Sted, nær ved Gaarden, som har samme Navn, og kan sees langt borte: Den er dannet ved Naturen neden under af femkantede Basalt-Klipper, 200 Favne i Omkreds og imod Norden 10 Favne høi, men senden til meget lav, hvor de Gamle have opført en tyk Muur af saa store Steene, at 5 til 6 Karle ikke skulde rokke dem: Indgangen er nu meget forfalden. Inden i er en liden Dal, og Levning af nogle små Huse: der springer ogsaa en Kilde op af Grunden, og oven paa er en smuk Spadsergang. Man har intet Skriftligt om dette Mindesmærke; nogle sige derfor, at Finboge den Ramme (§. 629.), som boede her, har bygget det op; men derom mældes ikke det ringeste, hverken i hans Historie eller i Vatnsdæla-Saga. Hvis Sturlungerne i det 12 og 13 Hundrede-Aar, eller deres Modstandere, havde gjort det, var det vist blevet mærket i deres saa fuldstændige som

troeværdige Historie. Andre sige, maaſkee rettest, at en fornem me tapper Mand, som boede her, navnlig Barde Gudmundsen, sædvanlig kaldt Biga-Barde, af det Mandslag, han begik i Borgarfjorden, har bygget denne Bævn sig til Sikkerhed. Han levede tidlig i det 11. Hundrede-Aar: Grettis-Saga taler om ham; men Zeidarviiga-Saga, som handlede om bemældte Mandslag og dets Omstændigheder, er reent forkommen.

§. 760.

Nordlandet var af Begyndelsen den folkeriigste Del af ^{Folkets} Jsland; men nu er det midt imellem. I Skagafjords- og Vestfjords-^{og Bygdens} Herreder ere de fleste Gaarde, og Bygden best besat. Gaarde-^{formindskels} Aaringer og store Sygdomme have ofte bortrykket mange; men især er Menneſtens Antal paa de Steder blevet formindsket ved Huus-¹⁶ holdningens Forandring og forommældte store Pest 1496, hvorpaa fulgde Dyrtilid Aar 1500, og siden, indtil vore Tider, mange haarske Aar og Sygdomme. Man regner, at Nordlandet udgjør en Trediedeel af heele Landets Mandtal, men det gjør det ikke; ellers, efter Bygdens Størrelse, var det ikke saa meget (§. 698). Ennaa Kopperne have især taget endeel bort over heele Landet. Saa gammel som denne Sygdom er i Jsland, er den dog aldrig kommen til Grimsøe, forend 1709. Folkemangelen kiendes meest af de øde Gaarde; men det er ikke nok; man maa ogsaa viide, at Familierne ere nu ikke nær saa talrige, som tilforn. I Ex. Familiernes Tal i Hunevands-¹⁷ Syssel angives 1748 i alt 300, hver paa 4, 6 til 10 Personer; de der have henvend 20 ere meget faae; tager man nu, ligesom i Sneefjælds-Syssel, 8 Personer, som et Middeltal for alle Familierne overhoved, hvilket dog bliver for meget, da ndkommer Syssels Mandtal 2400. Og vil man sætte det samme Tal for Thingoe-

Þingoe-Syssel, samt for Skagefiords- og Þesfiords-Sysseler, hvert 3000 eller noget over, da udkommer, for den Tiid, heele Nordlands Følkemængde 10800 til 11000. Om man nu vilde sætte, at dette Tal var for lidet, for den Tiid, for de 3de Sysseler, og at det kunde heller passe til nærværende Tiider, da Følkemængden er saa stor overalt, saa sees dog, at Nordlandets Indvaanere udgiøre ikke stort over en Fierdepart af heele Landets. Hver Bygd haver hist og her nogle øde Gaarde, hvilket best kan sees af den almindelige Jordebog. Men desuden findes nord paa heele Bygder ganske øde og forladte, og andre for en stor Deel, f. Ex. i Hunevands-Syssel og Skagefiorden, Dalene eller op til Fjælds; 3 Floten, den østlige Part for den største Deel, saa at man regner der over 50 øde Gaarde, hvoraf det halve Antal er forladt siden 1700, og 15 Gaarde i næstafvigte 30 Aar; videre, Siglefjord og Kysten derved, tildeels; Hedensfiord og Hvanndalene ganske; Rattfareviiger ganske, saavel Kirkestedet Vatnasnæs, som den øvrige Bygd. 3 Þingoe-Syssel, op til Fjælds, og især i den østlige Deel i Þistelfjord, og op imod Ørken, udgiøre de forladte Gaarde noget anseeligt. De bekiendte og øiensyntlige Aarsager hertil ere alt mældte; men de mindre bekiendte ere endnu de farligste, og disse have Sted over heele Landet. Man kan nævne 4, og de 3 første meget noie forenede indbyrdes, nemlig a) Mangel af Anstalter til at besætte Gaardene efterhaanden, naar hver Sygdom eller Dyretid haver ophørt; b) At Gaardene hverken ere blevene forbedrede, eller de paaKOMNE Forværringer hemmede, som kunde have staaet til at rette; c) At Jordenes Pris er ved Rættens Middel bleven nedsat, og sølgelig Tienderne m. v. formindskede. Ens hver seer, at disse 3 Aarsager hænge af hinanden. Ikke alene Jords eiernes, men fornemmelig Dyrighedens Uvirk somhed, Uagtsomhed og For-

Forsømmelse ere stor Skyld heri, for næstafvigte 200 Aar, og dette des meer, jo nærmer vi komme til vore Tider. At adskillige piens-
synlige Aarsager, som Fattigdom, Maaden af handls paa m. v.,
have betaget Indvaanerne Mod og Hyst; det er ikke, at undre paa.
d) Den 4de Aarsag er tildeels mældt i Forveien, nemlig at Oplands
dets Indbyggere nærme sig og slotte ak meer og meer til Soekants-
ten, for at naae til Fiskeriet; hvilket vel aldrig beder paa Folk-
mangelen.

Alf andre Slags Mærkværdigheder ville vi anføre: a) Den

Adskillige
Mærkværdig-
heder.

første Kirke i Island, som blev bygget, til Christendommens For-
plantelse, Aar 985 i Aas i Hialtedal, for fra Holum, af Thor-
vard Spafbodvarsen. b) Kalvskind, en liden Bondegaard me-
lem Svartseddal og Desfjorden. Kong Harek fra Oplandens i Nor-
ge, som Kong Olaf den Hellige overrumplede, og lod hans Dine
udstikke, blev skicket til Island, fordi Kong Olaf troede sig ikke
sikker, hvis han beholdt ham i Norge. Kong Harek var anbefalet
nogle fornemme Mænd i Island; men han fandt sig ingensteds for-
noiet, forend han kom paa Kalvskind til en ringe Bonde, hvor han
kunde raade for alle Ting. c) Bogtrykkeriet, blev først indført
i Nordlandet af en Svensk Præst, Zon Matthieson, som drev det
paa Breddebolstad i Hunevands Syssel, og levede sammesteds 1543.
Hans Son forde det til Nupefell; og trykkede der Boger; den Tid
Biskop Gudbrand begyndte sit Bogtrykkerie paa Holum. Ende-
lig fik Biskoppen det til sig, og foretogede sit Værk dermed. 1685
tog Biskop Thord Thorlaksen det til sig til Skalholt, som Arv ef-
ter sin Broder, Biskop Gisle; men hans Son Brynjolf, som hav-
de forr det til Hlidarenda, maatte efter Process og Dom levere

A a a a

det

det fra sig i 698 til Biskop Biorn Thorlefsen eller Høle Bispestol, hvor det efter Stifterens Hensigt skulde stedsbe blive. d) Et Been-
 råd af et Menneske blev fundet i 748 paa Raunegil Præstegaard
 ved Desfjorden, i et høit bart Holt, ved Indgangen af en Saare-
 Stie. Vi saae disse Been i 755 i de høie til et meer end middel-
 maadig høit Menneske, men ere overmaade tykke og stærke, især
 Hovedskallerne. Man slutter af et Sted i Vigaglumss Saga, og
 flere Omstændigheder, at disse Been maa være henved 800 Aar
 gamle. e) Et skrækkeligt forgiftigt Lustsyn, som en fort Sky,
 i Skikkelse af en Borne-Top, havde i næstafgite Hundrede Aar
 ladet sig tilsynne paa Siglefjordsfjærd, en hoi Stiedvei mellem Glis-
 ten og Siglefjord, hvor det i en smal Sti, Nat og Dag, skod sig
 ned paa de Reisende, dog, skönt de vare mange baade for og bag,
 skun paa een ad Gangen, da den samme dødde i et Dieblis; dog
 reisde Folk alligevel ofte herover uden at komme til Skade. Men
 ved 1730 tog dette Onde meget til, og man holdte det almindelig
 for den onde Lands Virkning. Stifts-Præsten, Hr. Thorleb
 Skaptesen, fik da Befaling af Biskoppen at holde Ben og Guds-
 tiensse paa Stedet: et Alter af Steene blev bygget, og Guds-
 tiensse holdt i mange Menneskers Nærværelse. Dette skeede hen-
 ved 1735, og fra den Tid er ingen kommen der til Skade.
 f) Glemte nyttige Øvelser, i Jesland, ere fornemmelig Svøm-
 men og Skielshen; denne sidste have dog nogle beholdt paa Nord-
 landet, især en Præst, Hr. Thorgrim, i Sniofsedalen, som øvede
 den med Nytte: hans Søn, Hr. Jon, som er Præst paa Halse
 og lever endnu, veed ogsaa Reglerne dertil.

§. 762.

Foruden de 3 bekiendte Havne, som de Handelnde bruge, findes endeel Havne og Ankergrunde nord paa. De ældste Tiider vare disse meest brugelige: Blandafodens Os eller Udlob i Humes vands-Syssel, Kolbens-Naena i Skagefiord, Gaasøre i Desforden, Skialfandestfiort i Thingoe-Syssel. Man viiser endnu Liggepladsen dybt (3 Milie) inde i Landet, under Fossen eller Bandfaldet i bemældte Flo, ved Thingoe. Leerhavn, vesten for Langenæs, var ogsaa brugelig. Nuomstunder have fremmede Nationer, især Hollenderne, som fiske i Havet her uden for, adskillige Ankergrunde, som: i Liorten, Siglefjord, ved Grimsgø, i Storeviig, yderst paa Langenæs; men Naufarhsfi paa Slekten (kort herfra) er dog den beste og sikkerste: den har 8 Favnæs Dyb, ligger i Læ for en De ved Indgangen, og man kan slippe derind med mange Slags Vinde.

Øster-Island.

Mule- og Skastefjælds-Syffeler.

§. 763.

Østerlandets
almindelige
Inddeeling
og Størrel-
se.

Østfiorde og Østfirdinga-Siordung kalder man den Strækning af Landet, som gaaer først norden fra Langenæs og sønder til Østerhorn, og siden igien, fra dette Forbiærg vester til Stank-Lven paa Solheime-Sand. Den Deel, der vender imod Østen, kaldes egentlig Østfiorde, ligesom den imod Vesten Vestfiorde (§. 544.); for de mangfoldige Siordes Skjød. Østerlandets verdslige Inddeeling er rettet efter denne Beliggenhedens Forstik, i tvende Syffeler, af hvilke ethvert er meget større, end noget andet Syffel i Island, og af den Aarsag igien deelt i mindre Parter; thi Sønder-Kysten eller Skastefjælds-Syffel deeles i 2de, ved den Elv Nupsavande paa Lomegnups-Sand, en stor øde Sandstrækning. Ligeledes deeles Østfiordene eller Mule-Syffel i 3de Parter, nemlig Norder- Mid- og Sønder-Parthen: imellem denne og Skastefjælds-Syffel er Lonsheeden imod S., og den Fjældvei Øren i N., imellem den og Mid-Parthen. Endelig skilles denne Part igien fra Norder-Parthen, deels ved den Elv Ravngiærdsaa, deels ved Lagerfloden. Reisen over Østerlandet skedde i Aarene 1756 og 1757. Det første Aar besaae vi Skastefjælds-Syffel og Sønder-Parthen af Mule-Syffel, og den ene af de, nemlig Biarne Povelsen, Resten af Mule-Syffel det andet

andet Aar, som var det sidste vi reisde der i Landet. Størrelsen er, i Hensigt til Østerlandets heele Udstrækning med Viærge og Sand-Ørkener, meget betydelig, men i Hensigt til Bygden langt ringere. Fra Pynten af Langesø til Østerhorn ere lige frem 35 Miile. Men naar man regner Kystens Krummelse, og dog gaaer alle Bugter og Fjorde forbi, bliver Mule-Spyssel endnu længere. Fra næstbemældte Forbjerg, i lige Linie til Stank-Elven, bliver Skafesøls-Spyssel 36 Miile; men Havkantens Boielse er her anseelig. Ellers naar man vil regne Østerlandets Vidtøftighed efter Veienes Længde, som her er baade stor og besværlig; da bliver Forskiellen langt større. Der tælles i alt 19 til 20 Jølandske Miile eller Thingmannaleider fra Langesø til Stank-Elven; men somme af disse ere ganske korte, især hvor Veien er ujævn og besværlig; dog udgjør denne Veies Længde henved 80 Danske Miile. Bredden, fra Jøklerne til Havet, er 10 til 20 Miile; Bygdens 2 til 4.

§. 764.

Beliggenheden og Egens Beskaffenhed paa Østerlandet er meget forskiellig. Der sees overalt vidtøftige høie og bare Fjælde; dog meest i Skafesøls-Spyssel, hvor de ildsprudende Jisbjærge og de til Sand, Aske og Viimpsteen forvandlede Sletter, udgjøre den største Deel: det er kun de østligste og vestligste Stykker, der kunne kaldes nogenledes beboede. Mule-Spyssel har en frugtbarere Grund, thi de ødelæggende Jisbjærge ligge der længer borte fra Bygden. De Elve som komme fra dem, gjøre her ikke nær saa stor Skade, som hine i Skafesøls-Spyssel, hvilke ikke have Bredde af Jordsvær, Klipper eller fast Grund, og derfor bestandig forandre deres Rende, oversvømme det flade Land, og ødelægge Aar

efter Aar Grønsværen, hvor den moder. Heraf kommer det, at Bygdens Bredde er i disse Syffter meget forskiellig; thi i Østfiordene, især Vapnesfiord og Hlottsda's Herred, er den 6 til 10 Mille, men i Skaptetfjælds-Syffel kun 1 til 4 Mille.

§. 765.

Strandlan-
ten.

Fra Pynten af Langenæs til Østhorn tæller man disse Størde og Biiger, som for den største Deel ere beboede. Skaalerange er den Pynt paa Næffet, som skiller Fierdungerne, tillige med Heskundeheide, som nu kaldes Hallgilstadeheide; dog høre 5 Gaarde sønden paa Næffet til Sodenæs-Præstefald og Holum eller Norders-Stiftet; men i Henseende til den verdslige Rettergang m. v., høre de til Mule-Syffel. Rumbleviig er her den nordligste beboede Bugt. Gunolfsviig, sønden for Melræfshals, (en kort Fjældes-vei, og en Deel af Heskundeheide), er nu forladt. Sinnefiord, Midfiord og Bæfesiord ere beboede: i denne sidste staaer Skæggestade, den nordligste Præstegaard og Kirke i Skalhøls Stift. Sønden for Bæfesiord er Vapnesfiord, een af de meest bekiendte, formedest Havnen, Bygdelavet og Handelen. Hertil skal man reise over en stor Fjædvei, Strandhøvnshæide, hvilket Fjæld ligger i N. N. fra den Ørken-Haug's-Ørve, der igien grændser til de andre store Høls- og Madredals-Ørkener. Kysten fra Vapnesfiord nord til Langenæs, kaldes Langenæsstrande, hvor der falder en Mængde af Dribetømmer, Sæl, Haakal, Forst og Hval iblandt. De smaa Elve og Bække give Forellesangst. Den Havkant imellem Bæfesiord og Vapnesfiord, kaldes især Norderstrand og Sønderstrand, og paa denne sidste er en Bugt, kaldet Vidviik, meest bekiendt af en liden Strækning af høie Strandklipper, som giver Viærgfugle, og heder Vidviigsiærg. Vapnesfiorden

giver

giver baade Driv-Hval og Sommer, Torsf og Foreller, tilkigemed Sælhundefangst, hvilken her drives overalt paa Kysten. Oppe i Landet, imod V. og N.V., ere endel hoiø Viærge: Arnarsfjall, Seliardalsfjall, Saagangar, Strandafjall, Eylisfhnukr, og Herdabreid, et i gamle Tiider bekiendt ildsprudende Viærg; endel af disse Fjælde have stændig Is og Jokel paa sig; men de ere langt fra Bygden, og derfor lidet bekiendte. Fra Vapnesfiord reiser man en lang Fjældevei, Smørvandsheide, til Jökeldal, en vidtloftig Byg, 6 Meile lang, paa begge Sider af Jokelsaa, en meget stor Elv, som siden skal nærmere omtales. Egnen er her bevoxen med godt Græs og smaa Birkeskov overalt. Op til Fjældets have Indbyggerne gode Afretter eller Græsgange, i Ravnfjeldsdal, som var beboet i gamle Dage. Eivindarholknar og Heederne ere her meget græsruige for Afrets-Kvæg; men Fraliggens heden gjør, at man ikke kan benytte dem, som ligge imellem denne Bygd og Madredalen: Hestene kunne her gaar ude heele Vinteren, i Maristunger, Arnedal, Løgevalle o. s. f. Fra bemædte store Dal reiser man over Fliotsdalsheide og Laagheide til Fliotsdals-Herred, eet af de allerførste og smukkeste Bygdelave i Island. Det har faaet Navn efter Fliotet, den største Fjord i Landet, bekiendt under det Navn Lagarfliot. Ud fra benævnte Heeder løber en stor Odde, mellem Jokelsaa og Fliotet, kaldet Tungu: dette Stykke Land er beboet, og udgjør et heelt Kirke-Sogn. Indbyggerne drive Fiskerie, saasom den aabne Søe ligger her lige for og danner en stor Bugt, kaldet Herreds-Floe, imellem Malen, som er Vapnesfiordens sydligere Forbiærg, og de Strandfjælde, der løbe imod Østen fra Fliotets Udlob. Paa samme Strækning er Sagredal, Marviig og Vorgerfiord, og derfra tælles imod Sonden

Sønden til nærmeste Handelssted, følgende Vilger og Fjorde, hvor af den største Deel ere beboede og give Torste og Haakallesfangst: Brunavik, Breideviig, tvende Alpreviiger, Zuseviig, Lodmundsfjord, Seydarfjord, Mjovesfjord, Nordfjord, Zellisfjord, Vedfjord, Sandviig, Vadleviig og Keydarfisrdur, som af Fremmede kaldes Rødesfjord, hvor Compagniet har sit andet Handelssted for Østerlandet. Estefjord er i Rødesfjorden. Denne Strandkant og Oplandet, til Lagarflot, udgjør Midparten af Mule-Syssel, men vi maa tale under eet om Fliordals-Herred, som indbefatter mange Bygde og Kirke-Sogne, hvilke den store Flod deeler igjen imellem Norder og Midparten af Mule-Syssel. Dette Landskab overhoved kaldes Herred, og en Deel af det til S. Fliordsdal, en folkeriig Bygd, hvor man seer det seculariserede Kloster Strida, først stiftet Aar 1494 af Biskop Stephan, som satte en Prior derover. Til S. ligger endnu en afsøelt Bygd og Kirke-Sogn, Skreddal, hvor den Præstegaard Thing-Mule ligger: den heeder lige som Flødet i Nærverølsen, af hvilket det ganske Syssel haver faaet sit Navn. Nogle holde Fliordsdals-Herred for det deiligste og bedste Landskab paa heele Island. Det har ogsaa, i Hensigt til Bygdens Blidhed, samt Flodens og de nærliggende Viærges smukke og bekvemme Veligheden, noget forud for andre. Floden, der fører et stille Vand, seer ud som en stor fersk Sø, hvori Indbyggernes allevegne fiske udfor deres Gaarde. Jordsmonet er meget frugtbart, med kraftigt Græs og jævnlige Omvekslinger af Birkeskov, hvilken paa nogle Steder giver Tømmer til Huuse. Desuden har man ikkun en kort Vej til Havet, for at hente derfra Torst, Haakall og andre Fiske: oppe i Landet har man ogsaa endel fiskeriige Seer og Dække. Dette tilsammen gior,

gjør, at Flotsdals-Herred haver virkelig noget forud for andre Landets Herreder; thi endskjønt der vel kunne findes alle de foranstørte Herligheder, da have de dog ikke saadan en Mængde Gaarde, eller en saa ordentlig udstrækket Bygd, uden store eller fæle fladelige Fjælde; men i det øvrige af Østfiordene, nemlig her sonden for, ere endel temmelig steile, dog ickus korte Fjældeveie. Nu maae vi da gaae videre. Den nærmeste Bugt sonden for Rodøfiord er Saastrødsfiord, dernæst Stødværfiord, Breddalsbugten og Børefiord: alle disse Fjorde ere beboede. Sønden til, i Gabet af Børefiorden, er den liden Bugt Dybevaag, en god Havn og Handels-Sted for Compagniet, hvis Tjenere her handle i Sønderparten af Muule-Spyssel, ligesom de andre Parter have hver sin Havn. Sammerfiord og Alptefiord ere de sydligste i Spyselet, og uden for denne sidste begynder et Sand-Rev, der gaaer omkring Øster-Horn, eller Lons-Heiden, til Lonet, som er den første Bygd og Kirke-Sogn i Skastefjælds-Spyssel. Lonet inden for bemælte Rev, er en smuk stille Bugt; Vandet i Alptefiord og Sammersfiord er stille af samme Aarsag; bemælte Rev fortsættes og igien forbi det andet Forbjærg, som ogsaa kaldes Horn eller Øster-Horn, og Fjældveien der oven for Almanneskard, imellem Lons-Sogn og Hornesfiorden, som er en breed, men meget lidet indfæaaen Bugt, der har faaet Navn af bemælte 2de-Horne. Hornesfiord er den anden største Bygd paa Østerlandet, 5 Milie lang, og har fornemmelig 3de Præstegjæld: dens Veligheden er ret besynderlig deri, at den ommælte Sandbanke vedvarer endnu langs med den, uden for ved Havkanten. Søen inden for den er ganske stille, i Fjærdingsveie, hvor den er breedest. Havvandet er ikke meget salt her inde, thi det har kun et eeneste Udlob ved Bø-

ster-Horn, og derhos rinde deri 4 store Elve. Foruden Havn, Toreller, ere Glyndre den Fjæ, som her falder i størst Mængde, hvorfor den fanges flittig af Indvaanerne. Midparten af Hornsfjords-Bygden er meget ødelagt, ved det 3de store Jøkel-Elve, Zeinebergsgaa, Solmsaa og Kolgrima, styres her ned fra Jisbiærgene, og breede sig ud over det flade Land. Det øvrige af Østerlandets Søekant, lige til Rangaavalle-Syssel, haver ingen Fjorde, men er en fæl Sand-Strækning med idelige Brændinger, og der imellem mangfoldige Udløbe af de søle Jøkel-Floder, som have ganstø ødelagt denne skønne Kyst. Fra Hornsfjorden gaar Havbredden lige frem i Sydvest til Øraferne, eller det Forbiærg. Ingolfshofde, hvor Ingolf, Landets første Beboer, landede allerførst i Aaret 873: her er et høit Bjærg, hvor der boe Alfer, Papegoier og Rytser. Ingolfshofden er nuomstunder skilt fra det faste Land, ved Jisbiærgenes Omtumlinger og den lave Sandgrund, hvilken jævnlig oversvømmes af de ustadige Vandfalde fra Jisbiærgene; dog bliver Vandet sielden dybere om Sommeren, end at man jo kan riide der over, undtaget naar Sneideraa stiller den ganstø fra det faste Land, hvilket skæde i den Tid, da vi reisde her forbi. Kystens Længde fra Hornsfjord her hid er 18 Miile, og saa lang er den Sandstrækning Bredemarkes Sand, som tilforn haver været beboet. Men fra Ingolfshofde ligger Kysten lige i V., uden om og forbi Lomegnups-Sand, det Bygdela Siden, Alprever og Medalland til Sistrlevshofde, et andet Forbiærg, som staaer midt for den Ørken Myrdals-Sand, hvor man endnu finder en liden Gaard beboet. Her begynder Kysten at boies til N.V., forbi Myrdals-Bygden til Solheime-Sand, og tillige at viise flere Klipper og Landings-

Pladser,

Pladser, hvorfor ogsaa Indbyggerne drive her Fiskerie paa adskillige Steder.

Nu have vi gaaet Østerlandets Strandkant igennem, og tildeels Bygden langs med samme. Men, for ikke at gjøre denne Beretning uforstaaelig, have vi gient Øerne tilsidst. De findes her kun saa, ligesom norder paa Landet; og omendskjønt Øster-Kysten ligner den modsatte, nemlig Vestfiordene, i det den haver saa mange Næs og Fjorde, saa ere disse dog meget mindre, end hine, og Øerne derhos ganske saa. Inde i Vapnesfiorden ere 3de Holme, blandt hvilke Leidhavns Holm er deri mærkvaerdig, at der, inden for den, er en gammel Savn, som er meget dyb, og holdes for at være et godt Vinterleie. Biarnse er temmelig stor, og ligger sonden til ved Vapnesfiord, uden for Kolmule-Fjeld; her have Vapnesfiordingerne deres Udvar og Fiskerie med Torsk og Haakall; der fanges ogsaa Sælhunde. I Lagerfjoden ere nogle færaa Øer, men unyttige. Uden for Borgerfiord, og især Niarvig, ligger Niarvikur-Holme, og for Rødesfiorden Seley, hvor Indbyggerne have et Fiskerleie, og desuden bygge Søefugle her. I Saastrudsfiorden er Skrudr, en hoi Ø, som er et Viærg i Soen, hvor ogsaa er Fiskerleie; der falde ogsaa Fugle og Æg, især sidet af Viærgfugle. I Breddals-Bugten ligge nogle smukke Øer, der høre til Eydate-Præstegaard; her hee Ederfugle og Papagoier. Ved Vullands-Næs, tæt ved Væresfiords-Havn, ligge endel Øer, som ogsaa give Fugle, men især Sælhunde, der fanges i Garn og skydes med Flinter. Til disse Øer grændse endel andre, uden for Hammersfiord og Alptefiorden; nogle af dem høre til Præstegaarden Svættaa, og give Ederfugl, Æg og Quun; men den allerfordeelsagtigste af Østerlandets Øer er Papse, hvilken

Øerne.

er beboet, og ligger midt uden for de sydøstvendte Der. Den hører Kongen til, og forpagtes bort. Der er megen Fuglesangst, Bjærgfugl, Rytter, og især en Mængde af Eg og Ederduun, hvilket skal aarlig beløbe sig til en anseelig Fordeel. Nogle faa mindre Der ligge under Papoe, som ogsaa bringe Nytte. Imellem Øster- og Vester-Horn er Vigur, en De, der hører til Stadsfællesskabet; den giver Maagesangst, og det er ingensteds, uden her, at den store hvide Maage (*Larus Glaucus*) (674. c og 744.) bygger sin Næde oven paa Den, og lægger Eg paa det flade Græsland. Om Vinteren for Juul hngle her de store Sælunde, af den Art, der kaldes Udsæl (*S. 653.*). Den er meget høj, og omgivet med stejle Klipper, undtaget eet Sted, hvor man gaaer op igjennem en smal Sti. Her klavrer ogsaa Udsælen op, og søger der sine Unger. De gamle Sælunde, naar de mærke deres Bøgere ere paa Den, storme de ligesom rasende til denne Nedgang, som da besættes med tilstrækkeligt Mandskab, for at tage imod dem. Inden for Gabet af Hornesfiorden, eller dens Lon, ligge nogle smaa Der, hvor vilde Fugle lægge Eg: den fornemste af dem heeder Alkerse, som tilforn har været Sædeland, men er kun Græsland nuomstunder. For Bredebankens Sanderk ligge disse Der. Imod B. eller kort østen for Dræverne, er Tvister, eller 2de Klipper uden Græs. Her fanges iblandt meget store Sælunde. Zrolløgs-Der, 3 i Tallet, kort vest for Hornesfiords-Bjgden, ligger for Jofels-Naens Udlob, og 1 Mil fra Landet, give Udsæle og deres Unger. Tiiden at fange dem er kort for Advent. En Klippe, Geirfuglestær, skal ogsaa ligge her ude i Havet, nogle Mile fra Hæbbedden. Geirfuglen, *Alca rostri fulcis octo*, *alis minimis*, skal opholde sig her; men man maae ikke sammensblende

blande denne De med de under samme Navn bekiendte Klipper paa Sønderlandet. Om Ingolfsholmsøe er forældet. For Myrdalen ligge, inden for et Rev, 2de Der, Dyrholar, det er, Dørholm; Fremmede kalde den Portland, thi der er en Port eller Dør igiennem dem begge, og paa den eene saa stor, at man paa en middelmadig Vaad kan roe igiennem denne Abning. Kort her uden for staae 6 høie Klipper op af Søen, hvoriblandt 2de ere til Nytte; thi paa den eene boe de forbenævnte hvide Naager; paa den anden ere Vapegoier. Læt ved Myrdalens Forbiærg, Røpne, ligge 2de arrige Klipper: den eene signer en Seiler, den anden et Gruentimmer i Islandsk Dragt, med Top paa Hovedet; i Keyne boe nogle Søsfugle. Havsbunden omkring Østerlandet er temmelig jævn, og Søen reen, liige ind til Stranden, paa de fleste Steder, undtaget hvor foremeldte Der og Klipper ligge, hvis Skær og Banker dog kun sjelden naae længere end 1 Mil ud fra det faste Land.

§. 766.

Der ere vel Biærge nok overalt i Island, ja overhovedet alt for mange og store; men dog ingensteds flere eller større end paa Østerlandet. Det blev for vidtøstigt at opregne alle de store og bekiendte, og dog er den største Deel, i de vidtøstige Fjælde-Ørkener, nuomstunder ubekiendte. Vi have nyelig nævnet nogle af disse Biærge, Ørkener og Fjældeveie (§. 765.), dog især Forbiærgene; men nu ville vi lægge nogle til. Oven for Bygden, langs efter Landet, sonden fra, ligger en Række af vidtøstige Fjeldbiærge, nemlig Myrdale-Jøkel, Side-Jøkel (eller den høie og nordre Skæderaa-Jøkel), Græve-Jøkel, Bredemarka-Jøkel, Heinebergs-Jøkel. Disse Fjælde deles igen, og hver af dem beteg-

De fornemste Fjælde og Biærge.

nes med sit eget Navn: f. Ex. Myrdals-Jokel indbeesles i Øfjalds- og Solheimes-Jokler og Katlegiaa; Dræve-Jokel i Sandfjalds- og Knappsfjalds-Jokler o. s. f. Men bag ved disse Jisbiærge sees igien andre betydelige Fjælde, de fleeste overhylede med Jokel, som Torse-Jokel, der staaer for sig selv, norden for Katlegiaa, Hofs-Jokel, som her kaldes Lange-Jokel, og ligger længer i Nord. Skaptaa-Jokel ligger tildels bag ved Siden. Klofe-Jokel ligger her nord og østen for, endnu længer borte, og naaer paa eet Sted til Dræve-Jokel. Nogle kalde den ogsaa Lange-Jokel, og sammenblande den, endskjønt urettelig, med Hofs-Jokel; andre kalde dens Sønder-Deel, endskjønt uden Grund, Bald-Jokel. Ved denne store og vidtloftige Jokel, (som har atter nær ved sig nogle mindre Bjærge med Jis paa), forstaaes i det næst foregaaende Stykke, de Jisbiærge (S. 703.), om hvilke der er nælbt, som beliggende norden for Hofs-Jokelen. Klofa-Jokel har faaet Navn af de 2de udstrakte Arme, som danne en stor Bugt eller Kloft, og herfra komme de 3de store Elve, Skials sandeflod, Jokelsaa i Østfiord, og Jokelsaa i Mule-Syssel. Hærdebreed og Trolldynger ere 2de bekiendte særskilte Bjærge, der have sprudet en forfærdelig Jid i gamle Dage; men saasom de ere hoit oppe paa de øde Fjælde, have de ikke gjort Bygden stor Skade. Den vidtloftige fæle Strækning af smæltede Klipper, som kaldes Udæde-Zrøn, er fornemmelig deres Affodning. Der ere kun 7 til 8 Meile imellem dem. Hærdebreed er østligst, og man seer den hoit oppe i Landet til V. fra Vapnefiorden: den er et hoit Bjærg, ligesom en Firkant, med uhyrlige smæltede Klipper oven til. Trolldynger er derimod et lavt Bjærg med nogle og især 3de Afdeelingar og forbrændte Spidser, men rundagtige Knolde der imellem.

Hvad

Hvad Siælboveiene angaaer, agte vi ikke at opregne de be-
 kiendte i Bygden, mellem høert Tinglav eller Kirkesogn, men al-
 eene dem, der ere blevene brugte i forrige Tiider, over de vilde
 Siælde, langs og tværs imellem Sønder- Nord- og Øster-Landet,
 hvilke nu ere gangne af Brug, og glemtte for lang Tiid siden, til
 største Skade og Besværlighed for det Almindelige. Man seer af
 de troeværdigste og ældgamleste Skrifter (s. E. Landnama-Saga),
 at en Siældevei, kaldet Vonarstard og Vaardargata, har været
 i Brug tværs over Landet, norden fra Vaardardal i Thingore-
 Syssel, tiige sønder til Fljotsrhverfi, midt paa Siden. Af et andet
 Skrift (Nials-Saga) seer man, at der har været en brugelig Wei
 fra Sønderlandet, bag ved Skastefells-Syssels Tisbiærge;
 og af det 3die (Kafutels-Saga), at der, fra den øverste Bygd i
 Fljotsdals-Herred, haver ligget en kort og god Wei, bag ved alle
 Tisbiærgene, til Altinget. Om Kisl og Øfiorde-Neien, eller
 Vatnehjalle, er for berettet. Paa den søndre Side af Hofs-
 Jokelen, fra Arnæs-Syssel til Thingoe-Syssel, veed man endnu
 af en Wei; dog er Sprængesand, fra Rangaarvalle-Syssel til
 Nordlandet og Østfiordene, allermest bekiendt: den blev meget
 brugt i gamle Dage, og Biskop Brynjulf Svendsen lod søge den
 op igjen, da han skulde visitere i Østfiordene. I disse Tiider er den
 ogsaa bleven forsøgt nogle Gange. I den Tiid vi reisede i Is-
 land levede endda nogle gamle Mænd øster paa, som vidste at for-
 tælle efter deres Forældre, at det ikke var lang Tiid, siden Ind-
 byggerne i den østlige Part af Skastefjælds, og den sydligste af
 Mule-Sysseler, havde reist en kort og jævn Wei bag ved de store
 Siælde til Langanæs, hvor de drog aarlig hen for at hente Gavn-
 tømmen til Bygninger og anden Huusbehov. Men ved det de saa
 Fældre

Siælboveie,
 især i gamle
 Dage.

Kaldte Siælehuuse og andre gode Anstalter, til at holde disse Veie vedtlige, ere nu reent nedlagte, saa at man ikke eengang veed hvor eller hvorledes slige Huuse have været giorte og indrettede; saa have Islænderne mistet baade al Samfund med de langt bortliggende Egne, og alle de Herligheder, som følge med samme. Sprængesand især burde og kunde fornyses igien: der behøvedes ikke mange Omstændigheder til at bygge 2de Sælhuuse, om de endog skulde forsynes aarlig med lidet Høe o. s. f. Man skal reise fra Arnæs-Spyssel, over Thiorsaa, til Rangervalle, og der op til Fjælds over Tunaa, hvilken er den sydlige Arm, der udgjør Thorsaaen. Veien falder stændig imellem langagtige Fjældrader paa begge Sider, (hvoraf den eene er Østerkantens Jokeler), forbi Hærbreed og Froldbynger. Man skal over en Deel af det sæle Udødehron, og her fra kan man reise, hvorhen det behager, enten langs med Jokelsaa, til Herredet og Vapnesfjorden, eller over Nødredals Drøve til Langanæs og Myvatn, eller og langs med Skjalsandefjot til Baardardal. Denne Reise kan være giort paa 3 til 4 Dage, naar man riider uden svære Læs, og ellers paa 5 til 6, i Stedet for at man behøver dertil 2, 3 eller 4 Uger igiennem de nu brugelige Landeveie, og dobbelt saa lang Tiid frem og tilbage. For Exempel. Naar Bispen i Skalholt visiterer i Østfiordene, reiser han først over den Fjældevei Sand, som er 2 Dages Reise, til Hunevands-Spyssel eller Skagefjorden; (thi Riotsveien bruges kun sielden i disse Tiider, siden Siælehuusene ere forfaldne), og saa langs omkring over Nordlandet til Langanæs, derfra til Vapnesfjorden, og Resten af Muile-Spyssel: det bliver hen ved 130 Miile frem og tilbage, en paa mange Steder høist besværlig Wei, som dog maa reises i en kort Tiid i de beste Som-

mer

mer 2 Dage, og Reisen endelig fuldendes førend det begynder at snee og fryse.

Reisen til de Vand- og Ild-sprudende Fjeldbærg.

§. 767.

I Aaret 1756 havde vi sat os for at besøge dette Slags Vær: Forberedelse, ge, hvoraf Østerlandet kan fremvise nogle, som ei have deres Lige. Anledningen gav Katlegiaa Aaret næst tilforn, nemlig 1755, ved dens bekjendte Opsprudning, som endnu det efterfølgende Aar vedvarede af og til. Veien faldt da først til dette Fjeldbærg; det var ogsaa Sønderlandet nærmest, og vi tænkte maaskee at kunne komme der op, og lige til Opsprudningen. Men førend vi begynde Fortællingen om denne Reise, ville vi give en kort Beretning om Ildsprudningen selv, og det i samme Hensigt, som vi havde ved den Beskrivelse derover, som vi samme Aar skikkede til Societætet, og som alt er bleven udgivet ved Trykken, nemlig at viise Ildsprudningens naturlige Begivenheder, dens Forspil og adskillige Virkninger og Folger.

§. 768.

Vi have i det Stykke om Nordlandet berettet om det Jord: Katlegiaas
stælv, som Myrdals: Jokelens underjordiske Bevægelser ventelig sidste Ild: og
have foraaarsaget. Henved Aar 900, kort efter den første Beboel: ning.
ses: Tid, har denne Jokel først opført et bedrøveligt Skuespill af
dette Slags, og siden, indtil vore Tiider, saavidt man veed, 5
Gange. Man havde ingen Forvarsel for dette sidste, undtaget at
der opkom fra Jokelen, Sommeren førend samme brækkede løs i
Esterhøsten, 2de nye Elve, hvilke de som reisede over Myrdals:
Sand maatte fare over. Heraf gjorde dog ingen sig Tanker om

Ecc cc

den

den forestaaende Jdsprudning, endskjønt det var og haver været et vist Eegn til, at Barmen i Fjældets Afgrunde vorede, og smæltede Jisen, meer end sædvanlig. Naar Barmen haver gjort den første Nabning i Jisen, skeer der gierne Jordskæls, ved det Vandet oven fra styrter ned til Heedens Gange, der ligge dybt i Landets Grundbolde, og gaae deels ned til Havet, deels til langt bortliggende Egne og deres Fjælde, især til dem, der have brændt tilforn: disse ere meer aabne end de andre, og tieue usformærkt til Trækfuller for Luften, endskjønt Jiden kan være langt borte fra deres Egn.

§. 769.

Jdsprudningens Begyndelse.

Den 17 October 1755, Kl. 10 Formiddag, mærkede man i Myrdalen meget hastige og uordentlige Rystelser, hvorved Huusene bleve beskædigede. Dette har en stor Vandstyrtning ned til Jiden forarsaget, i det denne i Forveien har nærmet sig og smæltet Jisen bort; men den fik strax Overhaand over Vandet, og skød sig op med desto større Kraft, og smæltede Jisen ganske bort. Thi kort derefter saae Myrdalens Indbyggere en stor Vandflod i 3de Arme, til S. og V., at strømme ned fra Katleglaa, og sætte under Vand den heele Lava-Egn, Myrdals-Sand, som er 5 Miile lang, og 4 Miile fra Jokelen til Havet, eller fra N. til S. Strømmen forde ned til Havet en utroelig Mængde store Jisstykker, som smaa Bæрге, af hvilke det eene Stykke stødte det andet frem: Klipper saa store som Huuse sadde fast i disse Jisstykker, og Vandet var desuden fuldt af mindre Jisklumper, og Pimpsteene, meest sorte, samt tykt og gruuset af Svovel-Peer og Aske. Formedest Jordskælvene vidste Indbyggerne ikke hvad der var paa Færde, men da de strax derpaa hørde et overmaade stærkt

Rnald

Knab fra Jökelen, saae de derhen: Ild og Vand sprang da høit op i Lufsten verekviis, med saadanne Knalde og Dragen, at de tænkte, at Landet skulde forgaae; strax derpaa begyndte bemældte Vands og Jisflod, og Opsprudningen skedde igiennem 3de Aabninger, alle nær ved hinanden. Først saae de en tyk Røg-Skye at stige op: den var ganske sort, og efterat Ild- og Vandsprudningen havde været nogen Tiid, kom en tyk Hagel af sorte Pimpe og andre Steene. Imidlertid vedvarede Jordstøtset, dog med den Forandring, at Hævelserne vare langsomme, med en besynderlig Bulder i Jorden. De opkastede Steene vare 2 Slags, og begge Deele gloende; nemlig Pimpesteenen, hvoraf de største sandtes 2 til 3 Pund tunge, og en lysegraa blaalig Art, meget haard og tung. Ild- og Vandsprudningen blev siden meer uordentlig; men nok saa hæftig som før. Iblandt bleve store, meget klare Ildklo-der opskudte høit i Lufsten, og sprunget der i utallige Stykker; man saae dem tiid, ikke alene fra Myrdalen, men ogsaa fra langt borte liggende Egne. Ovenpaa den første Ildsprudning og Steenhaglen, faldt en virkelig Hagl, som var besynderlig deri, at der, midt inden i hver Jiskugle, var lidt sort Sand eller Aske, som Lufsten paa denne Tiid var fuld af. Alt dette skedde den første Dag. Matten derpaa gav Bjærget baade et rart og skrækkeligt Fyrværk. Ikke alene over Jökelen, men alle vegne, var Lufsten fuld af Funker og Blammer, og saa lys iblandt, da de Lynild-lignende Kloder sprang op, og i samme Øieblik udsprede sig viddt og breedt i utallige Deele, at det var saa klart ude, som om lys Dag. Denne Lynild og disse Funker stoe ogsaa til andre Bygdelave. Der stod nu en bestandig Ildstorte op af Jisbjærget, og viiste alleslags Skikkelser og Farver; men derhos hordes idelig ligesom store Canon-skud,

samt Bragen og Bulder. For Lugten havde man en ulidelig Svovelskank, som, tilligemed den fine Aske, trængede ind i Næse og Mund, og ned for Brystet. Alle Ting vare overmaade forfærdelige for de arme Fiskere: Himmels og Jord stode i lys Lue; den brændende Materie faldt paa dem, og de tænkte at Verdens Ende var kommen.

§. 770.

De sølaendes Dages Jidsprudninger.

Den 18de var stille, Regn, og Taage, som skjulede Bjaerg og Egnen. Man hørde endnu den samme Knagen, som før, med idelig. underjordist Larm og susende Jordstjælve. Natten derpaa var Fyrværket antændt igien. Den 19de var N. B. Vind og klart Væir i Myrdaalen, hvor man da saae den sorte Røgstotte-suid af røde Junkler, som den paafølgende Nat gjorde ganske lyst i dens Egn; Derimod var det mørkt baade Dag og Nat over heele Landet østen for Myrdaal, og den sorte Sand og Aske faldt over alle Østerlandets Herreder. Denne Dag opkomme imellemstunder saa stærke Knald, at man kunde høre dem i Guldbringens og Klofars Syffeler paa Sønderlandet, 25 til 30 Miile borte. Asken regnedes samme Dag ned paa Færoe. Den 20de var samme Vind og Raserie i Jisbiærget; i det 2de overmaade store Jidskloder sprunget op, hørdes især 2de Knald, som vare langt stærkere end alle de andre. Den 21de blæste N. B. Vind, da Mørket og et meget stærkt Askesog ogsaa kom i Myrdaalen. Dagen efter blev det mørkt, som om Natten, da den største Mængde af Pimpsteen-Sand faldt over benævnte og nærtiggende Egne; derimod sagtedes meget Uroelighed den i Biærget og Lusten. Denne Nat beskuede vi Jidsprudningen fra Vidøe; thi man kunde nu tydelig see herfra over Fjældene, baade den oplyste Røgstotte, og hvorledes de opskudte Jidslugler briste:

de

de i mange Stykker. Den 23de og efterfølgende Dage, indtil den 28de, var Vinden nordøstlig med et forfærdeligt Afsefald og Nattemørke, som strækkede sig til de sydlige Herreder. Den 27de blev Sneen fort deraf paa Vidoe. Snellemønstre mærkede man langsomme stærke Hævelser, hvilke bleve ledsagede af store Bændsprudninger og Jøfelsstyrtninger op af Nabningen. I Nærværelsen faldt Vimpfand, Steene og Gruus 3 til 4 Fod tykt. Fra den 28de til den 7de November var stille Væir med Regn og tykt Lust. Man kunde for Taagen sjælden see noget til Jidsprudningen. Der hordes kun undertiden Kvalde i Lusten. Jordskælvene toge meget af, og fra denne Tid blev man ingen synderlige Jidsprudninger eller Bændstyrtninger vaer, undtagen een stor den 17de November. I det følgende Aar (1756) fornam man 5 Gange til Jid- og Bændsprudning fra Fjældet, nemlig den 15 Januarii, den 28 og 29 Junii, den 12 Augusti, og endelig sidste Gang den 25. i samme Maaned; undtaget hyad vi formodede ved Tilbagereisen den 8 Septem-ber. Ifter var, den 12 Augusti, og Dagen efter, en hæftig Hagel af Vimpsteen med Afsefald og tykt Mørke. Naboeene fulde der- over i nye Angst og Forstrækkelse. Den 25. var klart Solskins- væir, da Fjældet Kl. 6. Formiddag begyndte at sprude, men efter 1 Times Tid var igien alting stille.

§. 771.

Denne Jidsprudnings Virkninger vare: a) Bygdens Denne Jidsprudnings Virkninger. Ødelæggelse, deels ved Bændfloden, men dog allermeest ved den Afse, Sand og Steen, der begravede Skov og Urter vdi og breede. Hermed 50 Gaarde bleve reent forladte, og heele Syssletis Jorde fordærvede, især den ganske Vesterpart; dog allermeest det smukke Kirke-Sogn Skapraatunger. Sandet laae 1 til 2 Fod tykt paa

den flette Mark, noget borte, men nær ved, i Dale, ved Glædder og omkring Huusene, 4 til 6 Fod. b) Fjæld-Egnen neden for Fjeldbiærget, Myrdalsand, og Havet uden for, viisede og viise til dels endnu de tydeligste Tegn paa denne Opsprudnings snart utrolige Kraft og Virkning. Hele Fjeldsiden, paa 2 Milles Længde, viiser især mange tæt hos hinanden staaende nye Biærge og store Klipper, som Jiden og Blandet have opskudt og bortført. Længs efter Myrdalsanden sees trende jævnsides liggende Biærg Rygge, som af Forsningen vare 60 Alne høje, og hvoraf den vestligste var størst: de vare tilsammen en halv Mill brede, bestaaende af Steen og Is-Klipper, med Pimpesteen, Sand og Alfe imellem. Fra Strandbredden løbe de ud i det vilde Hav, saa langt man kunde øine (henved 3 Mile), og Klipperne ragede endog høit op af Soen, hvor Fiskerne havde havt deres Med, og forsikrede at Blandet var 40 Favn dybt. c) Indbyggerne bleve ved dette Tilfælde satte i stor Alendighed, og det paa mange Maader. Ja det er ikke begribeligt, hvorledes de dog alle, saa nær som tvende Mennesker, kunde beholde Livet. Den Dag Jiden brækkede løs, rejsde mange frem og tilbage over den underliggende Egn, og komme dog ikke til Skade; den Tild Vandfloden kom og tog bort alle de Creature, der vare i Veien. Nogle Mennesker vare forbi, andre sluppe op paa Safuro-Øe, et særskilt Biærg paa Myrdalsand, som rimeligt har været omsluttet tilforn; nogle naaede andre Høje, og finge tillige deres Heste biærge: men disse Mennesker maatte ligge ude i 7 Dage, under Jid, Kuld, Regn og Steenhagel, uden Mad eller Drikke, da de siden med stor Nød vovede sig ud, slæbde deres Heste, liggende paa Siden, over Jisen, og saaledes naaede til Hofdebrecte Kirkested i Myrdalen. Den 7 Novembet, da Bland-

dale

floden var borte, prøvede 18 Mænd i Selskab at komme over Myr-
dalsvand; men de kunde ikke, for de sammenkastede Giststykkers
Etyld, førend yderst paa Strandsbredden, da de endelig slutte
derover. Af den befængte Lust, Grovel og Afkesog blev Drifkevand
det overalt fordærvet. Den stærke Grovelstank havde ofte nær kvæ-
let Folk; Brystet blev angrebet, samt Lugtessen og Smagen betagen;
Dinene bleve røde, og Dinelaagene hovnede; Tandkødet svulnede
op, og tilsidst brækkede Huller derpaa, hvoraf der udkom Materie.
Det var ikke nok dermed: de mistede en stor Deel af deres Creatu-
re, foruden dem, som Vandfloden tog bort; thi endeele bleve galne
af Ildfunkerne og Steenhaglen, og løbe bort hid og did, indtil
de styrtede, og de der vare tilbage, bleve udmavrede, saasom der
ei var Græs paa Jorden, og deres Tænder bleve fordærvede af
Sandet. Det værste var, at Ildbyggernes Vinter-Forraad blev
tildeels spilt, og Maden fordærvet af den meget fine Aske, der
trængte ind overalt i Huusene. d) Om Lynild blev noget talt i
foregaaende Stykke (§. 756.). Den der kom fra Katlegiaa, var
i sine Virkninger noget besynderlig. Elleve Heste bleve her i Eg-
nen ihjelslagne, hvoraf de 3 stode paa Stald, og laae døde tæt hos
hinanden. Med de 2de Menneskers Død, som denne Ild traf
paa, gik det til paa følgende Maade. Det ene var en stikkelig
Bonde, som blev truffen, og døde i samme Diebst, i det han gik
ud af sin Dor, medens een af Ildsprudningerne varede. Man
kunde ingen Skade see uden paa hans Legeme; men da man træk-
kede Klæderne af, var Huuden og Kjødet ligge indtil Beenene gan-
ske forbrændte paa den høire Side; Skjorten og Brystdugen vare
ogsaa brændte; rimeligst Toiet har været Linnet, siden de yderste
Klæder, der vare af Uld, ikke vare rorte af Ilden. Pigen, som
kunde

skulde hjælpe denne Mand til at bjærge hans Creature, var det andet Menneske, som paa samme Tiid og Sted blev truffet af Ilden; hun døde ikke strax, men levede nogle Dage, og udstod en utildelig Piine; hun brændte paa den samme Side, og det underligste var, at efterat Huusets Folk, som strax løbe til, havde revet Klæderne af hende og klædt hende i andre, brændte hun alligevel; thi denne seie vedhængende Ild, (som er forskiællig fra den rette Lynild), virkede endda i Svedehullerne, og da disse Klæder bleve igien afstrukne, fandt man, at de vare ogsaa svædne indvendig; ved det Legemes soulkede op, og gik i Materie, (thi Skaden naaede ogsaa til de indvendige Deele), døde dette Menneske kort Tiid derefter. Endnu eet Tegn paa denne Lynilds giennemtrængende Kraft, var dette, som adskiellige mærkede, at den sloi igiennem faste og tætte Klipper, der stode den i Veien, og smæltede runde Huller i den, hvilke vare viideste paa den Side, hvor Ilden først var kommen til, men noget smalle paa den anden.

§. 772.

Reisen til
Kartlegiaa,
især Tjebjær-
gene og deres
Forandringer.

Den Tiid vi først saae Ilden paa Vidoe, tænkte vi det var Hekla, som den kom fra; thi dette Viærg laae fra os næsten i samme Linie, som Myrdals-Jökul, skient den strækker sig noget meer mod Sonden. Vi stode derfor beredde at reise derhen; men i det samme bragte et Bud os den vigtige Efterretning, samt at det var umueligt at komme til Kartlegiaa om Vinteren. Vi rejsede da derhen Sommeren efter, først over Rangarvalle-Spyssel, og derfra op til Fjælds langs med Markersflot, en af de store Elve, sværende hvidt Vand, som kommer fra Torfe-Jökul. Veien faldt over Godaland, en smuk græsrig Egn, der tilforn har været beboet. Her stod Þesjælds-Jökelen lige for os, og tæt ved; den

er

er den vestligste Deel af Myrdals-Jökul, har ogsaa sprudet Vand og Ild i forrige Tider. Tvende Arme af Jisen løbe ned til det flade Land, giennem 2de Viærgkloster. Dette Jisbiærg regnes ellers til de saa kaldte Faldjökler, saasom bemældte Arme skøde sig det eene Nar frem, og det andet trække de sig tilbage; det foranførte om Drange-Jökul (S. 644.) kommer meget overeens med dette; men det, som mældes om nogle andre Østerlandets Faldjökler, er endnu af en betydeligere, og tildeels anden Beskaffenhed. Desfældes-Jökul var nu bleven meget lav, ved Katlegiaaens Omtumlinger, saa at man nu saae 2de smaa Viærge, som ragede op af Jisen, og en sort Klipperyg imellem dem, hvilket ingen havde set i Mandes Minde. Stedet ligger omtrent 5 Meile fra Katlegiaa. Men det vil synes endnu forunderligere, som blev fortaalt om Solheime-Jökul, (som er en Part af Myrdals-Jökulen, imellem Øfælds-Jökul og Katlegiaa), baade af Eysfelmænden og andre troeværdige Folk, som boede tæt ved og liige for den; nemlig, at bemældte Solheime-Jökul havde, ved de sidste Ildsprudninger, bevæget sig hæftig op og ned, og var tilsidst bleven saa forhoiet, at den nu syntes dem dobbelt saa høi som før. At der maae være noget sandt i denne Fortælling, viide vi af andres Beretninger, som fortaalte os om disse Folk, at de bleve forfrækkede ved ovennævnte Syn; thi de frygtede, og det ikke urimelig, at dette Jisbiærg ogsaa skulde opføre samme Sørgespill, som Katlegiaa; desuden vidste de maaskee, at Solheime-Jökul haver ogsaa sprudet nogle Gange Ild i forrige Tider. Til at udfinde slige forunderlige Bevægelsers Aarsag, vil det hjælpe meget, at man veed, hvor videløst og stærk en Samfund de ildsprudende Jisbiærge, endog de længst bortliggende, have imellem sig. At Lufsten har et

stærkt Træk i saadanne Viærge, tviler vel ingen paa, og at nogle af dem have Samfund med Havet, det er klart af Erfarenheden, især af de færreste Soer, som træffes paa nogle af dem, uden Bund eller Grund. Den smeltede Jis kan umuelig være tilstrækkelig til at give Vand til saa forfærdelige Oversvømmelser; thi disse ildsprudende Jökeler miste ikke saa meget af Jisen omkring deres Abninger, og det eneste de miste, bestaaer i de sprungne og nedfaldede Klumper; dette, siger jeg, vil maaſkee beſtyrke den Meening om de Vands og Jidsprudende Jökeler's Natur og Vedligeholdelse, at de maae idelig forsynes med Vand neden fra Havet, have selv store Soer i deres Grundvolde, og derfor, ved Luſtens Udviidelse, naar Jiden begynder at virke, blive flydende, forhoies, bevæges og røres af Stedet. Naar da saadant et Sted arbejder paa en Jidsprudning, og haver desuden Samfund med et andet Sted, ligesledes forsynet med flulte Vandgjemmer, da kan Vandet, som er bragt i Opkaag, baade falde derfra, og Jisen ſølgelig blive lavere, siden det ildsprudende Sted ikke behøver ſaa meget Vand fra Havet; det kan ogsaa falde dertil, naar Grunden hælder fra det ildsprudende Jisbiærg, ſølgelig vil da det andet Biærge Jis, ved det tilvopende og af mellembragte Ting indſluttede nye Vand, oploſtes, og heele Jökelen derfor synes at blive høiere. Denne For- modning er især tienslig til at forklare de Jids og Vandsprudende Jisbiærges Beſkaffenhed, hvorpaa Øſterlandet haver viiſt de ſtørſte og tydeligſte Prover, og den vil igjen og endnu bader oplyſes af det, ſom herefter fortælles om Reiſens Fortſættelſe. Det ſom er ſagt i Forveien, i Anledning af Veitlands-Jökelen (§. 139. til 153.), kan ogsaa tiene til at oplyſe den ſølgende Beſkrivelse.

§. 773.

Siallabak eller **Dagfiælder**, kaldes en Siældevei, som er ^{Veien og} anlagt bag ved forbemældte 3de Siæbiærge, fra Siætskild i Kange-^{Siældegenen.} arvalle = Syffel paa Sønderlandet, til Skaptaatunger i Skafte-
fiælds = Syffel. Vønderne reise ogsaa her op, og længer nord paa
Fiædene, for at samle Angelik = Rødder og fange Joreller. Vi
valgde denne Wei for at komme til Katlegiaa, som seenden til skal
neppe være bestigelig. Veien faldt over forbemældte Godaland og
Markerfiætsdal til et forbrændt Graun, som skiller imellem disse
Steder og Thorsmarken, en smuk Egn, som, i de første Christne
Tiider og ligge indtil 1300, haver været besat med mange Gaarde,
og kunde gierne beboes igien; thi her ere ikke alene store Marker,
beflædte med det kraftigste Græs, saa at Heste og Faar gaae der
ude Vinter og Sommer, men og nogen Birkeskov. Det fineste
Graun er ikke ret gammelt; men naar, eller hvorfor Bygden er ble-
ven forladt, findes intet udtrykkeligt om i de Jeslandske Aarbøger.
Man veed alene at her er gaaet for sig en stor Jdsprudning imel-
lem 1300 og 1350, i de Siælde, der ere norden for Bygden, da
det ommældte Graun har breedet sig ud over et anseeligt Stykke af
Marken. Een Jeslandsk Aarbog taler om denne Tidtragelse, uden
at fastsætte, hvad Aar den er skeet, men mælder dog, at den haver
ødelagt elleve Gaarde, af hvilke den nævner to, nemlig Stang
og Steinstade, hvis Levninger Naboerne endnu viise paa Thors-
mark. I Foden af Blærget, som Defiælds-Jokel hviler paa, sees
store Huiler: de ere lave, men gaae desto dybere ind under Klip-
perne, seæ Marken. Grunden er jævn og flad, og fordi Lysnin-
gen og Solens Varme have frie Adgang dertil, saa er den græs-
riig. Faar og Lam ligge her inde om Vinteren, og kunne have

Gode nok for en heel Maaned, skönt Marken uden for er ganske tilsluttet af Sne og Jis. Om Aftenen komme vi til en smuk, men lidet frugtebar Slette, som paa alle Kanter, Ind- og Udgangen undtagne, omgives af høie Bjergspidser; her komme stærke Øivervælde. Den kaldes *Selliðsvalle*, fordi her ere 3de Huuler, og iser en stor, hvor Reisende pleie at ligge i om Natten. De, der drive Slagteboæg fra Østerlandet til Drebæk, have her bekendt Natteseie. Disse drive deres Faar bag ved Jisblærgene, for at undgaae de Elve, som falde fra dem ned til Havet, paa den søndre Kant. Vi reisde herfra over nogle Halse og sumpige Steder, imellem dem, til den Bjærgklofte, hvor igiennem Markerskiot flyder fra *Torfa-Jökul*. Kloften, som er 8 Favne breed, kaldes *Torfahlaup*, fordi en Stienmand, ved Navn *Torfe*, som Jisblærget har taget Navn af, skal have sprunget her over, med en Pige paa Armen, forfulgt af hendes Broder. Liige for, og for end man kommer til Jisblærget, møde 2de særfse Søer, *Torfarande*: der er en Mængde Foreller, men de fanges kun sielden af Bygdens Indvaanere.

§. 774.

Torfe-Jökul.

Torfa-Jökull, et særfkilt Jisblærg, var 1 Mill fra *Veien*. Det er et iblandt Jslands mærkværdigste Steder, og haver ikke sin Liige, i det at kaagende Vand springer der op af Jisen. Vi havde intet hørt tale herom, men da vi saae Blærget under Jisen, viiste den hvide og rødagtige Farve sig ligesom i Drapeliid, og flere Gialde. Dette syntes os strax noget besynderligt ved et Jisblærg; og kort derefter, fordi Bæiret var stille, mærkede vi, at en bestandig Røg steg op af Jisen, paa den sydvestlige Top af Gialdet. Vi spurgde vores Ledsager, om han havde hørt, at der
vare

vare Høerer i Torfa-Jökul: han svarede ja; men han vidste ikke noget retsaffent derom; thi hverken han eller andre havde været der oppe. Eysten blev herved endnu større hos os; men Opgangen var steil og vanskelig, og det lakkede imod Østen. Egnen er her smuk, i Særdeleshed Myrerne imellem de 2de Søer, kaldede Torfamyrar, og den Egn norden til ved Jökelen, kaldet Grashage, det er, Græsmark eller Græsbeed; paa disse Steder vore Rhodiola og Angelica, og vi saae der overalt Tegns til, at Folk fra Bygden havde gravet efter den sidste Urts Rødder. Vi maatte gaae til Fods: i Fjældsiden funde vi 2de Forandringer af sorte Agater, nemlig den i smaa, haarde og tætte Stykker, som den i Drapuhlid og paa flere Steder, og en anden i større Stykker, flør og noget udhullet inden i. Da vi komme op til Jisen, funde vi en Dal i samme, hvor en Elv sprang frem, og her kaager den største Hver op af Jisbredderne, med megen Bulder og tyk Røg. Man mærkede hist og her opstigende Røg og mindre Høerer; men kort fra den store Hver ragede et lidet Biærg op over Jisen, og til B. i samme sprang den anden største Hver op, og Grunden til den kunde sees at være en hviid Gruusbanke. Fra det overste af Torve-Jökul kan man see vidt og breedt over den vidtloftige Fjæls-Egn, og Jisbiærgene nær og fjer. Mod Vesten er et særskilt Jisbiærg, med sorte Spidser, kaldet Tindfjælde-Jökul. Norden for ligge store grønne Strækninger, som lade til at være frugtbare; her er Afret fra Sønder og tildeels fra Østerlandet; dog, siden man ofte mister Saarene her, og faaer dem aldrig igien, er det en Folkesnak, at Stiemænd og Tyve skulde opholde sig paa disse Fjælde. Stratur, kaldes en meget høi Biærg-Spidse, som staar op af Jisen imellem Solheimes og Myrdals-Jökul. Vi

laae liige for den, og under den Fiæld: Rygg Brathals om Ratten.

§. 775.

Katlegiaas
Tisbiærg selv.

Katlegiaas Tisbiærg var nu liige for os, hvorfor vi denne Morgen, den 28 August, begyndte Reisen derhen. Været var temmelig klart; Veien saldt meget forskellig, nu over Draun- og Sandstrækninger, nu farlige Elve. Den fornemste heed Brathals: Øvissl: den har sin Oprindelse i Torfa: Jokel, og forenes siden med Markarflot. Vi reede forbi Sula, et meget høit og spidst eenligt Biærg; dets Klipper ere Moberg, og det ligger kort fra Jisen. Da vi nu tænkte, uden Forhindring, at komme op paa Jokelen, som vi vare nær ved, mødte os en stor Elv, der løb langs med Tisbredden, og forde rødagtigt tykt Vand med Tis-klumper; den sprang ud af Jokelgrunden et Stykke derfra. Vi maatte endelig her over, saafremt Reisen skulde gaae for sig, hvilket og skedde, endskiønt med Nød; thi Vandet gik over Hestene. Jokelbredden var dog her ikke høiere end saa, at Hestene kunde springe der op paa; dog laae her det samme Gærde af Gruns og smaa og store vandslidte Steene, som neden for Geitlands-Jokel (§. 150. og 151.). Vi reede $\frac{1}{2}$ Mil Veis op ad Jokelen, thi den var jævn og uden Rister; de smaa Sandskorn, der vare overalt i Jisen, gjorde, at den ei var glat. Her stode sorte Pyramider, som bleve des større jo høier man kom op; deres Natur og Oprindelse er viist i det andet Stykke (§. 145.). De sammesteds ommældte runde Vandhuller (§. 147.) fandtes her ogsaa. Ellsids blev Pyramiderne meer uordentlige, med Grøfter imell'm; men det værste var, at en Række af usædvanlig store Rister og Pyramider gik tværs igiennem Jokelen, liige fra Struten ned til det Sted, hvor forbedte

mældte

mældte Elv springer frem; rimeligst at denne Elv rinder under bemældte Strækning, og at Struten, ved Katlegiaas Opsprudning, har forøget dens Vand og Kraft, saa at Isen derved er bleven brækket eller sprukken. Vel overvunde vi denne Besværlighed, ved at hugge Spor i Isen og springe over Risterne; men en kostbar Thermometer, som vi bragte med os, gik derved i Stykker. Veien blev nu bedre igien, og Jokelen, ved den nyfaldne Sneee, blød at gaae paa; men Været var blevet tykt; det begyndte at snee og blæse; Vinden blev sydostlig, og liige imod os. Dog var Compasset, som vi endnu beholdte ubeskadiget, ikke forrykket. Vi ginge derfor viidere, skiont vi intet kunde see fra os for Sneetaagen; men Jokelens Overflade var her ganske jævn og uden Sprækker, hvilket man dog neppe skulde troe, da der vare stødte saa store Omtumlinger i Nærværelsen. I det vi saaledes ginge frem i Taagen, klarede det paa eengang op: vi vare da komne op paa Jokelen, og saae Østen for os, 1 Miil borte, og høiest oppe paa samme, et høit Bjærg eller en Rød af store sorte Klipper. Vor Leedsager sagde, at disse Klipper vare oven for Katlegiaa, som aabner sig mod Sønden; thi han vidste ikke, at der vare andre store Klipper eller Bjærg paa denne Strækning. Efter Streegen paa Compasset, som idelig blev usorandret, ginge vi viidere; men Sneefoget tog meer og meer til, og Blæsten blev tilsidst saa stærk, at vi knap kunde styre os; dog naaede vi Kloffen 12 til Roden af forbemældte Bjærg. Her ventede vi i lang Tid, at Sneefoget vilde holde op, men det holdt ved, og Taagen skulede dette Bjærg og det øverste af Myrdals Jokelen, ei alene denne heele Dag, men og de næstfølgende. Vi torde ikke bie her Natten over. Værligst kunde blive endnu farligere med Frost og Islag;
men

men den største Fare var dog at frygte fra Katlegiaa, som endnu ikke havde utrasket; thi vi havde nyelig faaet Tidender, at den havde sprundet Jid for 2 Dage siden. Hvis Binden havde blæst fra en anden Kant, kunde vi maaſkee vovet at bie, og dog var det temmelig usikkert, siden vi baade paa denne Kant af Klipperaden, som og længer borte, saae den grove Pimpesteen-Sand og Smaaſteene nedfaldne; disse vare Levninger af den sidste Jidsprudning, uagtet Binden den Gang blæste af Nordvest. Vi vendte derfor tilbage, og maatte nøies med at være komne til Katlegiaa, endſkiønt vi ikke havde faaet den at see. Om Eftermiddagen ginge vi ned af Jisbiærget, og hittede, ved Compassets Hjælp, samme Bei tilbage. Sneen og Blæsten holdt ved til Klokken 6, da vi finge bedre Værn neden for Fjældet, og naaede til vort Telt, Klokken 8 om Aftenen. Næstfølgende Dag, Klokken 6 om Aftenen, hørte vi et overmaade høit Tordenskrald fra Myrdals-Jökelen. Manden, som fulgdes med, boende og opdragen nær ved disse Jisbiærge, kaldede det Jöklablod, det er, Jökels-Lyd, og sagde, at Marſagen var, at den tykke Jökels bristede paa de Steder, hvor enten Vandfalde eller Jordſtiælv havde forandret dens Grundvolde. Sagen er rigtig, og ligeledes bekiendt paa andre Steder i Landet, hvor det Slags Lyd kaldes Jöklabrestur, det er, Jökelsbragen. Den samme Aften saae vi en Jidklode, klar som en Lynſid, i den nedrigere Luft imod Vesten; den var ſaa ſtor ſom en fuld Maane, og en lang Hale ſpiirede op af den. Kort ovenfor dette Lys saae vi et andet langagtigt med Spidsen, og af Skikkelse ſom Lynſid. Begge diſſe Lys fulde liige ned i Taagen, eller de ſtyr, der ſvævede over Myrdals-Jökelen.

og vi kom til den 30. August 1776, da vi kom til den 30. August 1776.
 Den 30. August var endnu Regn og tyk Luse om Formiddag, ^{vi} men der-
 gen; men om Eftermiddagen, ^{fra} tor. Væst. Vi maatte stræbe at
 naae til Folk; thi vi manglede Græs, for vorde Heste, og Levedes
 midter for os selv; og havde endda 5 Mæle til den nærmeste Bygd
 paa Østerlandet, nemlig Skapnaunger, hvilken dog var edelagt
 af den sidste Jofelbrand, og Folkene sigtede derfor. Svanevil
 kaldes en nayskundig; Viærgkæfte paa denne Bælt i Bunder be-
 voren med Mose og Angell, men oven over, eller til Siderne,
 indstjættet med steile Bjerge. Dette Sted er udgaabt for meget
 fælt og farligt, formodest Viærgtrold og Spogelser, for hvilke
 de Reisende ikke skulle være sikre, endog om det var Dag. Vor
 Redsges fortaalte på mange delige Hændelser, som her skulde være
 skete, og endog forsikrede, at han selv havde været oienfynligt
 Vidne til nogle af dem. Han var ellers et ærligt og enfoldigt
 Menneſke. Vi derimod hverken soae eller mærkede noget af dette
 Slags, endskion vi ginge her meget omkring, besaae de nærmeste
 Hujler, og flavede op paa Klipperne, for at søge Urter. Mæle-
 fells Sand er en Strækning af Pimpesnaunget, forbrændt Sten
 og Afte, som er 2 Mæle lang. Mælefell eller Maalesfelde kaldes
 nogle Bjerge i Landet, som derhos ogsaa have andre Navne; de
 staae alle for den selv, meget høje, spidse, og langt horte fiende-
 lige for Reisende; hvorfor de glæmte tiene. Et Stedder for Besøjsse.
 Saadant et Viærg er Mæstrenten paa foranstætte Sandstæde;
 den er et Mobergs Viærg, og staaer for sig selv, fort fra Veien.
 Egnen er her overalt forbrændt. Evende røde Høie eller staae
 Bjerge, opstaaede ved Jordbrand paa det staae Land, staae her
 iat ved Jofelsbredden, hvilken vi endnu fulgte. Den var her
 21. 2

overalt lav og bestigelig, og Bisen op ad til Jökulens Top jævnt og uden Væster; derfor vilde vi endnu have forsøgt at komme her op: men skönt det var klart Solskins-Væir, blev Taagen dog bestaaende sig staaende over Katlegiaa. Einhyrninge, eller Enhyorning, kaldes her et særskilt Viærg, østen for, tæt ved Jökulen. Solmsaa; en stor Elv, tager sit Lob herfra ned til Skafesfells Syffe; den fører hvide Vand, og springer ud af Torfa-Jökul. Liotsstade: Heede var den sidste Hjeldevæl vi skulde over, for at naae Bygden: Heeden har havt skønne Græsgange; men nu var den overstrøet med sort Sand og Afte fra Katlegiaas sidste Jidsprudning. Om Aftenen naaede vi til Liotsstade, den eeneste tilbageblevne og beboede Gaard i Skaptaatunge, og paa denne Kant af Ruda-fjort. Her agtede vi at blie efter godt Væir, for at besøge Jökul-ten igien. Den 31. August, da vi vare paa Liotsstade, var Taagen saa stærk, at man kunde ikke see noget fra sig. Folkene her paa Gaarden bakte i uafelig Tilstand. Græsmarken begravet i Afte fra Jids-biærgene, og ingen Høstet. De havde kun 2 Køer, der maaskede meget lidet, thi de kunde neppe faa noget at leve af, uden hvor Vandet havde fyldt Aften bort. Der vare i alt 7 Menneker, og de nødte ikke andet end denne Mælk og Angelik-Rodder. Den 1ste Septembr. var Regn og Blæst om Formiddagen, men tort Solskins-Væir om Eftermiddagen, da vi reiste her over Eggen, og til de Viærge, nær ved Jökulen. Man kunde let see, at Bygden havde faaet Sørgebragt paa; den var allevegne sort, og tykt overhildet med Grus og Afte. Her havde været smaa Birketræer og Krat overalt, i til 2 Alne høje. Men vi saae ikkun Toppene, hvis

Den af Katlegiaa forderede Eangs Beskrivelse.

Den 31. August, da vi vare paa Liotsstade, var Taagen saa stærk, at man kunde ikke see noget fra sig. Folkene her paa Gaarden bakte i uafelig Tilstand. Græsmarken begravet i Afte fra Jids-biærgene, og ingen Høstet. De havde kun 2 Køer, der maaskede meget lidet, thi de kunde neppe faa noget at leve af, uden hvor Vandet havde fyldt Aften bort. Der vare i alt 7 Menneker, og de nødte ikke andet end denne Mælk og Angelik-Rodder. Den 1ste Septembr. var Regn og Blæst om Formiddagen, men tort Solskins-Væir om Eftermiddagen, da vi reiste her over Eggen, og til de Viærge, nær ved Jökulen. Man kunde let see, at Bygden havde faaet Sørgebragt paa; den var allevegne sort, og tykt overhildet med Grus og Afte. Her havde været smaa Birketræer og Krat overalt, i til 2 Alne høje. Men vi saae ikkun Toppene, hvis Blade

Blade vare deels halv- deels ganffe forbrændte; derimod havde de tykke og saftige Bidier eller Wiileblade ingen Skade faaet, hvor de naaede op i Luften. Vimpesteen Sand og Afke laae her: 1, 2, 3 til 4 Fod tykt paa Marken; men i Dale og Dovelser, ved Ege og Bække, 6 til 10 Fod. Hvor Affen var falden paa Sneen, og denne var bortsmættet i Foraaret; der havde de smaa Toebække fyldt Sandet reent bort, og fort det ned til Elvene; paa slige Steder vare Græs og Urter meget godt voyne. Veligheden her havde ganffe vist tilladt, at seede Vandet vidt omkring, for at fore Affen bort; men de arme Indvaaneres hastig paakommende Ulfke gav dem hverken Tiid til at bie, eller tænke det efter. I Blandt Affen fandtes blaa Vimpesteene, saa flere, at man kunde mageslig knuuse dem imellem Fingrene. Den 2 Septembr. var ubestaa- digt Væir, med Drivskyer, Regn og Sne; imellem; hvorfor vi maatte afstaae fra det Forsæt at besøge Katlegiaa igien. Derimod besøgte vi Resten af Langer, Medalland og andre Egne often for Myrdals-Jokel, hvor den største Skade var skeet. Det vilde Korn; Melur (§. 729.) voxede her overalt, og meest paa de sorte Eletrær, hvor ingen Vandfalde gaae over. Denne Væir er den eeneste, som har faaet Overhaand, uagtet den sidste Ildsprudnings Hæftighed og Sandfogets Mængde; thi Melen trænger med sine spidse Blade igiennem, og til den frie Luft. Af dette Korn leve 6 til 8 Kirkesogne, foruden dem, som bestille det længer fra. Om gangen dermed, fra først til sidst, skal beskrives paa sit Sted. Vi reisde forbi endeel forladte Gaarde, over Kudafløit til den øde Gaard Nes, hvor os blev viist en Iysgraa Steen, 14½ Pund vægtsig, hvilken Katlegiaa forrige Aar, den 20 Octobr., havde kastet herhen til Gaarden, 4 Wiile Veis; den laae her oven paa

Enen lott Mergelen; blande mange andre mindre, fra 6 til 10 Punds Tyngde. Arten er lisdagt, meget haard og tung; vi saae af samme Slags allebegne her i Nærverelsen, men ingen saa stor, som denaa. De synes af Opvældelsen at være en Mergelart, blandet med smaae Stimmer; thi de gaafte smaae hvidagtige Steene, store som Ertter og deruhder, findes her ogsaa iblandt Alfen meer og mindre haarde; de blodeste kunne let skæres og skræbes med en Kniv. Skeedvånd virker ikke paa dem. Siden, et smukt og stort Bygdslav, begynder Osten for Skaptaa, en af de største Elve, vi haade reist over: dens Kende bestaaer af smalle Hraun, og har for, baade formeidst Vandets Dybhed, og især Vundens Rister, været farlig for Reisende, men nu var den sidste Ueilighed hævet, ved at det fra Jökelen nedhagiede Gruus og Smaasteene havde opfyldt alle disse Huller, og gjort Vunden liige. Paa Siden overalt, men meest i den vestligste Part, havde Alfen foraar saget en overmaade stor Skade, dog vare der ingen Gaarde reent forladte. Indvaanerne havde gjort dem megen Umage med at skuffe Gruuset bort; især maatte vi beromme en Enke derfor, som boede paa Kirkestedet Skaal. En Hæde, med Accreto Thermatum Tophaceo, saae vi her paa Gaarden; den var nedført fra Jædet, fort herfra; dog vidste Folkene her ikke af nogen Hver at sige, nær eller fjer; men der maade dog have været een i forrige Tider. Herfra komme vi til Rækebæ-Kloster, som blev stiftet for Nønnen i Aaret 1185, af Thorlak den Hellige, Biskop paa Skalholt. Thykebæ-Kloster ligger 3 Mille herfra i S. V., paa hin Side af Skaptaa, og længer ned ad Soen til. Bygden kaldes Ver, eller med fuldt Navn, Alptrevær, det er, Svaneleie, fordi en Mængde Svaner i forrige Tider have opholdt sig her.

De

Dette Kloster blev stiftet for Munkke, nogle Aar førend det næstom-
 mældte; nemlig 1169, ved Biskop Klanger, som satte Thorlak
 den Hellige der, som 1ste Abbed. Heraf kan sees, hvorfor endeel
 berømte Abbeder, som dette Kloster haver havt, kaldes Aabotar
 i Vere; thi denne Egn hørde for det mæste til Klosteret. Begge
 disse Klosters ere, som de andre i Landet, seculariseret ved Refor-
 mationen. Jordegodsset, som nu tilhører Kongen, fik stor Skade
 ved Jldsprudningen, og blev tildeels ødelagt; dog kunde Skaden
 bleven formindsket, hvis man havde gjort sig al muelig Umage med
 at skuffe af og bortføre Sandet. Nu, efter 9 Aars Tiid, ere dog
 disse og andre Gaarde i ovennældte Egn meget komne sig igien, da
 Sandet eller Asken synker alt meer og meer, saa Græsset kan kom-
 me frem. Vi reisede viidere langs efter Siden, hvor Bønder-
 gaardene stade smukt anlagte i Ræd, ved Røden af Viærget, der
 stedse holder ved, som en Muur og Skjul for Nordvindene. Den
 forste eller nederste Fjældbrinke er kun 100 Favne høi, og der
 oven for sees et Lag af en sortglindsende Klippeart, eller en Petro-
 silex, der nærmer sig til Jaspis. Vi have dog ikke prøvet den.
 Laget er ellers nogle Miile langt. Hospitalet til spedalske Menne-
 sker, for Østerlandet, er stiftet paa Hørgslands-Gaard midt paa
 Siden. Gverfiofliot er en stor Elv, kort her fra, som flyder
 ned af Fjældet, og forrykker noget Bygdens smukke Veligheden.
 Den har en usikker Grund, og er slem at komme over. Elven
 voxede meget hastig, fordi det regnede stærkt, da vi vare der.

§. 778.

Vi besaae Egnen, og især syntes os den Elv Dinpaa mærk- Sidejokelens
 værdig. Den rinder kort østen for Kalvesfjælds Præstegaard, og Jldsprudning
 har et stærkt Fald, i det Grunden hælder meget, og Vandet gaaer og Birknæs ⁹⁸⁷.

indknebet i en snever Rende, mellem steile Klipper; thi Elvens Bredder bestaae af 15 til 20 Favne høie, tildeels smæltede, Klippe-
pelage, med smaa Huuler i Siderne. Breddheden af denne Klost-
te, som gaaer oven fra de høieste Fjælde ned til det flade Land, er
oven til 20 til 30 Favne. I Aaret 1753 gjorde denne Elv stor
Skade paa Præstegaardens Græsmark, i det den voredede pludselig
til, stod over de høie Bredder, og søgte endnu een Vej til, ned
over Heeden. Naar man regner Grundens Høide paa begge Si-
der, eller de Høie, som Vandet naaede til, da steg det i alt til
200 Fod. Egnen blev ganske fordærvet af de Steene, Gruus og
Jisstykker, som Vandfloden forde med sig. Aarsagen hertil var
Side-Jökelen, eller (som den retter kaldes, siden den staar et
langt Stykke norden for Siden), Skeideraaes nordere Jis-
biærg (§. 766.), hvilket ved samme Tid yttrede en hæftig Jld og
Vandsprudning, saa at man, fra Bjærgene oven for Bygden,
kunde see Jld og Røgstøtten staae høit op i Luften. Hverfisfiot,
Skaptaa og andre Jökler Elve, som her have deres Oprindelse,
voredede ogsaa til ved samme Tid og stode over alle Bredder. Luf-
ten over Dræve-Bygden var fuld af Lue og Lynild, og Jndbaa-
nerne sammesteds hørde forfærelselige Knaal og Bragen fra den
Kant hvor Jisbiærget var. Vinden blæste nordøstlig, og forde
en Mængde Aske og smaa Pimpesteen over Skaptaainger, saa at
Jorden blev Creaturene betagen, og der døde endel. Nogle for-
taalde os, at denne Jld og Vandsprudning kom op af Bald-Jö-
kel, hvorved de forstode Hofs-Jökel eller Lange-Jökel, hvilken er
ogsaa undertiiden sammenblandet med Alofa-Jökel (§. 766.);
men herved er at mærke, at ved det Østlændingerne see disse 2de
store Jisbiærge i een Strækning, tage de dem begge for eet. Side-
eller

eller den nordre Skeideraa-Jøkel, grændjer ogsaa baade til Dræ-
ve-Jøkel og det vestligste af Klofa-Jøkel.

§. 779.

Vi reisede herfra til Anney-Kirken Nupstad, og om Aftenen til den her fort osten for staaende Nup, et liige op og nedstaaende Biærg, bekiendt i den gamle og nye Historie under det Navn Lomagnupur. Biærgtet er henimod 300 Favne høit op fra Sandstetten, som er lidet høiere end Havet her uden for. Det seer ud som en Huusgavl, foran 1780 God Danst Maal høi, bestaaende af brunnagtig mørk grov Sandsteen eller Moberg, hvis Deele eller Klipper dog ligge i Løse oven paa hinanden. Denne Berget kan regnes iblandt Breccierne; thi den er fuld inden i af alle slags sorte og røde, deels forbrændte, deels smaltede Steene; men det besynderligste ved Lomagnup er dette, at der ere indslurrede i Sandsteenen store Rugler, 4 til 5 Fod tykke; disse ere sorteblaa af Farve, og bestaae af en meget haard og glindsende Jaspis-artet Steen, som i Ruglens Middelpunkt er udhullet, og eiensynlig smeltet. Fjældsiden norden for Nupen, er smuk og frugtbar paa kraftigt Græs og Birkeskov, hvilket er desto meer at undre paa, siden Jisen gaar her tæt til, og de kolde Jøkel-Elve, Nupsottn, flyttes her ned af Jisssprækkerne, og oversvømme Roden af omvældte Fjældsider. Men vi have lært af andre Jisbiærge, som ligge nær ved Græsmarker og Bygder, at de med deres blotte Nær-
værelse intet hindre Jordens Frugtbarhed; men synes tværtimod at forøge den ved deres Uddampninger. Vilde Saar gaar her ude mellem Nupen og Jisen, Vinter og Sommer, og blive her overmaade feede, samt løbse og folkestye. Veien hertil er meget steil og farlig, saa at Eierne søge ikke deres Saar aarlig, men hvert andet

Lomagnup
og Skeideraa-
Sand.

andet eller tredje Aar. Lomagnuper har tilforn været eet af Østerlandets fornemste Forbiærge, endskønt man nuomstunder har nogle Milles Sandstette fra den ud til Havet. Indvaanerne fortælle end i Dag, at Havet haver naaet tæt ind til Røden af Bjærget, og at de 2de smaa ferske Søer, som her ligge, og kaldes Lomagnuparner, ere en Levning af Havvandet. Navnet af endel smaa Hukker og forbrændte Klipper, her nær ved Beien, hvilke kaldes under eet Alfeydar-Skær, bestyrker det samme. Vi forlode Siden og reisede over Skeidaraa-Sand, en 5 Mille lang og liige saadan Ørken, som Myrdals-Sand, bestaaende af småttede vandslidte Steene, Pimpsteene og Alfegruus, som den 3de og Vand-sprudende Jøkel her oven for har frembragt. Sandstrækningen indsluttes af 2de store og farlige Floder, nemlig den nysongtalte Nupsvotn vesten til, og østen til Skeidaraa, hvoraf Beien nuomstunder kaldes Skeidaraa-Sand; hvorimod den, i de midlere Tider, blev kaldet Lomagnups-Sandr. Reisen over Østerlandets Jøkel-Etve er farlig. De have aldrig nogen vis eller bestandig Grund, fordi Jøkerne idelig tilføre dem Steen og Jisstykker, der forandre Grunden, saa at hvor der kan være den eene Dag et brugeligt Badsted, der er Øviksand-og dybe Hukler den anden Dag, saa man med Hest og alting kan blive der borte. Af den Aarsag maae fremmede Rejsende leie 2de bevante og kyndige Mænd af Naboelavet, til at føre dem over disse slemme Floder. De have til den Ende meget vel afrettede, og til Baden og Svømmen vandre Heste, som de riide fort fra hinanden og jævnsides, for baade at søge en Giennemsart, som er breed nok, og for at være nær ved hinanden, for at hjælpe, hvis den eene af dem falder i. De bruge 4 til 5 Alne lange Støkke eller Stænger, for at finde

finde dem for, og prøve Grunden med. Naar de saaledes ere komne over, vende de tilbage og opsoge et bedre Badsted, hvis det forste ikke er godt; imidlertid bie de Reisende paa Nabsredde, til Veien er funden, som gierne falder Kroget, op og ned ad Vandet, fra en Sandbanke til en anden.

§. 780.

Vi reisede her langs med Skeideraa: Jökul. Den er opkommen af nye, maafee forst i det 14 Hundred-Aar, og staaer paa det flade Land, hvor der formodentlig haver været en stien Mark og Bygd i de forste Tider, ligesom paa Skeideraa: Sand ud til Havet. Jall: Jökull er denne Arts egentlige og rette Navn; thi baade maae den være opkommen af Forstningen ved et Jökelsald; den haver ogsaa virkelig den Egenskab, at flotte sig aartlig frem og tilbage. Man veed ikke i andre Lande af saadan en Jökelsart. Den kan neppe kaldes et Jisbiærg, saasom den ikke er over 20 til 30 Savne høi, og uden Viærgstoppe. Den er ganske sort at see til, overalt med Nabninger og store Klipper imellem, som den var et sammenkastet Høst eller Urd, det er, Dynge af Klipper. Ved forste Diekast skulde man tænke, at den var en Lava: Strækning; men den bestaaer dog for den største Deel ikkun af Jisstykker, frusne til hinanden, iblandt hvilke man seer meget høie Klipper af graa, haard og tæt Kampsteen. Saavel Jisen selv inden i, som dens Mellemrumme, ere opfyldte med sort Aske, Sand og Vimpsteen, og Jökelen er ligeledes sort deraf udvendig. Dette er da den sydlige Skeideraa: Jökul, hvilken uden al Tvil er en Afledning af den nordlige, og maafee tillige af Klofa: Jökul. Dens Længde fra Veien nord til bemeldte Jisbiærg er 4 Meile, og Breeden henved 3 Meile. Man veed ikke Exempel paa, at denne sydlige Skeideraa:

Skeideraa:
Jökul, en nye
Art.

Jokel har nogensinde sprudet Ild, men store Vandstyrninger har man seet komme ud af dens Grundvoide, og hvad endnu mere er: man har seet den flydende og rokkende sagte frem og tilbage, da tillige Ildfunker have ladet sig tilskynde, baade i og over den. Til at udfinde Aarsag til denne Jokelens Natur, kan man have Nytte af ovenanførte Formodning (§. 772.); thi siden den staaer paa det flade Land, næsten paa samme Høide som Havet, kan den allerbest holde Samfund dermed, og beholde sine Bænde i Grundvoide den. Naar de nærværende store Jisbierge norden og østen for, især Sides, Klofs og Dræbe-Jokler, have været i Brand, da er denne ogsaa kommen i Bevægelse. I Aaret 1725, ved Paaske-Tiider, rasede den nordlige Skeideraa-Jokel gruelig med Ild og Vandstyrninger, Knagen og Dragen; i ligemaade i Aaret 1727, ved Vinke-Dags Tiider, da Dræbe-Jokel sprudede tillige. Nogle troeværdige og agtsomme Mænd, som saae paa denne Opprudning og dens Virkninger, have fortaalt os, at de Natten for Trinitatis Søndag 1727 vare paa Skeideraa-Sand, og saae med største Frygt og Forbavselse, hvorledes Fald-Jokelen gik op og ned ligesom Havets Belger, og derhos bevægedes frem og tilbage. Paa samme Tiid sprunge snart utallige Elve, store og smaa, hist og her ud af Jokelens Grundvoide, nu paa eet, nu paa et andet Sted, men bleve borte i samme Dieblis. Disse arme Tilskuere ventede ikke andet end Døden, men bleve dog i Behold paa en hoi Sandbanke, saasom Jokelen holdt sig dog, paa nogle Favne nær, inden sine Grændser. Denne ganske Sommer var Skeideraa-Sand ubefarlig, for de usformodentlige Elves Skuld, hvilke komme jævnligen frem, og oversvømmende den alfare Dei, naar de Reisende vare det mindst ventende. Grimsvaun kaldes nogle
første

færste Soer, som ligge her op til Fjælds i N. fra Skeideraa: Jokel, og have Samfund med den, saa at naar den spruder Jid, pleie de at brænde med, og opkaste Jid og Aske, da Luen spiller frit op af Vandet, og ei aalegne ikke slukkes derved, men synes end: og at brænde meget bæder end uden Vand.

§. 781.

Øræse kaldes nuomstunder en liden Bygd af 6 Gaarde, for: Øræses
Beskrivelse. di den er bleven til en Prov eller Ørken. I gamle Dage derimod var her et deiligt Landskab, inddeelt i mange Bygder og Gaarde: men det er nu blevet ganske fordærvet af de Jids og Bandspruden: de Jisbiærge, som ligge her, oven for det flade Land. Vi naaede hid, over den færlige Jokel: Eiv Skeideraa, til en eenlig Gaard Skaptafell, som ligger under et lidet Bjærg af samme Navn, hvorefter Sysslet er kaldet. Egnen er her endnu meget smukt be: vøgen med Urter, Birk, Rønne og Viile-Urter. Bag ved Skaf: tefjæld ligger en stor Dal kaldet Jokel: Dal, fordi den allevegne, uden imod Sonden, er indsluttet af Jisbiærge. Dalen har tilforn været beboet overalt, og Bygden udgiort et temmelig stort Kirke: sogn; Kirken stod paa Midfell. Nu er Jordbæren revet af paa det flade Land, og dette har fornemmelig den Jokel: Eiv Moraa giort, som styrtes ned fra Ørø: Jokierne, og falder langs igien: nem Dalen; den forenes med Skeideraa, i Dalens Nabning, som ligeledes er fordærvet i Bund og Grund, ved sidstbemældte Eiv. I Jokeldal findes en varm Kilde, hvis Heede man siger har til: taget meget i de sidste Aaringer. Ellrs groe dog endnu i Fjælds: siderne Græs og Urter, og disse ere saa kraftige, at Jaar blive deraf overmaade feede; naar de ere slagtede, kan Riøder fæst: kaaet ikke spises af Greumede, for Feedmens Skyld; Heste, som

3ff ff 2

her

her gaae, blive og meget feede. Jøkel: Aftens Nedsyntelse er meget mærkværdig. Ligesom man har mærket den, i Hensigt til Sand og Pimpesteen fra Hekla og andre ildsprudende Bjerge, over heele Landet, saa saae vi og her paa Stedet et klart Beviis derpaa. Aften fra Myrdals-Jøkel havde i forrige Aar regnet her ned i saadan en Rængde, at Græs-jorden var bleven sort overalt; men nu saae vi ikke meere til den, uden i Døveler, hvor den var faldet tykkest. Ellers maae man mærke, at Pimpesteenen fra Katlegiaa naaede ikke til Drøserne; dog kom den til den østlige Deel af Siden, og altsaa omtrent 12 Meile fra bemældte Jisbiærg. Men saasom ingen saadan Opkastning var skeet i Drøserne siden 1727, lode vi, paa mange Steder, grave i Jorden. Den sidstfaldne Aften sandtes da at være sunket 1 Fomme dybt i Grønsbøren; men Laget af den Aften og Pimpesteen, som faldt over den ganske Egn i Aaret 1727, da Drøve-Jøkelen sidste Gang brændte, var paa høie Steder, hvor Grunden var haard og tæt, sunket lidet over en halv Fod; men paa lave og fugtige Steder dobbelt saa dybt.

§. 782.

Drøve-Jøkel. Det Bånd og Ild-sprudende Jisbiærg Drøve-Jøkel deeles i 2 Deele, ligesom den har sprudet til, nemlig Sandfells-Jøkull; den vestlige Deel, hvorunder Kirken og Præstegaarden Sandfells nuomstunder staar, og Knappafells-Jøkel, den østlige, hvilken kaldes saaledes af de 2de runde Jisfnolde overst paa Jøkelen, der see ud som høie runde Knappe. Drøve-Jøkel er en af Landets højeste Jisbiærge, og steilere end de andre, hængende Indbyggerne frem over Hovedet. Den er hvid og klar at see til, og ellers eet af de gamle Ild- og Bånd-sprudende Fjælde, som ofte har sprudet; dog ere især dens 2de sidste Opsprudninger allermest bekiendte, ligesom

ligesom de og holdes for de største og skadeligste, nemlig den sidste 1727, og den næst forrige af 1362, da den største Deel af Bygden blev aldeles ødelagt, saa at den aldrig siden er bleven beboet. Af disse 2de Jdsprudninger har man end i Dag de skrækkeligste Levninger, og især af den 1727 Jøksfaldet, som er en sæl Strækning af Jisstykker, Klipper, Skursteen og Aske, $\frac{1}{2}$ Mil. breed og 2 Mil. lang. Veien her over er heel besværlig; thi her møde ei alene mange besværlige Bakker eller jævnsides liggende Rygge, men man maae og tage sig i Agt, at ikke Hest og alt skal falde ned i de Kister og Huuler, der ere allevegne imellem Jisstykkerne. Dette Jøksfald ligner den lave Skeideraa: Jøksel at see til, men er meget lavere. Laget af Asken er her allevegne i Jorden, og denne Jdsprudning med Vand og Jis er fornemmelig løben ned over den vestlige Deel af Dræerne. Den anden Omrumling 1362, har dog været langt hæftigere. Da vi reisede fra Kirkestedet Hof til Knappevalle, den anden fornemste Gaard i Dræerne, saae vi en Mængde af de den Gang opkastede Materier, og hvor vi lode grave en Allen dybt i Jorden, som her var overalt temmelig tæt, funde vi et $1\frac{1}{2}$ Fod tykt Lag af hviid Vimpesteen, deels i store Stykker, deels sonderknuset. Denne Skursteen-Art var glindsende perlesfarvet, ligesom den fra Hekla, og bestod af lange Striber, samt saae ud som gammelt forraadnet Hyrretæe. Men den berødeligste Levning er dog Jøksfaldet østen for Knappevalle, for end man kommer til Bredemarks Sandørken. Det er en temmelig høi Biergryg, bestaaende af samme Ene, som nyssbemældte yngste Jisfæred, undtaget, at alleting ere her større, og Jisstykkerne sammensfrosne til en bestandig Jøksel. Her sidde ogsaa store Klipper oven paa, og giøre, tilligemed de andre Ljævnheder, Jø-

Kælfalder til en topper Biærgshals. Imellem betiæledte Gaard og Hæften er en i samme Omkunding opkommen Strækning af Afse, Pimpsteene og Graunstene. Denne kaldes Knappefells Sandur. Vi havde her der høie Fjæbiærg næsten over Hovedet; det hæver til Grundvold steile Klipper, og vi bleve forundrede, da vi, kørt fra Gaardens Tunn, såe hvor den høide Jøkel gik ned igiennem en Biærgklofte, ligge til Græsmarken; og altsaa med det samme endnu et Beviis paa, at Græs og Urter kunne deilig vore nær ved dette Slags Jis. Naboerne fortaalte os; at denne Arm var heel tilhøpen i deres Minde, og havde ikke været til i deres Forældres Tiid. Det underligste er, at uagtet Stedet vender imod Sonden, og bestraaes jævnlige af Solen, som paa de mørke Klipper; og i Skjul af det overmaade høie Fjæld, frembringer her en stærk Heede paa det flade Land, samt driver Urterne til en anseelig Væxt, saa kan samme dog intet virke paa denne Jøkels-Arm, skiont den kun er nogle Sneese Favne breed, og endda ikke tæt eller fast, men fuld af lange dybe Rifter, der gaar op og ned, hvorfor den seer ud som et stort Stykke Salpeter; maaskee man har taget Anledning heraf; til at meene, at Jøklerne i Island bestode af denne Saltart.

§. 783.

Breedemark
og Jøkelen
paa Breedemark-Sand.

Breedemark har i forrige Tiider, ved Landets første Beboelse; og lang Tiid derefter, været et deilig Landskab, besat med Skov, Græsmarker og mangfoldige Gaarde; men nu er her en sæl Sandør af samme Slags som Skelderaa-Sand; den er hængende 5 Meile lang, fra Dræferne til Hornesfiords Bygden; men Breedens, fra Jøkelen til Havet, er kun 1 til 2 Meile. Vi reisede over denne Egn og forbi Øvister, en liden Bondegård, hvor

et

et lidet Stykke Jordemon, bevoget med Græs, og tildeels med Birke-Krat, er endnu tilovers. Marken er ellers imod Norden, fra Drøfene til Hornesfjorden, opfyldt med en flad og lav Jofel, som Skeideraaes (S. 780). Man skal reise langs med dens Bredder, da der meder ingen Elv, undtagne nogle kort fra hinanden rindende Bække, kaldede Grannaqviler, hvori de nærmeste Naaboer fange Orreter og Foreller. Men en farlig Elv, som kaldes Jökulsaa paa Breddemarks-Sand, klyres ud af Jofelen, øster ved Hornesfjordens Grændse. Den er den allerførste Elv i Island; thi der er knapt et Miils Wei fra dens Udspring til Havet; derfor voper den ikke til ved Regnvær, men meest ved sydvestlig Blæst og Vinde med Solskin; da baade Isfens Smeltning forøger dens Vand, og Havvinden med Brændinger hindrer Stømmens Udsart; hvissken er overmaade stærk og hastig. For end vi kunde see Elven selv, saae vi langt borte, dens Bølger at reise sig over Bredderne, og naar ubevante Heste komme saa dybt, at Vandet naaer Bugen, spænder det over dem, saa at Mand og Hest tilligemed Dyret bliver indkæstet, og ført ned til Havet; derfor omkomme her ofte baade Hest og Heste, og nu mellig vare nogle Mennesker bleve her borte; derfor regnes og denne Elv blandt de største og farligste at reise over. Det værste er, at Badsteden ere her aldrig bestandige, saa at man maae gjøre mange Vendinger i Elven. Man binder Byrderne op paa Klostfadelen, det høieste Kee kan, og passer alletider, hvor Vandet er dybest, at styre Hesten skærs imod Strømmen. Grundten er Jofel-Deer, Gruus og Kviksand; nu søges et Badsteden nær ved Jofelen, nu nær ved Havet, og her maae man oftest vende sig. Undertiden, naar Elven er usser, søger man sig Wei oven paa Jofelbredden, som og
saa

faa jævnlis forandres; dog kan man ikkun sielden føre Heste her over, men Folk kunne sædvanlig gaae der, og naar de Nærboende behøve at drive Faar eller Hornkvæg imellem Bygderne, maae de altid bruge denne Vej for at slippe Jofelsaaen forbi.

§. 784. Breidmark's Jofel.

Breidmark's
Jofel og for-
rige Bygde-
lav.

Endnu en nye Jofelart er den bekjendte Breidmark's Jofel. Den ligner vel Sfeideraa-Jofel i Hensigt til Veligheden, nemlig, at den ikke seer ud, som er Siælb; men ligger paa det flade Land, imellem hoi og stætte, tildeels med Jis bedækkede Bjerge; imod Vesten er Breidmark's Siælb, grændsende til Drafernes Jisbiærg, og imod Østen Naavebygde, (hvor de store hvide Strandmaager boe), og Hornesfiordsfiældet. Men denne Jofel er deri forskjellig fra den anden, at den bestaaer ikke af Jofelsald, men er tæt og jævn tilføren, samt hvid og graa i Farven. Dog er det rimeligst, at dens Grundvæld er bleven lagt ved Knappefiælds og Klofa-Jofels Omtumlinger, da Vandflodene have ført Jisklipperne her ned; men Jofelen er siden opkommen og forøget, ved de tilstoppede Elve, som have her haft deres Lob ned til Havet i forrige Tider, og hvis Kender endnu ere tydelig at see. I forrige Tider, indtil Aar 1100, og maakee længe derefter, har her været en stor og smuk Bygd, og Jorden overalt bevoxen med Skov og Græs. De ældste Folk i Draferne kunne endnu erindre de beboede Gaarde paa den vestre Side. Der bliver kun Spøksmaal, hvad Tid denne Odsæggelse er steet? Bore Aarbøger give ingen tydelig Efterretning derom. Landnama-Saga taler om Bygden og Eggen; forbemaeldte Jofelsaa (§. 783.) kaldes der Breidaa, og til Beviis, at Marken dog ikke har haft Gronsvær lige ud til Havet; tiener dette, at samme Skrift nævner Breidaa-Sand, hvor en

Norff

Norff Mand, navnlig Thorder, leed Skibbrud, og fik ganske Breedemarken der oven for, mellem Breidaa og Dvíiaa, som har have sin Kende ved Dvíiskars-Gaard (S. 783.), til Foræring af Kollog, Rangnvald-More-Jarls Sen, og Broder til Hertug Kolv, som indtog Nordmandiet. Denne Kollog var dette Lands skabs første Indtager, og eiede Kysten og Landet imellem Østerhorn og Dræse-Jøkel. Der er da rimeligt, at den første Begyndelse til denne Odelæggelse er fæet i det 12te Hundred-Aar; men i det 14de, nemlig 1362, har den naaet sin Guldbyrdselse; thi denne Tid var heele Østerlandets Jøkelstrækning i Beværgelse, og frembragte overalt de bedroveligste Virkninger, f. Ex. i Dræse-Bygden (S. 783.). Dette samme Aar mælde og Landets Aarbøger, at den ganske Strækning, fra Sidens Øster-Deel, til Almannfjord eller Hornesfjorden østligste Grændser, omtrent 5 Thingmands-Reiser eller 15 Mille i Længden, blev ødelagt, endskjønt en stor Deel af Hornesfjorden, nogle Gaarde i Dræsene, og endelig Siden ere igjen bebygte. Breedemarkes Jøkel var, den Tid vi reiste den forbi, 300 Fod høj. Den er heel sammenfrossen i Grunden, men oven paa brusten i lange smalle Strimler fra N. til S., hvilke danne store Pyramider, hvor de staae op over Jøkelen selv, der overalt viiser saadan en Skikkelse som Salpeter, og seer ud ligesom den nedhengende Arm ved Knappevalle. Endnu er dette besynderligt ved denne Jøkel, at, endskjønt dens Bredder ere lave vesten for Breidaa, blive de dog østen for samme 8 til 10 Favne høje, ligge op og ned, hvor Jøsen er meget haard og fast, uden mindste Sprækker, og neden for er Sandet jævnt, med lidet fremtrindende Vand, uden noget opkastet Giarde af Gruus eller Steene, som findes paa andre Steder, ligesom og her, vesten for Elven. Men

der allerartigste ved denne Vakte var, at vi såae i den runde Huller, ligesom de der træffes i de gamle Islandske Bjærge, og udaf disse Nabninger sprængt første Vand; de vare i til 2 Fod i Gienneemsnidel. Det rimeligste er, at Lufteu fra Havet er Aarsag hertil, da den kan biide saa stærkt, endog paa de haarde Strandklipper, at den ogsaa efterlader der adskillige Huller med Sandsmuuler inden i (§. 465. 1c.). Hullerne i Jokelen staae baade høit og lavt, og Vandet, som rinder der ud af, er ganske klart.

§. 785.

Islandske
Jokelarter og
deres Aarsag.

Efter de hidindtil givne Beskrivelser, ere de Islandske Jokeler 3 Slags. Næmlig: a) *Saa-Joklar*, eller hoi Isbjærge, som overalt sees paa Landet. b) *Skrid-Joklar*, eller de ved Jisfreed eller Jokelsald opkomne lave Jokelstrækninger, paa det flade Land. Saadanne findes kun østen paa, som Skideraa-Jokel, hvoriblandt man kan regne de nyssommældte Jokelsalde. c) *Grunn-Joklar*, hvor Grunden fryser til, og bliver til Jokel paa det flade Land. Bredemarks-Jokelen er den eneste, os bekendt, af denne Art. Det haver ellers været, og bliver endnu Spørsmaal, hvorledes Joklerne kunne baade forvares og tilvoxe; vægter Solens Varme, Regn og Toe jævnligh kunne virke paa dem. Om Jisbjærgene eller de hoi Jokeler giælder det som før er anført, at de naae høit op i Lufteu, hvor Kulden er større end nær ved det flade Land; at Regn forvandles paa dem til Sne og Jis, og ved det de altid træffe Regn, Skyer og Taage til dem, da holdes de vedslige og voxe, naar Solen ikke aarlig kan smelte saa meget som de træffe til dem; endelig, at Jokel-Jisen er haard og usmættelig, og dens naturlige Kulde kan utroelig staae Solens Heede imod, m. v. Men den Formodning, som nyelig (§. 772.) blev anført, nemlig, at alle disse

disse Jøfeler maae have aabne Longange lige ned til Havet, gjør dog Jøfeli-Jisens Bedligeholdelse allerbest begribelig, da dette Element kan best give koldt Vand og Damper i Overflodighed til at forøge Jisen, og Kulden neden under, hvor Solen ikke heller kan virke. Endelig gjør det ikke lidet til Sagen, allerhelst i de lave Jøfeler, at alle Landets Jisbierge uimodsigelig have til Grund, vold forbrændte Klipper, Pimpesteen og deslige Ting, fra hvilke den elementariske Varme er aldeles borte; og saadan en Grund baade trækker Vand og Damper, og forvarer Jisen allerbest. Der er heller intet troeligere, end at jo det saete Vand gaar stige neden under Skeideraas og Bredemarks-Jøfeler, fordi Grunden staar der fun nogle Fod hoiere end Havet, og fort derfra. Man seer jo Brønde og særste Søer i Jöland (§. 417. og 451.) og Enarr. Hist. §. 88.) staaende langt hoiere over Havbredden, hvort dog daglig og ordentlig mærkes Flod og Siære. Za Landets Indbyggere fortælle dette, som en uryggelig Sandhed, at der ere særste Søer med Flod og Siære, hoit oppe til Fjalds. Det var værdt at anmærke i denne Henseende, (thi hidindtil har ingen, det man veed, tænkt derpaa), om ikke Katlegiaa eller andre slige Bierge rase hæstigere og sprude meere Vand, naar Havvandet stiger, end naar det falder.

§. 786.

Stutningen paa denne Reise eller Jøfelnæs Beskrivelse var, at vi besaae det østligste af disse færtige Jisbierge, nemlig **Zorne** fiords Jøfel. Sell kaldes et særst Bærg often til ved Bredemarks Jøfel; det er skaaret tværs igiennem ned til Roden, saa at man seer Kloften fra Veien, og det forreste Stykke, som kaldes Zella, seer ud som en Huusgavl. En stor Gaard, beboet af

Reisens
Stutning, i
ser Hornesfor-
dens Jøfeler.

mange Familier, er tæt ved Hælden, og Folkene leve idelig i Frygt for, at Hælden, efter en gammel ugrundet Spaadom, skal falde ned paa dem; men siden dette Stykke har staaet saa lang en Tid, uagtet de mange Jordstæbe, som her ere indfaldne, kan det liige saavel staae herester, som hidindtil. Kalsafells-Jokull begynder her bag ved Hælden, som en Fortsættelse af Breddemarks-Jokul. Stædene ovenfor Bygden ere lave, og Jokelen ligeledes eet af de laveste Jisbiærge. Breddemarks-Stæd er farligt for Reisende, fordi store Steene falde her jævnlig ned paa Veien. Da vi vare dette Sted forbi, modte os en Sandstrækning 1 Mill lang, hvilkken de fra Jokelen nedstrømmende Elve have forarsaget. Kort fra Præstegaarden Kalbsstæd naaer en Arm af Jisen ned paa Marken; Biærgene, som Jokelen ligger paa, bestaae af mange Klippelag, gjerne liige tykke; man kan tælle 10 til 16 ned til Roden, som udgier den tredje Deel af Høiden, og er skult ind i Jord. Ved Hammersfjord i Muule-Syssel tæller man 40 til 50 saadanne Klippelag. Men dette Slags Biærge ere rare i Skæfkestæds-Syssel. Et Stykke kaldes Hestgiærdis-Stæd, hvilket bor, efter Landnama-Saga, heede Hreggogærdis-Stæd, og har dybe runde Huuler, og Sandsteen imellem Lagene. Vi hørde her oppe nogle Knaal som Flinteskud, en Virkning af Luften i bemættede Huuler, som skal ellers her være almindeligt. Heinebergs-Jokull har edelagt Midparten af Hornesfjord, som den ligger oven for, og rækker med en Arm liige ned til Marken, ved den Gaard Heineberg, som dog endnu er beboet; 4 store Elve styrtes herfra ned over Landet, nemlig Kolgrima, Heinebergsvæn, Holmaaa og Hornastardarflot. De 3 første have ganske borttaget Jordbæren, og ere, formedelst Grundens Usikkerhed og Dvælsand, vanskelige

vanstelige at reise over. Tvende smaa Bygder, nær ved Havet, nemlig *Nyrar* og *Nesin*, staae dog endnu. Dette Jisbiarg har rasert tilforn og skiftet store Vandstyrninger ned til Bygden. For Exempel Aar 1362, endskjønt Jökelen ikke nævnes. Det samme kan og sluttes om Kalsafells-Jökul og Lons-Jökul, der østligste store Stykke, som ogsaa kan kaldes en Part af Hornesfiords-Jökelen, skjønt den stoder til Klofe-Jökul; den staaer oven for Lons Præstegjeld. Hornesfiords-Floden er en halv Fierdingveis (ikke en halv Mil, som siges i den Danske Overs. af Hübners Geogr. 1743) bred, hvor man reiser over den, neder ved Stranden; men den har derhos en god Bund, liden Strøm og maadelig dybt Vand. Jökelsaa i Lon kaldes en stor og skadelig Elv, der kommer ned fra Lons-Jökul, og er af selv samme Art, som de andre ovennævnte skadelige Jökul-Elve i Skaftefjelds-Eyssel. Den deeles i nogle Arme og er farlig at reise over; undertiiden fører den Jökelsald eller Jisstykker med, og forandrer daglig sine Vandrender. Denne af Græs og Birkeskov temmelig smukke Egn er derfor meget ødelagt paa begge Sider af Elven.

Floder, ferske Søer, Hverer &c.

§. 787.

Af fiskeartige Søer findes endeel i Østfiordene, baade i Bygder og til Fjælds; dog de fleste kun smaa. Disse ere de fornemste: *Smörvatn* paa en Heede af dette Navn, ved Vapnesfiord. Her ere ogsaa mange ferske Søer oppe paa Fjældene, hvor Indbyggene have søgt hen for at fiske, ligesom de endnu søge derhen for Svanesfangstens Skjold; man jager dem med Hunde, i den Tid de sælde Fiedre. Paa Jökelsdals-Heede ere 3de Søer, og mange i Tun-

Fiskeartige Søer.

ga, der give Foreller og Ørreder. Den bedste Fangst giver Aurridavatr, baade i disse Tiider og tilforn. Den vestlige Deel har kun faa saadanne Soer. Bag ved Myrdals-Jökelen ere Fiskevautn, nogle meget fiskefærdige Soer, meest bekiendte, saasom Indvaanerne fra Skaptæfjælds-Syffels Besterpart og Rangaavalle, have søgt derhen og ligget der i Fiskehytter, som man endnu seer Mærke til. Fra Skaptaa-Lunger ere 10 Miile derhen, og Indbyggerne sige, at de ikke kunne opholde sig der, fordi Hestene faae der ikke Græs nok; men denne Undskyldning haver ikke Sted, naar nogle i Selskab vilde blive der for en vis Tiid, og lade imidlertid drive Hestene hjem igien til Bygden.

§. 788.

De fornemste
Floder.

Floderne ere fast allesammen nævnte i Forveien, hvorfor vi her ikke vilde nævne om nogle især. Overhoved ere de fleeste, baade store og smaa, i Østfiordene, fiskefærdige; men kun faa i Skaptæfjælds-Syffel. Jökelsaa i Lonet, Breiddaa og Granneqvíslar give dog temmelig Ørredefangst, og den første endog Lax, hvilken er rar paa denne Kyst. Om Slynderfangsten i Hornesfiords-Flot skal siden blive nævnt. Men det ere fornemmelig 3 Floder, som paa dette Sted skal tales om. Næmlig a) Jökelsaa i Mule-Syffel, som er deri bekiendt fremfor andre Aar i Landet, at der, over dens steile Bredder, er lagt en Broe af Tømmer, 25 Alne imellem Klipperne og 10 Favne høit over Vandet. Aar 1625 løb Elven 20 Alne høit over sine Bredder, og skyllede den gamle Broe bort. Den Tiid var der Bevægelse i Klofa-Jökul og flere Østerlandets Jisbiarge; dog rasede Myrdals-Jökelen fornemmelig samme Aar. Den nye Broe har været godt bygget af 28 Alne lange Bælker, beklædt med Bredder og Plankværk paa Siderne. Der er en Alfars-Bei med

med Heste og Slottegods, som Folkene bære over Broen, men leed de Hestene. De Kreature, som ere uvante til denne Vej, blive bange og løbse af Vandets stærke Brusen neden under, de springe ned i Elven, og de fleste Gange blive de borte. Den nærværende Broe, som blev bygget 1698, er meget forfalden, og Anstalterne til dens Bygning alt for slette: de som boe her nærmest, og behøve oftest at fare over Broen, maa flyde sammen, og andre Reisende betale slet intet dertil, da det dog var det retteste, at enhver skulde, ligesom for Færger, betale her noget vist, hvilket skulde samles til en liden Capital. Der have tilforn været Broer over flere Elve i Landet, men de ere forfaldne for nogle 100de Aar siden, ventelig fordi denne Anstalt fattedes. I den øvre Jokelsdal kommer man over denne Elv paa en anden Maade. Der slaes stærke Love, 4 paa hvert Sted, hvor Breddernes Klipper ere lige høie, og paa disse Love er en firkanter aaben Kurv, som kan trækkes frem og tilbage af dem der sidde i Kurven, hvilken er saa stor, at en Karl med sit Redskab, eller og 2de Bølter, som ere en fuldkommen Byrde for en Hest, kunne rummes deri; men Hestene lader man svømme over Elven. Saadanne Færgesæder (som her ere 2 og undertiden 3, og besætes af Naboerne) kaldes Drættir, og at fara al Alase. Det er dog arrigt, at Folk i America have hittet paa, og bruge samme Maade, til at gaar over de store Elve, som *J. Gumilla* (Histoire de l'Orenoque T. 2. p. m. 327.) beretter; men Folk i Island blive ikke nær saa bange ved at tage over Jokelsaaen, endskjønt deres Anstalter ere langt slettere, end hines i America. b) Lagarflot er ogsaa nævnt i Forveien. Om denne Flod havest forunderlige Historier, baade i ældere og nyere Tider, hvilke vi i lang Tid have taget i Tvil og anset dem, deels for Fabler og deels for

for Indbildninger. De bestaae deri, at her skulde tidt og ofte være blevene seete adskillige uhyrlige Skikkelser, hvoraf de fleeste skulde ligne en overmaade stor Slange. Man har giort sig Umage for, at lede efter dette Slags Beretninger i de Islandske Aarbøger, og udsøge de mærkværdigste. Hvad Lagarsliot angaaer (thi der ere flere Steder i Landet, hvor eet og andet deslige mældes at være seet), da haver man de fleeste Exempler derpaa siden 1600, og disse ere de fornemste: Aar 1607 (sige Annalisterne) saaes Slangen i Lagarsliot, med 3 Bugter, saa høie, at hvis det havde været paa Landet, kunde en Karl have gaaet derunder med en (oprakt) Landsk. 1612 mældes kun at Slangen blev seet. Ligesledes i Aaret 1618. Aar 1641 anføres det endnu med de samme Ord, og at dette skeede i Esterhesten. 1672 har man heller ikke anden Esterretning, end at Ormen (Slangen) blev seet. Men i vore Tiider, nemlig 1749 og næstfølgende Aar er det gaaet langt videre med disse Syner; da der forsikkes, at Naboerne og Reisende, ei alene Bønder, men og nogle Præste og andre lærde Folk, have seet, deels alene, deels nogle i Selskab, adskillige uhyrlige Ting, hvilke de dog ikke have kunnet noie beskrive, og Aarsagen dertil angives af nogle at have været denne, at de have seet disse Ting langt borte. Dog har ingen af disse Skikkelser dengang lignet en Slange, men andre Ting; f. Ex. en stor Salthund, af Farve som en Rokke, naar den træktes op af Vandet, nemlig blank-hvidagtig; dette Legeme skiod sig strax ned i Floden igien, og forarsagede store Bølger. Et Vidunder, med en hoi og spids Puffel i Midten, 30 til 40 Favne langt. Endnu et andet, mange 100de Favne langt, som, med 3de overmaade høie Spidser, skiod sig op af Floden, saa at man kunde see Vandet derimellem. Desuden har man seet nogle saa-

danne

danne Røg og Vand-Sprudninger, som naar Hvalfiske trække deres Ande, dog meget større, og endelig en høi Pyramide, som først har staaet stille, og derpaa faret til Landet. Det sidste Aar, 1750, saae man allermest og oftest til nogle af disse Ting, som: et Skrog, uden nogen vis Skikkelse; et andet, stort som en Særling, hvilket gik op ad Gloden med en hastig Fart. Man saae dette Aar saadanne Skikkelser, ei alene i Lagarfiot, men og i de Elve oven for, som samles med denne Flod. Saaledes har man seet, 5 eller 6 Gange, nogle, som en stor Hest, med høi Man paa Hæften, og ligesom Hænder paa Ryggen, overalt fort af Farve; nok et Uhyre med toende Tryner, imellem hvilke Vandet kunde sees; og endnu toende Uhyrer, saa store som de største Huuse, der komme paa 2 Steder op af Gloden, og krobe op paa Landet eller Nabrededen, hvor de bleve nogen Tiid. Disse ere de fornemste Skikkelser, som troeværdige Mænd have seet i Lagarfiot, men vi gaae mangfoldige andre Beretninger med Villie forbi. Nu bliver da det vigtigste Spørgsmaal: hvad man bør tænke om Lagarfioters Uhyrer? At giøre dem til slet intet, gaaer ikke vel an: man kan hverken sige, at saa mange troeværdige Mænd have digtet alt dette; ikke heller, at det er blotte Indbildninger; især da mange paa eengang have seet slikt, uden at være forud betænkte derpaa. Man kan endnu mindre give det ud for ende Anders Virkning, da disse Ting ere altiid blevene seere om hoitys Dag, og uden nogen Fortrød eller skadelige Folger. Hvad bliver da tilbage? Den Meening, som er mest antagen, og som alle de troe, der viide, at de have i Sandhed seet de eller de Uhyrer i Lagarfiot, er denne, at disse ere virkelige levende Skabninger, som opholde dem sammesteds, men at deres Natur er endnu ubekendt. Indvaanerne tænke desuden om

diffe Udyr, at de, naar de lade sig see, betyde disse mærkværdige, som oftest sørgelige Eildragelser, meest i Naturen. Naar vi holde dette imod hvad der skrives om uhyrlige Skabninger, som skulde være seete i Havet, f. Ex. den store Slange i de Norske Farvande, med meere, som er indført i Pontoppidans Norske Naturl. Hist. (T. II. Cap. 8.); da kommer dette meget overeens dermed, og det eene synes at bekræfte det andet. Dog møder een Vanskelighed, som gjør det umueligt, at de opregnede Skabninger, saafremt de vare virkelige Dyr, og saa store, som her er sagt, skulde kunne leve eller opholde dem i Lagarflot. I Havet er Rum nok: der kan man gierne give Indbildningen Toilen, og begribe, at der kunne boe Dyr af mange 100de Favnes Længde, Bredde og Tykkelse; men Lagarflot kan ikke bekvemmelig huuse eet saadant Dyr paa 100 Alne, eller halvt saa stort. Vel er denne Flod vist nok den største i Landet, i Hensigt til Dybheden paa 1 eller 2 Steder, hvor Fisserne have fundet over 50 Favne, og Breddden paa eet Sted er 960 Favne. Men derimod er den paa de fleste Steder kun nogle Favne dyb, og 60 til 100 Favne breed; ja den er somme Steder ikke over 2 til 3 Alne, saa at man kan ride derover, uden at lade Hesten sømme. Hvorledes kunne da saadanne uhyrlige Skabninger gaae her frit frem og tilbage, ja endogsaa op til de smaa Elve? hvorledes kunne de dølges i Floden heele Sneese Nar og meer, at ingen kan see dem? hvorfor have Fisserne, som jævnlig sidde paa Floden i deres Baade for at fiske, deels med Shore, deels med Lodliner, aldrig fornummet disse Dyr, eller saaet Skade af deres Bevægelser? og endelig, hvorfor have Indvaanerne aldrig truffet dem døde, opkastede paa Badstederne; thi Floden har ikke overalt Vand nok, til at fere saa store Legemer ned til Havet, uden at de

maatte

maatte standse iblandt, og staae paa Grund, paa en Bank eller Øre? Vor Meening bliver altsaa denne: at det har samme Beskaffenhed med Lagarflot og endel andre store Elve og ferske Søer i Island, hvor forbemaeldte uhyrlige Skabninger siges at være seete, som det har med nogle mærkværdige Søer i andre Lande, hvor saadanne eller andre Skabninger og underlige Skikkelser, for Ex. af Huuse, Dyr, Mennesker o. v. viiser sig paa Vandets Overflade, nemlig at alle disse Steder have nogle besynderlige Uddunstninger i deres Vand og Grund, som efter Lustens Beskaffenhed, ligesom den bevæges og er tyk og tung, let og tynd eller stille til, viise sig paa adskillige Maader, da disse Damppe kunne blive til tykke Skyer, og ved Lustens Hielp holdes sammen i nogen Tiid, men derpaa adspredes og forsvinde igien. Ingen bliver fornærmet ved denne Sætning; de troeværdige Mænds Fortællinger forskydes ikke, som opdigtede; man gjør ingen Bold paa Naturen, og alle slige underlige Ting blive let begribelige. c) Stank-Elven kaldes nu almindeligst Jökelsaa paa Solheimesand, og er under det første Navn nogle Gange nævnt i det foregaaende, som Grandsfjæl imellem Øster og Sønder-Landet. I Landets første Beboelses Tiid, og en rum Tiid efter, kaldtes den Julelækur, d. e. den stinkende Aae eller Bæk. Den springer ud af Solheimes-Jökul, og er farlig at reise over, baade formedest Grundens Usikkerhed, men meest Vandets stærke og hastige Fart, hvorfor Mennesker ofte blive borte i den. Det besynderligste ved denne Elv, fremfor andre Baa-
de paa Island, er den ubehagelige Stank, som den giver fra sig, der endog fornemmes en lang Vei borte. Den ligner meest Lugten af Hører eller Svovelmiiner, saa at det er rimeligst, at der er en Mængde af Svovel-Deer i Jökulens Grundvolde, hvor Elven væls-

der op: Vandet er jævnlig tykt og gruuset, og saa meget er vist, at dette Fjeldvands, hvis eene Arm naaer her ned paa det flade Land, har sprudet Ild i forrige Tiider.

§. 789.

Høverer og
varme Kilder.

Al Høverer og varme Kilder treffes paa Østerlandet kun nogle saa og smaa, dog de fleste i Mule-Syssel, og især i den østligste Part, et Bad i Selardal, med liden Varme; i Laugarvalledal to, som dog kun stælden besøges, fordi de ligge langt borte; Vandet er her dog saa heedt, at man knapt kan holde Haanden deri. Rafnkeledal har vel det fornemste Bad, kaldet Laugarhuus, fordi der har været Bygning over i gamle Dage, og der ud fra rinde varme Bække; men nuomstunder bruges ikke dette Bad, fordi Bygden her er ødelagt. I Gliotsdal findes saadanne varme Bænder paa to Steder. I Skastefjælds-Syssel vilde vi ingensteds Høverer eller heede Kilder nuomstunder, uden i Jokeldal og paa Torfe-Jokel, hvilke sidste ligesaa vel kunne regnes til Rangaa-valle-Syssel (§. 774.).

§ 790.

Drillevand
og mineraliske
Kilder.

Drillevand er paa Østerlandet godt; især findes i Mule-Syssel alle de Sorter, som ere opregnede i det andet Stykke (§. 185). I Skastefjælds-Syssel er Jokelvand det almindeligste, og overalt fore alle de fornemste Østerlandets Elve denne Vandart. Naar nogle af Fjeldvæggene rase, fordærvs alle Kilder og Brønde, da Jordskælv baade maa sie deres Drillevand, og lade det en rum Tid staae inde i Huusene, for at det tykke og usunde skal kunne synke til Bunden, og dog kan denne Forsomhed ikke altid hielpe. Mineraliske Kilder have vi ikke kunnet opdage, uden paa 2 Steder, nemlig een paa Den Skruden i Mule-Syssel, som skal smage

lidet

lidet fyrligt, og derhos tiolende, og en anden i Hornesfjord, kort fra Biarnenæs Præstegaard, hvilket Vand vi selv saae og prøvede. Kilden kaldes her Ølkelda; Grunden er rød Øfker-Leer; Banders Smag er fyrlig, dog ikke saa stærk og liflig, som Ølkildernes i Sneefjælds-Øyssel (§. 454. til 464.); det forandres hverken ved Skedvand eller Bølshyrup, men ved Solutionem Gallarum, naar den gydes deri, bliver det rødagtigt.

Lusten og Værliget.

§. 791.

I Almindelighed er stor Forskiel paa Værliget i Mules og i Almindelighed i Skæstefjælds-Øysseler. Paa dette sidste virke Jisbiærgene meget, da de jævnlig trække til sig Taage og Skyer (§. 435.); dog er man her ofte frie for Regn, naar det sneer til Fjælds. Landvindene falde her tide kolde, fordi de komme baade Norden fra, og tillige fra Jisbiærgene, hvorfra de ogsaa, tværtimod den almindelige Regel, ere ofte fugtige. De sydlige Vinde fra Havet ere her meget varme og milde; thi Jøfkerne trække den salte Fugtighed vestens deels bort, og skyde derimod Solens Straaler tilbage, hvor de ikke falde-forde eller skidne, saa at Bygden beholder det beste af Været. Med klare og kolde nordlige Vinde, om Sommeren, er her dog baade smukt og godt Væir, allerhelst i Myrdal og Ørafene, hvor Gaardene staae i Læ under de høie Bjærg. I Mules Øyssel er Værliget anderledes; Lusten er der friere, og Bygden ikke indstuttet. Om Vinteren falde der de beste Tøvinde af V. og S.V., og ellers er Været af denne Kant tienligst for Kreaturene, derimod ere de østlige Vinde baade kolde og haarde. Taage om Sommeren hindrer der ofte baade Jøe- og Fisk-Virkingen.

Hh hh 3

§. 792.

§. 792.

Heede og
Kulde, Hav-
Jis og Luft-
hændelser.

Seeden og Kulden er efter det forsmældte forfiallig. Thermometriske Observationer har ingen, det vi vilde, taget sig for at gjøre paa Østerlandet, hvilket dog var Umagen værdt, især i Dræerne, og de Steder, som ligge tæt ved Jisbiærgene; det vilde synes underligt, om her ikke skulde falde stærkere Kulde, end paa andre Steder. Hav-Jisen gier her, ligesom paa Nordlandet (§. 710.), den allerførste Forandring i Været, da den giærne besøger Østerlandet, og især Østfiordene, imellem Langelæs og Østerhorn, med det samme den kommer paa Nordkysten. Vi vare eiensynlige Vidner til den Elendighed, som den forde med sig paa disse Kyster, Aar 1756, og det samme havde den gjort de næst foregaaende Aaringer. Ellers har denne Jis i forrige Tider ogsaa besøgt Øster-Kysterne, og forarsaget der Hunger og Dyrthid; Aarbøgerne mælde det især, baade om Øster- og Nordlandet, 1320; dog kom den meeste Dyrthid og Hunger Aaret næstefter, og den udbreedede sig over det heele Land. Luft-hændelser, Jordstælvæ og deslige, ere saa almindelige paa Østerlandet, at Indvaanerne ikkun sidet været derved, eller fortælle det, som noget Nyt. Aarsagen er den Mængde Jis og Jisbiærge, som frembringe mangeslags Luft-hændelser. Noget deraf er anført i disse Steders Beskrivelse. Dog ere Jordenslage rare i Mule-Spyss, saa at det anføres som sælsomt, at Jorden, i Aaret 1690, odelagde en Gaard i Østfiordene, hvæstede en Kone, og slog en Koe ihjel.

Jord- og Steenarter.

§. 793.

Værtejord,
Jærnarter og
Kiesarter.

Værtejorden ser sig selv betragtet, er af samme Slags paa Østerlandet, som nord og vesten paa, undtaget, at den er her alle vegne

vegne stærkt bemænger med stød Pimpesteen og sort Afte. Den sorte Farvejord, og Randa eller Jærnoffer (§. 230.), findes her ogsaa. Leerarterne ere her kun saa, og saavidt os er bitterligt, ikkun paa saa Steder. a) Hvidkriide kaldes en hvid hærdet Leerart, der falder i Alptevigs-Lind i Borgarsfiorden. Den er af samme Slags, som den i Budaflæd ved Bester-Jokelen (§. 473.). Almuen holder den for kostbar; thi inden i den er en Mængde Metal-lignende cubiske eller sekantede Stykker, som de give ud, nu for Sols, nu for Tin; thi Farven er som mesfingblændet Sols; men dette er en Marcasit, som ligeledes findes i Budaflædets Prove. b) Paa Beresfiordsfjærd, imellem Brededal og Niupevaagshavn, falder kort fra Veien en temmelig fedt og fast bleghvid Jordart. c) En grøn hærdet Leerart funde vi paa Skeideraasand, nyelig udkaster fra Jokelbredderne; her skal tidt findes saadanne Stykker, og overalt komme alle Slags vandlidte Steenarter tilsyne fra Jokelens Grundvolde. Denne grønne Steen eller Leer findes meest i Form af Skiffer, og bruges iblandt af Naaboerne til at anstrenge Tommer. En endnu bedre Prove af Malachit, til samme Brug, findes i Skaftefells-Spyssel. d) *Litbomarga*, et Slags graa Steenmarv, falder i temmelig Mængde baade i Bredderne af Bratthals-Lvissel, og i Bækken, som falder i samme Elv, kort fra Torse-Jokel.

§. 794.

Af de grove Steenarter findes fornemmelig: a) Fjældklipper, af det sædvanligste Slags; nemlig Graaberg, Stotteberg, Kixampemure (§. 567.) og Blaagryte (§. 477.). Dog ere disse Sorter meget rare at finde i rette Lag i Skaftefells-Spyssel, hvor Landet er saa forfækkelig omtumlet, og Klipperne paa nye forandrede.

Grovere
Steenarter.

b) Sands

b) Sandsteen, bemængtet med Leer, treffes her paa nogle Steder, og det almindelige Moberg paa mange; især have Lomegnusen størst Mængde deraf. I Myrdalen bruges denne Sort til Bygninger, og man seer huggne Steene deraf i Huusene paa Solheim. c) Gul og rød Sandsteen findes ved Hammersfiord, kort fra Beresfiords Havn, nedfalden fra Viærget, som haver høit oppe et tykt Lag deraf; men det synes meget besværligt at komme dertil; ellers er dette Steenbrud meget godt til Bygninger, og især den røde Forandring. d) Rødeberg, en stor Klippe eller Part af Viærget paa Havbredden, kort fra Rødesfiords Havn, bestaaer af en meget god Art og tienlig til Bygninger, mørkerød af Farve: den er haard, lader sig godt arbeide, og giver ikke Hølebyrdens Viærgart (§. 714. g) noget efter. Indbyggerne fortaalde den eene af os, som besaae Stedet, at de Hollandste Fiskere pleiede at bagesle deres Fartøier med Steene fra Rødeberget.

§. 795.

Finere
Steenarter.

Alf finere Steenarter findes mange Arter og Forandringer paa Østerlandet, ja saavidt os er bekendt, flere end i de andre Fierdunger, og det fordi Fjeldbjergene, som ere tilsvorne paa det flade Land, og især Fjeld-Jokierne, bringe aartlig alle slags Gruus og Steene frem med Vandet; men derfor er og intet Forraad af dette Slags Steene. De ere alle vandlidte, og bestaae fornemmelig i Kristaller, Kværter, Zeoliter, og iblandt Blodsteene. Dette er egentlig at forstaae om Skafesfælds-Epffel. Østfiordene have ogsaa nogle Viærge, hvorfra der kunne havees smukke Prover af Jaspis, Chalcedonier, Onyxsteene, Porphyriter, og andre Kværter og Agat-Arter. Vi ville nævne nogle især. a) Grøn Jaspis er i Alptrevigs-Lind, et Viærg, som efter Indvaanernes Meening giver mange

mange Natur- eller Edel-Steene; og i Sandhed, i Hensigt til de Sorter og Forandringer, som her falde, have de større Ret at rose den derfor, end andre have, i at rose Eindestol (§. 701.). Man finder store Stykker, som lade sig smukt slibe, men ere temmelig haarde og seie. Her i Nærverelsen falder og den Forandring Jaspox chalcledonio mixtus, som er en grøn Jaspis, med mælk- og valdesfarvede dunkle Strimler og Figurer. Om den sorte Jaspis-Art paa Siden er før nævnt; men den bliver neppe nyttig til Arbejde. b) Baggalutar kaldes en besynderlig Art af Dolithen, som ogsaa falde i bemældte Bjerg, i haarde Klipper; men denne Steenart er endnu haardere, samt flintagtig, og viiser allehaande Skikkelser; dog falder den sædvanligst i Rugler, eller i runde, nu sorte-blaaagtige, nu rødagtige Bolde og Druser. De ere en Art af Aritis, udbvendig enten enkle og glatte, eller besatte med smaa Bevæxter, af sammeslags Vone, som ere indvendig hule, dog gierne næsten opfyldte med en anden Steen af samme Slags, hvilkken dog aldrig sidder løs, men hæftet til den yderste Skorpe, med tilvorne smaa Quarzkrystaller, som da danne en tynd Mellemhinde, der skyder sig ud i Straaler etsteds fra Hæmisphærio eller Steenens halve Runding; denne Mellemhinde falder iblandt hvid, men oftest graa og rødagtig. Disse Boller ere af adskillig Størrelse: nu i Vonne i Tykkelsen, eller mere, nu ikke større end Pebers Korn. Af de middelmaadige, som Kirsebær, treffes nogle hvide mælfarvede Boller; men disse ere rare, og det er kun den yderste Skorpe, som har denne Farve, og seer glindsende ud som sleben Marmor. De store falde gierne to og to sammen, da de egentlig kaldes Baggalutar, eller med et ældre Navn, Srediasteinar, hvilket Navn vil sige det samme som Enorchis. Der falde ogsaa

mange Voller i en Klynge (*Ætiræ multiplices*). I Hensigt til denne Steenarts Grunddvne, er den midt imellem Qvarz og Flint, men derhos tung og noget jærnagtig. At den haver eengang været flydende, er ikke at tvile paa; og at den almindelige Jordbrand har især virket her, viser baade den Matrix eller Klippelaget, som disse Voller sidde i, og Knorterne uden paa; men især de Baand, som de dobbelte Voller have, hvor de støde eller hange sammen. c) En nye Steenart, som vi have kaldet *Qvarzum coloratum*, opdagede vi paa Skastefjeld, bag ved i Bierget, efter Bonden paa samme Sted, hans Anvisning, og have ingen andensteds fundet dens Lige. Ved et Fjeldsfred, dog ikke i de faste Klipper, var et lidet afbrudt Lag af en glindsende fin glassuragtig og ugiennemsigtig Steenart, rød inden i, og hvid udvendig, med saa blød en Skorpe yderst, at man kunde strabe den med Næglen. Denne Steenart, hvor fin, tæt, og udarbejdet den er, falder dog brækkelig, og dens Matrix, som Steenen sidder i, er et hvidt og fint Leer, som Porcellain-Mergel, hvilkens, jo meere den nærmes til Steenen, des tørrere bliver den, og dannes til smaa kantede, lidet glindsende hvide Stykker, lignende meest Steenen selv, men dog endnu blødere og brækkeligere. Steenen, slagen imod Staal, giver ikke Jd. Det første den kom i Jiden, gav den Knald og sprang i Stykker; men derpaa holdt den sig temmelig stræng, og endelig gik den i Glas. Materien synes at være af Oprindelsen halv-vitrificeret. d) Stjærnesteen eller Zeolith er for anført (§. 568. m). Af den falde her 3de smukke Forandringer. 1) En ganske hvid og ikke synderlig haard, med lange og tydelige Straaler, treffes paa Skeideraasand, og er bragt for Lyset af den bevægelige Jofel sammesteds. Stykkerne deraf ere saa store, at en Stjerne kan være 2 til 3 Tommer tyk. 2) En nysød

nyesød eller tilvoksende Stærnesteen, *Zeolites Plumosus*, falder i Mule-Spyss, og treffes ogsaa vester paa Landet. Man seer den gierne i 2de til een Side sammenhængende tynde Lag, som aabnes paa den anden Side, og der sees tydelig, hvorledes de unge bare Straaler skydes ud, tynde som fine Menneſſehaar, og deres Mellemrum staae aabne. Disse Straaler falde paa Østerlandet forte; men vester paa har man truffet dem baade lange og grove, dog med aabne Mellemrum. Viidere treffes paa Nord- og Øster-Landet den unge Zeolit i dens Matrice, som synes at være en tør Mergel-Art, der er lidet skarp at føle paa, og har ligeartede Deele; den er gierne hvid, dog øfter paa ogsaa gulagtig. Man seer i denne Materie kun en Tegning af de omtalte Straaler, som let kan forstyrres, ved det Materien er ei endnu bleven haard. 3) Den tredje Forandring er en haard Zeolit, hvis Stærner inden i ere meget faste, og Straallerne sammengroede i eet. Farven er hvidblaalig, Materien glindsende, og saa haard, at naar den slaaes imod Staal, komme der nogle Gnister ud. Dens Stærner ere smaa. Steenen kan slibes, og viiser ret artige Skygger og Lyskræftninger. e) Jølandst Kristal eller Dobbelsteen er den bekjendte Art, som er omtalt i Vesterlandets Beskrivelse (§. 568. n). Af den falder saa stort et Lag og fuldkommen Generation i en Viargløste ved Rodesfiord i Mule-Spyss, fort fra Helsingstad, at der haver ikke sin Lige paa heele Landet: det er vopet imellem Viarglets faste Klipper, hvor man kan faae Stykker der ere 2 Fod paa hver Kant, og bestaae af utallige mindre og mindre Rhomboider. Denne Steenart falder her ogsaa særdeles reent, klar og giennemsigtig. f) *Naturustein* eller saa kaldte Edelsteene. Af disse og flere Arter findes paa Østerlandet. Man haver og der samme Begreb derom, som før er berettet (§. 569.).

Steenarter, frembragte ved Jordbrand.

§. 796.

Tophi.

Iblandt disse Steenarter anfore vi Tophsteenene, endssiont de nærmest ere frembragte og sammensatte af Vand, fordi Jiden tillige er deres Aarsag, ligesom Jordbrandens Heede ulmer paa de Steder, hvor kaagende Springsvande findes. Vi have allerede (§. 219:225. 571. og 718.) talt meget om Tophis, hvilke i Island falde meget forskjellige, dels i heele, store og grove Steene, Brude og Hælde; dels i fiine, med fremmede Materier beblandede og til Steen forvandlede smaa og store Stykker, som ere vist nok yngre end de andre, og frembragte af de kaagende Springsvande og varme Bade: de betegnes af os med de Navne Accreta og Concreta Thermarum, Petrefacta Tophacea o. f. Disse sidste have vi hverken seet eller faaet Efterretning om paa Østerlandet, undtagne de nye, hvide, tynde, gipslignende Accreta Thermarum (§. 10. 170. o. f.), hvilke nogle af Mule-Syffels varme Bunde frembringe; samt den Hælde, som vi saae paa Skaal (§. 777.). Men af de forste Slags og ældere Thophis sees hist og her fiendelige Prover, fornemmelig af dem, som ligne Kalksteene, men hverken angribes af Steedvand, eller blive til Kalk eller Gips i Jiden (§. 718. d). Disse og de andre ligge overalt i de hvide Biærge (§. 4.), hvoriblandt de fornemste paa Østerlandet ere Almánnastard og nogle af Voners Biærge i Skastefjælds-Syffel, samt Flögutindur og en stor Deel af det tilgrændsende Fjæld i Breiddal, i Mule-Syffel. Disse Biærge indeholde desuden andre Sorter, baade vitrificerede Klumper og hærdede Leerarter, som det Slags Biærge pleie at frembringe.

§. 797.

§. 797.

Da den Meening kom op, og blev bekiendt i Island, at samme Land var overalt dannet og igien omdannet ved underjordist Jid, fik den endeel Modstandere iblandt Landets Indvaanere: deres Hovedindvending var, at Graunene, eller de egentlige Lavastrækninger, som de fornemste og visseste, ja de eeneste Beviser paa Jordbrand, fandtes kun hist og her, og at der vare mange Bygder, ja heele Landskaber, som havde ingen Graune. Man vil ikke opholde sig med at tviste om denne Meening; thi det er nok, at dette Bækk fremviiser paa sine Steder mange flere, og nogle endnu pigtigere Kiendteegn paa saadan en almindelig Jordbrand; især viiser Østerlandet, fornemmelig Skastefjælds-Eyssel, tydelig nok, at omendstient der ikke sees Strækninger af Jordfinner, saa er dog Grunden der viidt og breedt tildeels ødelagt, tildeels anseelig foreget. Klipper af gammelt Jordfinner, frembragte ved forbemaeldte almindelige Underjords-Jid, findes og her overalt, i de Fjælde, som ikke ere omtumlede siden Landes Behoefte: de ere nemlig nærlæggede til de Klipper, som vi have beskrevet i Skardsheidens Fjælde (§. 211.); og de synes tildeels at være kun halvsmaaltede, tildeels forandrede igien, ved deres Ælde, og tilvoejne ved udbortes Tillæg af Jord og Vand fra Kusten, og Hullerne meget opfyldte. Fra denne Art maa adskilles det nye Jordfinner, som Indvaanerne kalde Graun, og som er frembragt ved Jordbrand paa visse Steder i Landet, efterat den ovennævnte almindelige Omtumling er skeet. Det ere smaltede tunge Klipper og Hælder, hvis Grundævine man endnu ikke er vis om, uden saavidt sligt kan sluttes af denne Materries Forandringer i Jiden (§. 213. og 214.). Der er ellers stor Forskiel paa disse Graune: de ælste, som man veed at være op-

Komme noget før, og kort efter Landets første Beboelse, ere mindre udhullede, og tyngere end de yngre; de ere ogsaa gierne graa, lyse graa og askefarvede i Bruddet, da de nyere derimod ere sorte, lætte, og meget udhullede; dog er der atter Forskiel paa, hvilke af de lige gamle der ere meest udiintne, og disse kalde Indvaanerne især *Bruna-braun*, det er forbrændt Jordsmuler. Hvor de Vands og Ildsprudende Bjerge have plettet deres Virkninger, træffer man kun smaa Stykker af denne sidste Art; thi alle Ting ere der udbrændte til Jimpesteen og Aske. Men hvor nogen smeltet Steenslod er gaaet over, og hvor Jordsoer, med Krat og Urter, have været i Veien, der er Jorden overalt bleven forvandlet til Hraunmaterie; den levende Jordsoer i Nærverelsen viiser og, under den sorte og feede Bærtejord, et tørt rødagtigt Lag; og der under igien, samt i Nærverelsen findes baade Jærnoffer og jærnholdende Steene. Paa den sydlige Del af Siiden seer man en gammel Hraunstrækning, og der iblandt Pyramider, som ere Kammer af smeltet Steen, lige som de paa Skardsheide (§. 127). 3 Mule. Syffel sees endnu mere af Hraun, f. Ex. den Strækning paa Simsvatsheide. Men bag ved Jisbiærgene, eller midt oppe i Landet, findes allermest deraf. *Odardahraun* er den største og fæleste Strækning af dette Slags, som skal findes paa heele Landet, da den ikke alene er meget vidtloftig, men haver ogsaa mange Ræs eller Arme, som møde dem der skulle reise over Fjældene, fornemmelig Sprengesand, hvorved de kunne let forvoildes, hvis de ikke ere Veien vel bekiendte. Dette Hraun have de ildsprudende Bjerge (§. 766.) frembragt: det skal være saa høit og ulige, med skarpe og spidse Klipper, Huuler, og Abninger imellem, at man kan umulig komme der over med Heste, og ikke engang til Fods, uden med største Nød og Fare.

§. 798.

Skursteen og Afte er de Østerlandſke Iſdberges fornemſte Skursteen og Afte. Product, hørende til Mineral-Riget. Den ſaa kaldte Afte er nu omſtunder altid ſort, ſamt meget ſkarp, og naar man noie betragter den, intet andet end Skursteene, ſom ere bleve knuſede til Stov. Dog er den, dette naget, utroelig igiennemrængende, thi den ſniger ſig ind i tilſiſte Huuſe, Glemmer og Kar, og indtrænger endog de mindſte Mellemrum. Derfor gjør den Indvaanerne ſaa ſtor Skade, ved at trække ſig ind i deres Madvarer; Kreaturenes Tænder ſlides og fordærves deraf, og de udmavres, ved at de ikke kunne fordrage at bide Græs og Urter, ſom ere inden i fulde af denne Afte. Skursteenene er meget forſkiellig, baade i dens Farve, Haardhed og Tyngde. a) Den røde, ſom her er ikke meget af i Bygden, er den haardeſte, ſværeſte og noget jærntagtig: den ſynes at være af Oprindſen en rød forbrændt Lava (§. 127. og 212.); thi omendſkiont ſmæltet Steen er rar paa Øſterlandet, hvor alle Klipper ere udbrændte, ſaa ſees den dog paa Giallebog (§. 776.), tiſſigemed den ſiine udarbeidede Sinnermaterie, af hvilken man har Overflodighed paa de øſtliche Ørønder af Mæſellſand. b) Den ſorte, ſom er den almindeligſte, og forſkiellig i Haardhed og Tyngde: Man bruger den til at ſkuure ruſter Jærn. Den ſynker gierne i Saltvand; men drives dog allevegne omkring, hvor Havets Uroelighed kan naae til Bunden. Den ſom er meſt udbrændt flyder endog i ſalt Vand, endſkiont den ſynker i det ſode. c) Den blaa, ſom før er nævnt (§. 777.), og træffes ikkun ſelden i ſtore Stykker, er meget udbrændt, læt og brækkelig. d) Den hvide, ſom er meſt bekiendt, og brugeligſt til at ſkuure Metaller, ſaasom den er blødere, ſiinere og lettere end foranførte Urter. Dræſeſokel har

har undertiden opkastet en stor Mængde af den, og dog igien paa andre Tiider inter Forraad havt deraf. Een af vore Tiders Mineralogis (Forskj. til Mineral. Stoeckh. 1758) siger, at den er kun den sorte, som er bleven udbleeget, eller bader udkaagt og udbrændt, hvilket i sig selv synes meget antageligt; Dog kunne vi forsikre, at den Islandske kommer hvidt fra de Vand- og Jid- sprudende Bjerge; og at den ikke just har sin Oprindelse af den sorte, der viise dens indvortes Trævler, eller Striber, der falde langagtige og glindsende, som Asbest, saa at man skulde tænke, ved første Oieblik, at den var erklæret Forvandling af Træ. Denne hvide Art, som ogsaa Hekla haver frembragt, flyder paa Havet og driver igien op rundt omkring paa Landet.

§. 799.

Kavntinne.

Kavntinne, eller Glas-Agat, er for beskrevet (§. 216, 445, 510 og 717). Noget af de flere, lät smeltende og uduelige, opdagede vi i Loners og Breiddalens hvide Bjerge, hvor vi, som paa flere Steder, søgte efter denne Materie, fordi den største, der falder i Gruus, var udgivet for Steenfull af Nabberne. Paa begge de anførte Steder falde ellers gode Kavntinner; men kun i smaa Stykker, saa vi ei kunde træffe noget Lag af dem. Det eeneste Beviis, at denne Glasart er frembragt her i Island, ved de bekjendte Jid- sprudninger, eller siden Landet fik Indvaanere, viiser Træse-Bjergden; vi opdagede der, iblandt den opkastede hvide Skursteen, fra Omkumlingen 1362, smaa sorte Kavntinner, hvilke dog ikke vare ret gode.

§. 800.

Jordfinner-
artede Basalt-
ter.

Al jordfinner-artede Basalter, en ret besynderlig Klippe-
Art, som vi ikke for havde seet Mage til, bestaaer Bergaar-Giall,
i Hor-

i Hornesfjorden, som man har tæet ved sig paa hoire Haand, hvor Beien ligger op til Almannafjard. Disse Basalter ere overalt fulde af smaa Huller, som de Rhinlandske Mollasteene, der ere jævne: dog er denne Klippe-Art ikke saa skarp i Materien; den er ellers haard og temmelig tung, Skiffelsen feinkantet, men falder derhos ofte uordentlig. Støtterne ere ikke tykke, gierne 1 Quarter, meer eller mindre, og meget tværspunkne, saa at man faaer Steenene jævnlighst paa 1 Al. Længde og derunder. Det besynderligste er, at endskjønt disse Basalter er vist nok smeltede og udhullede af Jordbrand, ere de dog hvidagtige af Farve: dette viiser, at Steenens Grundvæne maa være af et andet Slags, end Gråvæernes; formodentlig det samme, som Baulasteenens, især af den smale og trinde Art (§. 221.), som tillige er udhullet. Bergaarsfældets Basalt kan da sættes midt imellem denne Sten og Gråvænen.

§. 801.

Alf egentlige Mineralier vide vi her kun lidet. a) Jærn findes Mineralier. des her baade i Myrefjord, Økkerleer og Steene, ligesom andensteds i Island, dog især i Østfjordene; ja det er meget rimeligt, naar man betænker de foranstorte Exempler (§. 378, 575 og 720.), at de første Beboere i Flotsdal og nærliggende Egne, hvor der har været overflodig Skov, have og anlagt Jærnværker. Der nævnes desuden Jærnsmedde paa Østerlandet i de første Tider. b) Jærnkis ses i Strandklipperne paa Papoe, med smuk Messingsfarve, som Indvaanerne agte høit, og derfor kalde disse glimrende smaa Steene Gullplenter. De troe endog, efter dets Forfædres Fortælling, at her i gamle Dage skal have boet en stor Dren eller Drage, om hvilket Dyr de Nordiske fabelagtige Historier fortælle, at det søger, ligger paa og søger Guldet. Den hvidagtige Kis, som findes

KEE EE

i Alpe

i Alptrevigstinden, i en hvid Jordart (§. 793 a), er ikke saa svovelsrig, som denne, eller den almindelige grule Kiis. c) Af Saltarter ere her ikkun saa bekendte, foruden Hav-Saltet. Kort efter at de Vands og Iidsprudende Jofler have raset, har man sunder lidet hvidt Kioffen-Salt oven paa den opkastede Vimpesand eller Afke; og dette bekræfter den Meening, at disse Jofler maa have Samfund med Havet, allerhelst siden mange af dem ere nær ved samme, og deres aabne Grundvoelde gaae meget dybt ned. Erslags alcalist Salt treffes paa de mod Sonden vendende høie Mobergs-Klipper, i Myrdalen, mellem Hofdebreck og det Forbiarg Reine: det sætter sig udenpaa Sandsteenen i Forrevær og Solskinsvarme, hvor Klipperne hange noget ud over, og Gaarene pleie at ligge under om Natten. Nogle have taget det for Potaske. Arten er hvid, noget urineus for Smagen, og, efter de Prover, som vi gjorde, et Kioffen-Salt, mærket med flygtigt Alkali. Grunden er sort, og Sandet neden for Klipperne, og fra samme lige ud til Havet, som er i Milveis, bestaaende af Skuursteen-Smuuler. Der skal lang Tid til at samle noget klæffeligt af dette Salt; og derfor, skönt vi bestillede det hos een af Naboerne, kunde vi ikke faae, til at gjøre Prove med, uden det lidet, som vi selv kunde samle paa Stedet. Men Spørgsmaal, om man ikke her kunde hielpe Naturen.

§. 802.

Fossilier.

Blandt opgravede Sager af andre Naturens Riger, som deels ere forvandlede, deels ikkun balsamerede, eller igiennemtrufne formedelst mineralske Safter, har Østerlandet fornemmelig 3de bekendte Sorter, nemlig: a) Træ blevet til Steen, hvoraf der haves store og anseelige Prover i Helgestadskard i Mule-Øyssel, i Siælbrinken mod W., kort fra Nodestjords-Havn. Steenen er haard

haard og tung, sort af Farve og lidet jærnagtig. En hvid Skorpe, af hårdet Leer, sidder uden paa og imellem Gliserne. b) Surterbrand er paa nogle Steder ved Bapnesfiord, især paa den østre Kant, og i et Fjeldskred ved et lidet Bierg, Baustafell. c) En steenkull-tignende Materie har man ogsaa fundet i denne Egn; den er sort, glindsende og falder i uordentlig kantede Smaastykker; den brænder meget godt i Jiden, giver derhos Barme, men røger, og er derfor tienstigere til Kioffen-Jid og Kaffelovne, end til Smeder, uden den i Forveien soides til Kull. Materien er i Slægt med Ampeliten (§. 583.), og nærmer sig tillige til Surterbrand, ligesom den Prove fra Natfareviiger (§. 724.).

Frugtbarheden.

§. 803.

De Pladse, som endnu ere beboede paa Østerlandet, ere i Al- ^{3 Alminde-}mindelighed frugtbare paa saftigt Græs og kraftige Urter; ja end, ^{lighed.} og de øde og forladte tiisfulde Steder, som man mindst skulde vente, f. Ex. i Nærværelsen af Selheimes Dræse og Skeideraa-Jokel eller Lomagnupen (§. 773, 782 og 779.). Bag ved disse Jisbiar-ge har man ogsaa frugtbare Pladse, som Jokelsfiælds-Dalen bag ved Skæstfiæld (§. 781.), samt Fjeldet ovenfor Dræse-Jokel, hvor endnu voper Angelik, dog ikke som tilførn, da Folk drog derhen fra Bygden, for at samle Rodderne. Bag ved den nye og fæle Breedesmarks-Jokel (§. 783 - 84.) skal endnu være den deiligste Græsmark til Gaarebeed; men Gaarene blive her vilde, fordi man ikkun sielden kan komme over Jokelen derhen. Ovenfor Bapnesfiord og Jokelsdalene skal ogsaa være gode Græsgange. Nogle Steder især ere nævnte i forveien, tilligemed Bygdernes Frugtbarhed (§. 765.).

§. 804.

Urter især.

Urter, især de nyttige, eller andre mærkeordige, øster paa, ere disse følgende. Paa Tuunene, som og paa de mindre frugtbare Steder, findes de almindeligste af dem, der ere opregnede i første og andet Stykke (§. 32 og 247 til 254). Melur, eller det vilde Korn, som ligner Rug, bringer Østerlandet i største Mængde, endskjønt det ikke benyttes til Spiise, uden i Skastefjælds-Syssel (§. 777). Det vøyer paa Flotsbødsfand, og i største Mængde i Ørken mellem Jøfelsdal og Madredal (§. 726. 5). Stusa, ogsaa kaldet Puskabit, Scabiosa (succisa), er en Urt, som Østerlandet har for sig selv. Den vøyer paa Sida, treffes dog ogsaa østligst i Rangaaes valle-Syssel. Det sidste Navn er vist nok oversat af: morfus diaboli. Blaaflucka, Campanula (patula) Sp. Pl. 163., er den anden Urt, som alene tilhører Østerlandet: den vøyer der paa mange Steder; men pryder især Eggen ved Skastefjæld. Rumin, som det kaldes i Island (Carum Fl. Sv. 245.), vøyer vildt paa Ralsfjælds Præstegaard. Angeliken have vi nævnt tilforn. Dens Rodder graves ned i tør Muld, hvor Frostene ikke kommer til, saaledes at den ene Rod ei rører den anden. De tages siden op om Vinteren efterhaanden, for at spises. Carvi bruges til Rugmeels Rager, og for at sætte paa Brændeviin. Mariuvøndr, Gentiana autumnalis, vøyer i Eide Kirkesogn i Mule-Syssel. Den kaldes Mariaæ Riis, fordi Jomfru Maria skal have brugt den til at tugte Børn med. Purpurablomstr, en Forandring af Epilobio palustri (§. 589.), vøyer overmaade stort ved den Gaard Hølgstade i Rødesfjorden i Strandklipperne. Sloar-Urt, Persicaria natans (Fl. Sv. 318. β), er meget rar, treffes dog paa Ketilstads-Heide i Flotsdal. Pyrola racemosa saae vi alene paa Røststade, vøyer

vøper op af den sorte Åfse fra Katlegiaa. *Saxifraga cespitosa*, Sp. Pl. 404., vøper paa Giallabak; *Saxifraga aizoides* paa Lonsheide, og Egnen der i Nærverelsen. *Solta-Ror*, Roden af *Cucubalo acauli*, vøper vel alle vegne, men benyttes især paa Sida, hvor Roden opgraves om Foraaret, kaages i Vand og spises med Smør til. Af Jærdarber, *Fragraria (vesca)* Fl. Sv. 414., vøper noget lidet paa Sida, fort fra Kalvesfjald. *Bartsia alpina* (Fl. Sv. 515., saae vi allerførst paa Giallabak, hvor meget af den vøper de op af Vimpesandet. Da vore udhungrede Heste finge her fornemmelig denne Ur til Livs, og vi mærkede, at de lugtede stærkt derefter, især Ryggen paa dem, havde vi Urten mistænkt derfor, fordi den ogsaa havde en stærk Lugt ved sig; dog Hestelugten kom nærmest til den af *Cotula foetida*: Bartsia Lugt kunde rimeligst, giennem Hesteue, modificeres, og fortales med deres egen Lugt. *Starkskaal*, *Cochlearia rotundifolia*, vøper i Ginnafjord, og mange Steder paa denne Side af Langenæs; men den allerførste Mængde findes nær ved Holme Præstegaard, fort fra Rødesfjords Havn. *Ville-Ert*, *Pisum maritimum* (S. 490. f.), vøper paa Solheimesand ved Stank-Elven, iblandt Gruus og smaa Steene. Den treffes og paa flere Steder øster paa. *Smaare*, *Trifolium album pratense*. Dens tykke Vegge, Smærur, kaages i Mælk, og holdes for tækker Mad; de spises ogsaa friske med lidet Smør til. Dette har overalt været Maade tilforn; men nu er det kun i Brug paa Siden, hvor man har en Mængde af denne Ur: *Vallhumall*, *Achillæa* (*Millefolium*), groer i Midparten af Mule-Syssel. Navnet viiser, at de gamle Isændere have brugt den i Stedet for Humle; hvilket ogsaa er bekiendt, og Urten endnu saaledes brugelig i een af de Øenke Provincer, da den giver godt

kyddet Bl, der gjør lystig, ja beskænket. Indvaanerne bruge her iblandt Smørelse til Saar og Udsæt, lavet af de smaat hakkede Blade, omrorte med ferst Smør. Burkne, Filix mas, vøper her paa mange Steder, og somme farve grønt af Urten ferst, eller af Saften, hvori uident Toi lægges og kaages; men saasom Omgangen er meget eensfoldig, og man bruger intet, uden Urten selv, er Farven og kun slet. Tungl-Urt, Lunaria (Osmunda): den opdagede vi bag ved Jisbiærgene, i en Huule i Hoangil (§. 776.). Sjalla, Graus, Lichen (Muscus) Islandicus, kan faaes i god Mængde i Mule-Spyssel. En vel pakket Londe af saadant kruuset Sjældgræs koster her 1 Batt. Man bruger det her, som i andre Herreder, i Stedet for Korn, da man tørrer det over Jld, og derpaa støder og forvarer det til at lave Grod af efterhaanden. Til forn har man ogsaa brugt det til Brod eller tynde Rager. Geitna-skof, Lichen proboscideus niger (§. 254. d), bruges ogsaa til Mad paa Østerlandet, og deraf laves Sodgrod, som baade er sund og nærende. Raal og Madurter, foruden de vilde, ere Østerlanderne endnu ikke komne i med at bruge. Men at Have-Urter kunne vøpe i Mule-Spyssel, er ikke at tvile paa; thi vi saae paa Restilstad en Raal-Have, anlagt af Spysselmond Thorstensen, hvor Madurter stode godt i Aaret 1757. De Handlende fra Kiøbenhavn have og forsøgt det samme hos dem, og opdyrket adskillige Madurter til deres Brug, medens de handle der i Landet. Kysten ligger meget sydlig, og har mange smukke og frugtbare Egne. Men det vil neppe synes troelst, at slige fremmede spæde Urter kunne komme op og vøpe til, nær ved de kolde Zokler. Dette er dog fæst; og vi ere oienfynlige Vidner dertil. Bonden paa Skaptessell havde kørt fra Jisbiærget, for Proves Skjld, forsøgt med grøn Raal

og hyde Koer; og saaet begge Sorter til at være niidelmæssig, uagter Maringerne være meget haarde, den Tid vi reisste der i Landet. Det andet Exempel, paa Heinaberg (§. 786.), er dog langt mærkværdigere, i det her vorede Raal nogle Skridt fra Zisbredden. Af dette, og det som før er nævnt om Græssets Fremvæxt, slutter man, at den stærke Kulde holder sig meest i de øvre Lust-Egne, men ikke i den underste, og tilligemed, at Jofternes Uddunstninger maa være frugtbringende.

§. 805.

Til Gøder for Kreaturene bruges paa Østerlandet intet andet end Høe, uden i Nødsfald. Høet behandles og virkes som paa andre Steder; dog bruger man her, især paa Siden, længere Lær end sædvanlig, ligesom de korteste Lær findes vester paa, hvor Græsset skal staaes imellem Steenene. Lader, til at forvare Høet i, ere paa Østerlandet meget almindelige, ligesom de tilforn have været over heele Landet. Høet forvares bedst i disse Huuse, og tabes ikke meget af Kraften. I andre Herreder indvender man mod Høes Lader, at Gøderet under Dag lettere bliver sødent og mullnet, da det ikke staaer i frie Lust, som Høestæffene. Men de, som ere for Lader, sige derimod, at man ikke kan nær saa vel forvare Høet fra Regn og Blæst, naar det staaer ude; og dernæst, at endskiont det er fugtigt, naar det kommer i Laden, gaaer det dog ikke i Brand, som det gjerne gjør ude i Stæffene; men brækkes, og bliver derved saa meget mere tjenligt til Malke-Koer, hvis det ei er alt for vaadt i Forveien. De sige og, som sandt er, at meget Høe gaaer ude til spilde, som Blæsten fører bort. Deres Meening bliver og den retteste, ligesom og Mangel af Sommer, Sattigdom, med videre, er den sande Årsag til, at Lader ere gangne saa meget af Brug.

Gøder til
Kreaturene.

3 Be

I Betragtning af dem kan man ellers giøre følgende Anmærkninger angaaende Foderet: a) Alt Høet bliver saa ofte mullent i Laderne, kommer hos mange aleene af Skiodesløshed; thi Vonderne ere ikke meget noiſende, at lade Høet være vel torret, ſeend det kommer i Laden, ſiden de vilde, at det kun meget ſielden kommer i Brand. b) Huusholdere i Island tvifte meget om, hvilket Høe der er det beſte: det ſom bliver grønt, naar det er torret, eller det ſom er blevet lidet brunnagtigt. Begge have Ret i viſe Henſeender: Erfarenheden viiſer, at tidt og ofte ville Køerne ikke æde eller malke godt af det grønne; men Heſte eller Gaar æde det heller, iſær de ſidſte, ſmaa Høe. Det er og nødvendigt, at Elting (Fl. Sv. 833-34.) bliver grøntorret, og ligeledes alle andre Urter, ſom viſne eller blive ſorte og ſaſtesløſe, naar de tørres; ellers giøre de meere Skade end Nytte blandt Foderet. Det kraftige Høe, ſom meeft beſtaaer af Græsarter, vil naturligviis brækkes og blive lidet brunnagtigt, naar det har ligget nogle Dage ſammenpakked, og ſaaet en maadelig Varme; derved ſaaer det en ſød og ſtærk Smag og Lugt, og dette Høe ville Køerne allerheſt have, og malke riigeligſt deraf; men hvis dette eller andet Høe bliver fugtigt, eller ſor vaadt indpakket, kommer ſtærk Heede deri, da det enten ſoides eller kommer fuldkommen i Brand; eller og, naar Høet ikke er ret kraftigt, køles Varmen og Røgen igien, da det bliver muggent. Godt Høe kan vel ogſaa blive muggent, og ſet Høe komme i Brand, ved det der altid er nogen Blanding af flere Slags Græsarter, og Umſtændighederne forſkiellige. Af muggent Høe ſaae Kreaturene Hoſte og andre Uleiligheder (§. 30.). c) Alt ryſte Foderet, ſeend det gives Kreaturene, er en almindelig Maade i Island, og dette af 2de Aarſager: nemlig at af Muggenhed, Støv og Ureenlighed ſkal flyve bort,

bort, og for at blande 2 Slags Høe efter Behag og Omstændighederne; det første havs ogsaa for Vine i Norge. Men nogle gode Hunsholderes Erfarenhed haver dog fundet deri denne Undtagelse, at naar Høet er reent, vel høstet og uden al Muggenhed, samt lidet bruunagtigt og veltugtende, ville især Køerne allerhelst æde samme urhøst i heele Rager, og malke allerbest derefter. Aarsagen er baade at al Kraften og Lusten bliver paa denne Maade siddende i Høet, da den ellers mangfoldig vilde flyde bort, hvis Høet blev røstet; og tillige, at Høefroen, som gierne sidder deri, (saasom Græsset slaaes de fleeste Gange forend Froet er affaldet), og giver den største Kraft og Næring, maane falde bort ved Røstelsen. d) Af dette kan man da see, hvor nyttigt det var, at bruge Lader overalt i Island, især naar Høet kom vel høstet derind, da det beholdt al sin Kraft, saafremt man ikke iblandt rørte det om. Det mældes i Søndmørs Beskrivelse (1 D. p. 363.), at Bønderne sammesteds røre jævnlig Høet om i Laderne, for at det hverken skal raadne, eller Heede gaae deri; men dette er aldrig at frygte for, uden naar Høet bringes vaadt og fugtigt ind i Laden. Naar Bønderne i Island fornemme til alt for stærk Heede i deres Høestakke, (hvilket de prøve ved at stikke Armen dybt ind i Stakken), saa at hverken Nøghatte, som sættes oven til ned i Stakken, ikke heller Lægter, som stikkes tværs igjennem den, kunne strække til at bringe Heeden ud: da rive de først Stakken ned, og røre Høet siden ganske om; men dette gjør man ikke øfter end eengang, allerhelst naar Høets Heede har udrasket, thi man har ikke siden at frygte for, at det skal blive heedt igien.

§. 806.

Skov af smaat Birk vokser snart allevegne paa Østerlandet,

Stov.

hvor Grønsværen ikke er borte. Jøfelsdalsen og heele Eliotsdals

211

Herred

Herred er vel forsynet baade med denne Træart og adskillige smaa Pile. Paa Bulandsnæs i Alptefjord, østligst i Hornesfjord, vestligst i Dræferne, og paa Siden, vøser sammeslags, dog ifkun smaa Træer, som ikke due til Bygninger, men kun til Kull for Jærnsmedde. En Art af Torne, kaldet Thorn, og Thirner, findes paa Øvisker, østen til ved Dræse-Bygden; det er en Træart med hoasse Pigge, som bliver over 2 Alne høj. Vi saae hverken Blomster eller Frugt derpaa, den 10 Septembr., da vi vare her. Arten er dog, vel Berberis Fl. Sv. 290. Den er smuk og lige. Indbyggerne søge dog at opredde den, og det, af samme Aarsag, som Eidselen forfølges for paa Nordlandet (§. 727.). En anden liden Træart, som vi heller ikke funde i Blomster, vøser ved Holt, en Bondegaard 1 Miil østen for Skaal. Vi maae dog anføre den, for at andre kunne lære at kende den, siden den ikke treffes andensieds end her. Den er een Fod høj, lige, og Bullen overalt besat med smaa, veege Pigge. Indvaagnerne her paa Stedet kaldte den ogsaa Thyrner, hvilket Navn de have lært af deres Forfædre.

Om Indbyggerne.

§. 807.

Legemet's Beskaffenhed.

Legemet's Beskaffenhed hos Østerlandets Folk viiser os intet besynderligt. De ere af Legemet ulige, baade smaa og store. Store Sygdomme giøre ikke megen Skade iblandt dem i Skafesfiælds-Spyssel; maafee fordi Jøkerne trække til sig den usunde Lust. Spedalskhed er her ingenlunde almindelig; thi Østerlandets Hospital paa Horgsland havde kun 2 Syge i Aaret 1756; derimod skal denne Sygdom være meget gangbarere i den nordligste Part af Mule-Spyssel, men man stikker de Syge ikke gierne til Hospitalet, siden

siden det ligger saa langt borte, og Veien derhen er hoist besværlig: Guulrot og Brystsvagheder have meget Overhaand paa Østerlandet; og det fordi Indvaanerne blive saa tidt vaade og forkjoledede, baade ud- og indvortes, i det de maa reise over mange Elve og Bænder, og bestandig trække en salt og fugtig Lust fra Havet, hvilket ikke andet kan end befordre dette Slags Sygdomme; naar man med Diæten ikke kan bøde derpaa, eller bevæbne sig derimod: Landfarsot, og Svagheder som følge Aarers Tider (§. 34. 10.), ere her almindelige, ligesom paa andre Steder.

§ 808. De øvrige Hirdunger af Landet anseer man Østerlænderne som et særskilt Folk, især dem i Skastefells-Syssel. Saa som de leve paa eenfornime Steder, og have ikkun sielden, og for en kort Tid, Omgang med andre af deres Landsmænd, have de deres Tænkemaade og Leve-Regler for dem selv; samt ere gjerne stille og sagtsfærdige, og tale ikke meget. Med eet Ord at sige: deres Sprog og Udrale, daglige Omgang og Complimenter, og tildeels Klæde-dragten, samt deres Maade at reise paa m. v., ere Aarsag i, at de kominne andre Herreders Indvaanere saa fremmede for; da de dog ikke sige meget fra dem i det væsentlige, især i Stenders Beskaffenhed. Ja de fra Skastefells-Syssel, og meest de fra Meddalslånd og Alptaver, som aarlig reise over Rangaaballe og Aarnæs-Sysseler til Dreback's-Havn, og ere derfor meest bekiendte i disse Låndsskæb, holdes endog af mange for taabelige Folk, meest fordi de, som sagt er, bruge deres egne Ord, Tælmånder og Udtryk, og ville ikke forandre noget deri. Men de have virkelig Ret i de fleste Ting, og de andres Mæeninger ere derimod ugrundede. For 20 Aar siden er disse Folk, og især Indbyggerne i Skastefells-Syssel, bleven

bleven tillagt en nye Character, som tildeels er stridig mod den forrige, nemlig at de skulde være overmaade trættefiære, og vide uendelig at indvikle deres Sager, forsvare dem med Udflugter, og smidde mange Bisager til hver Hovedsag, for at giøre Rettergangen vanskelig. Saa meget er og sandt, at der ere omtrent siden 1730 komne mange saadanne Sager derfra til Althinget, og nogle igien derfra til Høieste Ret; men siden denne ganske Rulle fornemmelig blev spillet aleene af 2 eller 3 Mænd, saa bor denne Trættefiærhed ikke tillægges Mængden, som nogen Hoved-Feil. Østlanderne ere gierne gode Huusholdere, samt reentlige og forsynlige; dog findes ikke mange iblandt dem bemidlede af Penge eller Jordegods. 3 Skafestels-Syssel ere Sidens Indvaanere de ordentligste heri; fordi Bygden er der størst og ordentligst anlagt, hvilket tildeels kommer af Velggenheden; den er desuden omgivet med ode Sandsstetter og Fjælde-Rader, og derved adskilt fra andre Bygdelave. Eliotsdals-Herred er den allerstørste Bygd, og den fornemste Deel af Mule-Syssel. Stedet er smukt, Folkemængden, i Forhold med andre Østerlandets Deele, temmelig stærk, og Omgangen imellem de mange Thing og Kirke-Sogne, som dette Herred bestaar af, idelig aaben. I dette Landskab synes, baade i Hensigt til dette, og til Himmel-Egnen, samt den forre og ventelig meget bekvemme Forsel til og fra Søekanten, eller Fiordene, at være dannet til en langt større Mængde af Indvaanere, flere Jorders Beboelse, smaa Byers eller nogle sammenliggende Gaarders Anlæg, og sølgelig til Landvæsenet, samt ind- og udbortes Handling og Pengerørelse, især hvis de gamle Fjældsveie til Nord- og Sønderlandet bleve tillige optagne igien, og nødvendige Anstalter gjorde, til deres Bedstigholdselse og Sikkerhed.

§. 809.

Tungemaalens usforandrede Tilstand staaer uden Modsigelse Sproget. i meget noie Forening med ethvert Folks Sæder og Levemaade; naar Sproget forandres, begynde Sæderne sædvanlig at vanslægt; thi i det visse Ord og Navne komme ud af Hukommelsen, forglemmes ogsaa de Ting, som med samme Ord ere blevene betegnede. Dette bekræfte Østerlænderne med deres Exempel. Som deres gamle Skikke og Levemaade (§. 808.), saa have de og beholdt deres Sprog, reent og usforandret, fremsfor andre Landets Bygde, undtaget saavidt een og anden lærd Mand kan være opkommen paa eet eller andet Sted, og have vlist sig fremsfor andre Kyndig og noie agtig i denne Sag. De tvende berømte og i Landets Sprog, fremsfor alle i deres Tid, grundede Mænd, Arne Magnussen og Poul Vidalin, have allerede tilstaaet Østerlandets Indbyggere dette Slags Fortrin; dog maae vi derved erindre, at de som boe nær ved de 3de Havne, nemlig i Bapnes Rødes og Beresfiord, og især Berfsordingerne, samt de i Bredddalen, have antaget nogle fremsmede Ord, af Tydsk og Engelsk Oprindelse. Accenten og Lyden i Udtalen er hos Østerlandets Indvaanere noget besynderlig, og signer meest den Norske; saadan en Udtale kalde andre Jslandere, der tale ligeslem, Ræk eller Rialk; dog er denne Ræk uden Tvil ligesaa gammel, som Sproget selv, og et Tegn til dens usforandrede Tilstand. Et andet Tegn er dog af meget større Betydning, nemlig at Sproget er her særdeles reent og frit baade fra fremmede og nye Ord. Det tredie Tegn hertil falder meest i Dinene, nemlig de mange gamle Ord og Talemaader, som her daglig bruges, men ere derimod gangne af Brug paa andre Steder. Iblandt disse forekomme nogle ældgamle enkelte Ord, som synes af Oprin-

delsen at være fremmede i det Nordiske Tungemaal; derhos findes og nogle sammensatte, og af Oprindelsen poetiske Ord, hvilke her bruges endog af Almuen i daglig Tale. Hvad det Islandiske Sprogs Skriverigtighed angaaer, da er den ikke bedre her end paa andre Steder. Paa Nordlandet burde den være bœst; paa Sønderlandet er den slettest; men paa Vesterlandet begynde nogle nu at forbedre den, og hvis dette Forsæt bliver meer almindeligt, vil man deri finde den sikkerste og letteste Vej, baade til at holde Sproget vedlige, og tildeels til at forbedre og pynte derpaa (§. 70. ic.).

§. 810.

Bygninger.

Maaden at bygge paa er her ligesom andensteds (§. 36.), og Driboemmeret giver Materialier dertil; thi noget deraf falder snart allevegne paa Østlandet, fordi Strånbredden er lav og ligger aaben for Havet. Huusenes Orden i Gaardene er her smuk, og dette besynderligt i Skætsfiælds-Eyssel, at hvor der paa een Grund ere flere, end een Gaard, der staae de tæt sammen og alle Gaardenes Huuse i een Ræd, hvilket paa de store Jorde i Myrðal og paa Sida, hvor 3, 6 til 9 Gaarde staae saaledes sammen, seer ud som en liden Bye af een Gade, siden mange Huuse høre til hver Gaard. Køe og Heste-Stalde staae paa somme Steder tæt bag ved Gaarden, og alle Huusene have tilforn været, og ere endnu, paa nogle saa Steder, omgivne med en saa kaldet Husagard, da Grunden som Huusene staae paa, tillige med Glædet, eller Gaden foran, udgjør en ordentlig Firkant. Huusenes Tag, især paa Sida, Mædalland, Alptaver og Skaptatunger, er gjort af det vilde Korn-Halm, ligesom man seer i andre Lande, hvorfra disse Folk have lært denne Maade at tække paa, for at spare Jordbøveren. Uden for Gaarden ere her visse Huuse, som ikke bruges paa andre Steder,

der, nemlig Høeladen, Dyrngen, en Part af Laden for sig selv, hvor det afstærkede vilde Korn glemmes, og Sofnhuuset, hvor det tørres, m. v. Jldhuuset, eller Kioffenet, staaer her ikke inde iblandt de andre Huuse, som paa alle andre Steder, men uden for, efter den ældste Maade, for at være nogenlunde sikker i paakommende Jidsvælde. Skorsteenen eller Arnstedet er her ogsaa indrettet efter den gamle Maade, og bødre end sædvanlig; thi ellers i Jsland antænder man Jlden, alene imellem 3de firkantede Stene, med et Røghull af Bredder paa Taget oven over. Men øster paa haver Jldstedet Form af en Døn, med en Rist i Midten, og derunder et Trækthull foran og Rum for Asken. Grunden, og Skorsteenen oven paa, er lagt af flade Hælder, og en Røghat af Bredder oven over. Huusene ere ellers kun middelmaadig store, dog best bygte paa Siden og i Fliotsdalen. Man viser ældgamle Bygninger paa 3 Steder, og deriblandt paa Sandsfell og Eiinefell i Dræferne, hvilke skal have staaet fra det 11 Hundrede-Aar: men endskiønt disse Huuse ere større end sædvanlig, og deres Tømmer den gamle Rødegran, saa ere de dog aldrig saa gamle, men vist nok nogle Gange ombygte. Paa Balthiofsestad-Præstegaard, i Mule-Eyssel, vises endnu en Skæale eller stor Bygning, som baade er langt større og ældre end sædvanligt, dog siensynlig ombyggt i nyere Tider.

§. 811.

Spiisen og Madens Tillavning kommer meest overens med Spiisen og Madens Tillavning, som overalt er brugeligt. De Levnetsmidler, som Østerland det desuden frembringer af Bærte-Riget, ere Angelik-Rodder og Brændsel. Emaare (§. 803. og 804.), samt af Dyr-Riget tørrede Flynder, hvilke Bonets og Hornesfjordens Indbyggere bruge, i Stedet for Stof.

Stokfisk, til Vinterkost. Paa Siden, og i de tilgrændsende Egne der vesten for, bruges det vilde Korn. Østerlandets Indvaanere ere ellers meget sparsomme med Kornvarer; de bruge ei heller Sissevarer saa stærkt, uden paa saa Steder ved Søekanten. Den fornemste Gode give deres Kreature. Gaarene falde her paa mange Steder meget seede, og Køerne malke godt af det kraftige Græs. De roge, og tildeels tørre deres Kød uden Salt. Af Mælken lave de Øste i Mængde, og Skior, af hvilken sidste Det de paa Siden og i Myrdalen siges især at være store Elebhavere. Den Kunst at gjøre gode Øste, kan ellers regnes blandt de forglemte i Island, hvor man i forrige Tider lavede saa stor en Mængde, at man nu ei vil troe det; thi denne Mad, tillige med Skioret, udgjorde i den Tid ligesaa stor en Deel af Oplandets Levnersmidler, som Torsfiskten nuomstunder; ja naar man betragter de Tiders Folkesmængde, (uagtet de brugte ogsaa Kødmad meget meer, end i disse Tider), har Skioret og Østen udgjort hos dem en endnu meget større Deel. Paa Østerlandet findes dog Fruentimmere, der kunne lave taalelige Øste, som ei ere saa haarde, seie og tørre, som de Islandiske ellers pleie at være. fattige Folk lave Deina:String: de faaage enten i Vand eller Balde Deen og Knogler af Hornqvæg, Saar og Torsf, hvert Slags for sig, til Beene blive mere, da denne Mad sættes hen for at giæres og blive suur, og spiises siden om Vinteren med Mælk eller Fløter (Graademælk) til. Brændsel af Torv falder paa mange Steder, meest i Mule:Syssel; men paa andre Steder har man ikke andet end Røffeler, det er Stykker af Fod eller tørret Møg, som har ligget til Gødsel paa Tuunet Vinteren over, og hvorefter den største Deel af Saften er udtoet og trukken i Jorden. Denne Maade er selvsig langt nyttigere for Landmanden,

manden, end hin med Baar-Klningen, som ikke bliver nær saa meget udblødt (§ 605.). Dog foreges ikke Græs og Bærte-Jorden ved nogen af Deelene, hvilket og ikke behøves, hvor den er dyb nok. Hvor den er tynd, blive altsaa begge Maader utienlige, og derfor bedst at knuse det udtøede tørre Læd, og stroe Stroet over Marken; hvilken sidste Udfærd ogsaa er giængs paa mange Steder i Island. Køkkeler brænde godt og uden al Stank.

§. 812.

Om Indvåanernes almindelige Arbeide falder ikke meget Almindeligt Nyt at anføre paa dette Sted. Paa Langenæs eller den nordligste Arbeide. Deel af Mule-Spyssel passes, foruden det sædvanlige Land-Arbeide om Sommeren, meest paa Fiskerie og Sælhundefangst, ved alle Leiligheder. Saakalle fanges ogsaa i Mule-Spyssel, samt Foreller i de ferske Søer og Flode. Paa nogle Steder, hvor Svaner boe paa Fjældene, jage Indbyggere efter dem i Augusti Maaned, og samle desuden det første Kuld af deres Eg om Foraaret. Man bruger her Lodliner til at fiske Torst, og især Jser eller Kollier; ja det artigste er, at de der boe nær ved Lagårflot, bruge samme Fisker-Needskab der, for at fange Foreller, Ørreder o. d. En Udfærd, som er ubekjendt andensteds i Landet; Fiskerne ligge ogsaa, med deres Baade, ude paa Floden, og fiske med Angelsnøre, ligesom paa Havet. Slynderfangsten drives ingensteds i Island paa den Maade, som i Lon og Hornfiorden, hvortil Kystens Velgigheds har givet Anledning, i det Søen er stille inden for de lange Sandbanker ved Hornene (§. 765.), og Vandet ikke dybt. Der løber ind, igiennem den Abning i Banken, som Elvene have gjort til deres Udfart, en Mængde Slyndre, af den bekjendte Art, Plevronectes, oculis a dextra, dentibus obtusis, squamis asperis &c.

M m m m

(§. 528.

(§. 528. 10), hvilken opholder sig her inde heele Foraaret og ud paa Sommeren. Om Ebbetiden, da Vandet er ikke dybere end 1, 2 til 4 Fod, samles baade Mandfolk og Fruentimmer ned til Stranden, da de kunne vade langs og tværs, og trække deres Slyndregarn ubehindret paa den jævne Grund. Gangsten samles, beregnes og udmaales i Velger, det er, heele astrukne Kalvestind, som Indvaanerne bereede og have ved Haanden til samme Brug. En Bælg rummer 200 Stykker middelmaadige Slyndre, thi de falde oftest kun smaa paa disse Kyster. Saadan en Bælg Slyndre holdes dog for lige saa god, som 6 store Torste. Gangsten drives ikke af hver Mand eller Familie for sig, men med samlede Kræfter, og holdes for god, naar der kan komme 1 Bælg paa hver Lod; og i det heieste kan man faae 2 i en Fiære. Disse smaa Fiske tørres da, indpakkes siden i Forraadshuuse til Vinteren, og spises som Torst, med Smør til. Sorellesfangsten kunde her indrettes meget bæder. Af Torst fanges her kun lidt, undtagen den vestlige Deel af Hornefiorden, hvor man ogsaa faaer Haakaller. I Bonet Osten for Hornet falder ikke saa stor Mængde af Slyndre; men de ere større end hine vesten for. I Dybevaag, kort fra Bersefiords Havn, fanges ogsaa noget. Af Vildgaasfangst har man noget paa Breedemark-Sand, i Augusti Maaned, og det baade af unge og gamle Fugle; thi disse siges at lægge Æg bag ved Breedemarks-Sokelen, og sælde Fiædre i Augusti Maaned. De lobe saa stærkt, at man skal have raske Heste til at hente dem ind: Vildgaasene ere meget sky og varsomme; de vide deres Svaghed, og begynde at lobe, det første de vine deres Jægere langt borte. Torstefangst paa Havet drive Dræfingerne fra Ingolfshofde om Foraaret og Sommeren, iligemaade de fra Myrdalen, og for disse sidste slaarer

Fang:

Fangsten bøder ind de fleeste Gange. Derimod have de første ved Skeideraasand, og især de fra Siden, ved den store Sandstrækning der uden for, den Fordeel, at de ofte faae der store Salbund af Udsale-Arten; dog er det først for nogle Aar siden, at man har der mærket til disse Dyr. Indbyggerne drage derhen ved Advents-Tidder, naar det frejser stærkt, ellers kunne de ikke komme der frem, for den usikre og farlige Grund, allermindst med Heste; det samme gielder om Drivetommer, hvilket de ikke kunne hente, uden naar Sandet er tilfruset. Fra Myrdalen søge Folk ogsaa til Bestmann-De, hvor den beste Forskafangst falder. At Indvaanerne paa disse Steder have draget i stor Mængde til Siædebag, for at søge Angelik-Rødde, dog meest for at fiske i færste Søer, derom er talet i Forveien.

Om det vilde Korn.

§. 813.

Denne Sag er mange steder bleven bekjendt, endog i andre Lande. Vi have og allerede givet tilkiende (§. 490, 590, 726, 729 og 777.), hvad for en Væxt dette vilde Korn er, og der er ingen Tvivl om, at det jo er allevegne i Landet, under det Navn Melur, een og samme Art. Den alviise gode Gud haver pæfignet de sorgelige tørre Sand-Egne med denne nyttige Plante, hvilken ogsaa Indvaanerne ansee for en stor Guds Gave. Men naar vi nu forælle, hvor meget de høste af denne Væxt, vil det Arbeide synes meget kummerligt for Fremmede. Man klager over, hvor lidet Korn der indhøstes paa Færoe (see *Debes* Cap. 2. p. m. 106.), og det er dog anseeligt, imod dette at regne; men det er og sandt, at Østlænderne hverken saae eller plante deres vilde Korn. I Augusti Maaned, naar Stikken, tillige med Aæne, er blegned og moden, staaes

Omgangen
med samme.

den op med Sigd eller Segel, et godt Stykke oven for Noden, saa at Rodbladene staae heele, maafee for at fiinde Saaret; thi Indbyggerne paastaae, at Urten vover desto bader op igien; dog skionne vi ikke, at denne Varsomhed har meget at sige. Stilkene samles først i Knipper, hvoraf 20 gaae i et Kærse eller Næg, og af 3 Kiærver bindes en Vagge eller Bylt, hvilken passes saa stor; at en Hest kan bære een paa hver Side. Efterat Kornet er hiemsfort og tørret, tørstes det, da Axene slaaes fra Straaet, og dette kaldes at dusta. Kornet samles derpaa ind i Dyngen, hvor det forvores til Vinteren. Halmen giemmes i Læden for sig selv, eller og bruges strax til Fag. Om Vinteren behandles dette Korn fremdeles paa følgende Maade. Først bær man noget af samme ind i Sofnhuuset, et lidet Udhuus eller Hytte af Steen, for at tørre det; thi det er at mærke, at Kiærnen i dette Slags Korn bliver stælden eller aldrig ret haard; den er og meget maver eller tynd, og uden paa lidet grønagtig. I den eene Ende af Sofnhuuset er et firkanter breedt Jdsted, og derover sætter man en Rist af rundagtige Lægter, der ere faste i Træet, og ligge 2 til 3 Fomme langt fra hinanden. Derpaa lægges Halm i Kvarteer tykt, og dette Læg kaldes Flaatta og Flaattu-Melur; men der uden om, og ovenpaa, lægges igien sammensnoet Halm, som kaldes Gridkur, og tiener til Bredder paa Risten. Og her styrtes da Kornet ind og ned paa Flaatten, saa tykt, som Gridkerne ere høie til. Derpaa tændes Jleden an neden under, af Brændsel, som ikke blusser høit, men giver dog stærk Hæede. Man holder ved med denne Jld, til Kornet er blevet saa haardt, at det kan males, da det tages op af Risten, hvilken egentlig kaldes Sofu, og derpaa vindfås eller kastes. Det males paa Haandkværne, som Indvaanerne selv udhugge og danne

af

af Graumsteen, der er haard, som den Rhinlandske, jærnhullet og ikke skor. Ved det Sotuhuuse gjerne bygges lave, og Jiden kan let blive løs, gaae de tidt i Brand; hvorfor de altid staae et Stykke fra Gaarden. Naar dette Korn er malet, er det temmelig fiint, og seer godt ud, dog lidet bleegagtigt, hvilket kommer deraf, at det er ligesom giennembaget, og derhos gjerne noget røget. Deres for har og al den Mad, Brød, Grød og andet, som laves deraf, en egen, endskiont sød Smag, der meest signer Maltets, dog er den ikke saa ubehagelig. Foruden Grød og Gladbød, laves deraf en Dei, med suur Balde, hvilken kaldes Tisina, som er et fremmed Navn. Samme Dei bliver ikke kaagt, uden saavidt Kornet er blevet bagt i Sotuhuuset, men spises saaledes i Flojter eller Mælk; især gives Arbeidsfolk en Klump deraf om Morgen, da de ere fornoiede, og sige, at de kunne tære derpaa hele Dagen. Det giver og Hyrderne god og bestandig Varme om Vinteren, da de maae være ude i Blæst og skarp Kulde, for at passe paa Saarene. Al denne Omgang, saa einfoldig og slet som den er, maae dog Indvaanerne have faaet fra deres Forfædre, og disse igjen rimeligst fra Norge, siden Færdingernes Omgang med Kornet hos dem er omtrent den samme (see Agerdykn. Beskr. paa Færoe 1763). I blandt alt det Arbeide, som Islanderne bruge og nares ved, kan intet være langsommere og give mindre Ferdeel end dette, og viise de deri en særdeles Vindstibeligbed. Naar de af 80 Daggør eller 40 Hestes Byrder kunne faae 1 Tonde Meel, ere de meget vel fornøiede; thi det er ikke almindeligt, at treffe saa god Kiærne; mange Bønder paa disse Steder noies dog med hvad de saaledes kunne avle, og kjøbe intet Meel udenlands fra; thi de have en lang og besværlig Dei, at hente det, til Ørebæcks Havn. Deres selvvoorne

Korn er ogsaa langt finere og drogere, end det fremmede. I de Tilforladel. Efterr. om Jøsland (p. 298.) siges, at de maae bage Kornet, fordi de have ingen gode Kværner; men den rette Mærslag, hvorfors de bage det, er nyelig bekrævet, og den samme nodor og Færsingerne til at bage deres Byg, forend det kan males, skiont det ikke er vildt Korn (see *L. Debes* p. 237.). Ikke alene de Bygde og Kirkesogne, som ligge imellem Myrdalsfand og Lomegnupsfand, bruge denne Kornart; men andre Nærboende og nogle fornemme Folk længer borte, bestille noget deraf, for at spiise for Lyst, som en rar Afgrøde af deres eget Land. Naar der kommer stærkt Sandfog, eller maadeligt Afkast fra Jisbiærgene over disse Kornlande, da faaer Melen ligesom nyt Liv derved, og baade voper desto høiere og giver bedre Kiærne.

§. 814.

Kunst-Arbej-
de.

Solv- Messing- og Jærn-Arbeide gieres her paa mange Steder, dog kun af visse Kunstnere, men langt bedre, end man skulde vente af dem, der ikke have havt nogen anden Belviisning, end Naturens Drift, og deres ukunstede Fornæst. I Mule-Syssel have nogle, endog fornemme Folk, gjort Haandværk deraf; man seer og ofte paa Altsihinget alleslags Solv- Messing- og Jærn-Arbeide, often og norden fra (§. 735.), som for en vis Priis holdes tilfals for hjem der vil kiøbe. I Serdecleshed traf vi en Kunstner, som vi maatte rose, navnlig Einer, boende paa Skaptesell, en elters hovist og skikkelig Mand. Han var med megen Umage, uden al Underretning, kommen paa at giøre Gliner, Lobet af stobt Messing, 3 God langt, men Laasen, som sædvanlig, af Jærn- og Staal-Arbeide: han tilstod selv, at dette sidste Stykke havde været det besværligste for ham at bringe til Fuldkommenhed. Vi betragtede hans

hans Bærteoi, som han ogsaa selv havde gjort, baade til disse og andre Kunststykker, og ligeledes saae vi paa flere end eet Sted disse Bøsser, med hvilke hans Naboer vare forsynede, og vi vare og Vidner til, at de vare meget gode at skyde med. Benævnte Bønde var en god Skiotte, og brugte dem til at skyde Ræve, samt de store Sælhund, og Grenlandiske Bjørne, som komme der til Kysten med Hav-Zisen. Træ-Arbejde, baade Kar og andet, forfærdiges ogsaa til Fornødenhed øster paa. Liens kaldes en Træsadel, som ikke trækkes over med Skind; men gøres ellers glat og trofast; Ordet er ældgammelt, og alle vegne gaaet af Brug. Saadanne Sadler bruges heller ingensteds uden paa Østerlandet, hvor Bønderne selv forfærdige dem. Heste-Tøiet i Skastefjelds-Eggsel er ogsaa noget besynderligt. Foruden at Seeler og Tøo gøres af beredte Sælhundestind, hvilket er langt tientligere at bruge her i Landet, baade i Regnvær og stærk Værke, end noget andet Seeleroi, saa være og Jndvaanerne Dynner, baade til deres Liener og Kloster Sadler, af Melens Rodtrævler (*Radiculæ Arundinis Secalis*), hvilke ere baade lange og seie. Disse Dynner søges meget af andre, men Jndvaanerne have ikke mange til at overlade; thi de maa ikke ødelægge deres Kornlande, for at grave disse Trævler op: de søge kun derefter hvor Urten er udgaaet, da bemældte Trævler kunne ligge i Sandet mange Aar efter, uden at raadne. Her er da den tredie Nytte, som Planten Melur skaffer dem, foruden Kornet, og Halmen til Tagene. Disse Dynner have deri Fortrin for de andre meest brugelige (§. 32. c og §. 64), at de ere ikke Hestene til nogen Byrde; de holde og godt, trække ikke Fugtlighed til sig, og forraadne ikke.

Tiidsfordriv,
Tiids = Reg-
ning, Maa-
den at reise
paa, m. m.

Alf Tiidsfordriv vilde Østerlandets Indvaanere ikke stort at sige; de ere ikke lystige, men snarere tungsinde. De gamle Historier tiene dem meest til Fornoielse, og dette hjælper for en Deel til Sprogets Vedligeholdelse. Man horer endog de ringeste Bønder undertiden at tale i den Stil, som bruges i disse Historier, men man beleer dem derfor, naar de komme til Sønderlandet. Glimer, Bretspil, Skak, Kort, Glæder, og deslige Lystige heber, ere rare hos dem (§. 65 til 71.), dog bruges de iblandt. I at beregne Tiiden (§. 58 til 63.) ere Østlænderne meget vel øvede. Deres Maade at reise paa er omtrent den samme, som andensheds, aleene at de ikke drive deres Arbeids-Heste, men lode dem ved Toieler, den eene hastet til den anden. Af disse Toieler bindes den eene Ende med et uldent Fov om Underkæften, saa at Tungen er løs i Munden, og den anden Ende gøres fast, enten i Klofts Gadelen, eller knyttes i Rumpeskaaret paa den Hest, som gaaer foran. Af Zeperie veed man nuomstunder intet at sige; men om Epogelser horer man undertiden. De Bønder og Indsprudende Jøfker og Graunstrækninger udgives især, efter den gamle Meening, for Opholdssteder for Trold og onde Aander, og der fortælles at være fleete adskillige forunderlige Tildragelser, ikke aleene tilforn, men og i disse Tiider. Det er siensynligt, at de fleste af disse berøe aleene paa Overtroe og Indbildninger. Dog indløbe og deriblandt nogle saadanne Omstændigheder og Begivenheder, som disse Tiiders Philosophi skulde have ondt ved at udvikle og forklare. Disse kunde udgiøre en temmelig artig Samling af smaa Historier; men da dette Slags Tildragelser ikke bør fortælles uden særdeles Børnsomhed, Undersøgning, og Ball, saa ville vi ikke opholde os dermed.

med. Alt slikt oploses lettest, ved at sige ligesom at det er opdigtet; men Spørgsmaalet er kun, om det ogsaa er nok til at afgjøre Sagen.

Dyrene.

§. 816.

Angaaende de fireføddede Dyr er alene følgende at mærke: De fireføddede.
a) Hestene paa Osterlandet ere muntre, stærke, gode Gangere og holde længe ud endog det strengeste Arbeide. De ligne meest de Norske, og falde gierne smaa, men dog ingensteds i Island saa smaa som de Sællandske Vonder-Heste, ikke engang Væntriøninger, hvilke dog ere meget rare paa denne Kant. Vatna-Hestene kaldes i Skafthælds-Eyssel de, som bruges til at forsøge Elvenes foranderlige Badstæder. Naar de komme i Kviksand, falde de paa Knæene, saa de ikke kunne synke, da Vandet løfter Bugen op; og hvis de skulle svømme i en stridig Strøm, lægge de sig paa Siden, Ryggen vendt imod Strømmen, som derved løber under Bugen, hvorfor de kunne desto bedre arbeide imod den med Joderne. Naar de fornemme til Grund, skyde de dem høit i Været, og et godt Stykke frem, for at vinde desto meer, og hvis de mærke, at Grunden er alt for usikker, vende de derfra, og søge en anden Dei, da Rytteren maa lade dem raade. Det er farligt, for uvante Menneſker, at ride paa disse Heste; thi man kan snart falde af og blive borte. Hvorimod de, som ere vant til slikt, synes at det er kun Spøg; ja somme Reisende, ikke alene oster paa, men og paa andre Steder, gjøre Haandværk af at lade deres Heste svømme med dem over Elve og Bliiger ved Søekanten, hvor Hesten kan svømme langt bæder, end i det ferske Vand, hvilket er baade

Rnn nn

de

de tyndere og lettere. Naar de komme i Sæde, og Deien er for lang eller Hesten vil trættés, springe de af, og holde med den ene Haand enten om Mannen eller i Sadelgiorden, til de komme til Landet. Mangen en gjør dog alt for meget heraf, og sætter derved Livet til. b) Røerne ere af middelmaadig Størrelse, men make godt. 3 Mule-Syssel har man mistet meget af Hornqvæg, især døde næsten Halvparten boet Aar 1742. Paa Ketilstad, en Gaard i Skotsdals Herred, har man glerne set Lykke med Kalve, fordi de saae Hovedsot (S. 321. a), og Eiermanden, en Sysselmand, som meget havde forbedret dette Sted, havde ikke, uagtet hans gode Erfaring i Landets Huusholdning, kunnet finde noget Raad derfor, men altid maattet forskrive Kalve fra andre Steder, og slagte sine egne. Foderet eller Græsset kan ikke være Marsag dertil; men maaskee Tyrene, siden Sygdommen ofte forplantes, og mærkes dog ikke synderlig hos det gamle Dvæg, naar den ikke faaer Overhaand hos det unge. Nogen besynderlig Omgang med de uvesodde Kalve, og deres Opklækning, kan ogsaa være Marsag til denne Syge. Ellers ere Indvaanerne her ikke endnu komne i forrige Stand, siden de sidste haarde Aar. c) Om Gaarene er dette blevet anmærket i Skafthjælds-Syssel, hvor de ligge inde i Huuser om Natten, at Lammiene og de unge eller sinde Gaar indtage den inderste Plads, men Bødrene og de store ligge yderst. Siaariborg, d. e. Færborg, kaldes her en af Jord og Steen opbygget Pyramide, som er rund og huul inden i, med en liden Dor etsteds neder ved Grunden, saa stor, at et Menneske kan krybe derind, og en Eyre eller Nabning i Toppen. Storrøisen er ulige, Hviden 4 til 6 Alne. Indbyggerne paa Siden, og paa flere Steder, lade deres Faar ligge her inde i Stedet for Huuse, fornemmelig dem, som

som man ikke giver Foder om Vinteren; og de trives langt bedre paa denne Maade. Den underjordiske Jid har opført paa Eiden nogle saadanne Bygninger, bestaaende af smættet Steen, huile inden i; naar de skulle bruges til Vaar, brækker man Hull paa dem, for at faae en Indgang, og efter dem have uden Tvil Indbyggere dannet deres andre saakaldte Hjaarborger. I denne Egn, fort fra Holt, seer man og en rundagtig Stotte af smættet Steen, 12 God hoi og 5 God tyk. d) Geeder kunde holdes med Fordeel paa mange Steder i Mule-Eyssel. Paa Ketilstad ere og nogle. e) Biserne komme tidt til Østerlandet med Hav-Jissen, og undertiden i alt for stor Mængde. Det skeer kun sjælden, at de anfaalde vorne Menneſker, uden de ere meget hungrige, eller i Forveien opirrede; men paa Qvæget giøre de stor Skade. f) Sælhunde, af de almindeligste og bekiendte Arter, ere her, som andensteds. Derimod af Rostunger (§. 653.) har man her seet flere end paa andre Steder; især kom en usædvanlig Mængde af dem til Østfiordene i Aaret 1708.

§. 817.

Alf Sugle ere her at mærke: a) Svaner. Den største Fuglene. Mængde af disse opholder sig paa Fjældene, i den nordlige Part af Mule-Eyssel, hvorfra de Nærboende hente deres Æg. b) Vildgaaſe. Sangsten paa Breedemarkshand er allerede nævnt; men det rareste er, som dog med Sandhed berettes, at Vildgaaſene lægge Æg og klække Unger ud i de hoiſe Fjælde ober Fjotisdals-Herred, hvor intet Menneſke kan komme til. c) Margiaſe (§. 667.) eller Hjorta sees aarlig i Mule-Eyssel, og siges at lægge Æg paa ubeſtigelige Klipper oppe til Fjælds. d) Om den hvide Maage (§. 674. c og 744.) er for blevet mældet, som noget ganske nyt, at

den lægger Æg oven paa Vigur-Den i Græsset (§. 765.); men det er ligesaa besynderligt, at den endog flyver nogle Meile fra Havet, op over Breedemarksand og Jisbiærgene, til et steilt Fjæld, som deraf kaldes Maadebygd, og bygger der sit Næde. Deien derhen over Breedemarks-Fjælen skal være meget farlig, dog have nogle fra Hornsfjorden forsøgt den i disse Tider, og ere komne tilbage med friske Æg. c) Skumen, som af Skribenterne, med et urigtigt Navn, kaldes Skuen og Skua, er *Larus fuscus, macula alarum alba*, og *Catarrhactes Auctorum*, og findes beskreven i *Hills Ornithologie*. Den er bekjendt overalt i Island, endskjønt ikke allevegne lige meget afholden. Paa Nord- og Vester-Landet holdes den for en uskyldig hellig Fugl, fordi den er meget tam paa Havet, nærmer sig til Baadene, og tager imod hvad Fiskerne give ham, af allehaande Madvarer. Paa Østerlandet er den allermest bekjendt. De Færende kalde den Vestmannsøs Søns, fordi den er i Mængde paa Vestmannø, og vilser sig der meget tam og stille; men paa Østerlandets Sanderfener, især Skeideraas- og Breedemarks-Sand, fører den sig ganske anderledes op. Her anses den for en grum og dristig Røvfugl, fordi den forfølger de Reisende hæftig, samt slaar Hunde og andre Dyr saaledes, at de strige ynkelig, ja undertiden besvime. Aarsagen til denne Skumens Opførsel er, at den har paa disse Steder sine Æg og Unger, hvilke den forsvarer med megen Dristighed, hvorfor de Narboende forsyne dem med Kieppe, naar de gaae ud, for at tage dens Æg og Unger. Om dens Dristighed paa Færøe, fortæller *Debes* (Fær. Ref. p. 131.) det samme, og at Indbyggerne der dræbe den med en Kniv, paa den samme Maade, som dette skeer i Island med Kløven og Tærnen (§. 665.). At den kaldes i Norge *Kav-Ørn*,
for di

fordi den dukker under Vandet, kan ikke bestaae med dens Huus-
holdning i Island, hvor den, som andre Maage-Arter, kan ikke
flyde sig ned l nger end til Bingerne, og skient den salder heit fra
Lusten, kan den dog ikke komme ganske ned i Vandet, men flyder
strax op igjen. f) S ns have B nderne paa hver Gaard i Dr fer-
ne. De ere alle sorte af Farve, og kiendelig mindre end s dvanlig;
men meget frugtbare, naagter de ikke saae Korn, men maa n re sig
af smaa Orme og M ddiker om Sommeren. Om Vinteren saae
de smaaakk t Hoe, m nger i S oyter og M lk. Det var nyttigt,
om fleere i Landet lagde dem efter denne Yngel.

§. 818.

Om S sse, G ddyr og Insecter er her aleene folgende at S sse, Hau-
m lde: a) T r k driver undertiden op paa Osterlandet, is r paa ^{dyr og Inse-}cer.
L ngent s og i Skaftef lls-Syssel, hvor de Br ndinger, som her
gaae overalt, fortumle og slaae den ihjel. Indbyggernes samle den,
naar den findes fersk og ubesk diget. b) Aal findes mangesteds,
og kunde saaes st rst og i temmelig M ngde i Hornesfjorden; men
Indv anerne her, ligesom paa andre Steder, ere bange for den
(§. 685. a). c) S akallens store Indv alde (intestina crassa) an-
vende nogle af Ostfjordenes Beboere til Nytte: de bl se dem op,
og bruge dem, i Stedet for Boier, til M rke paa deres Lodliner
ude i Havet. d) Regn-Ormur, efter Ordet Regn-Orm, er et
Insect, som kaldes saaledes, fordi det kommer paa Osterlandet med
st rk Bl st og Regn; det er etslags Raal-Orm (Eruca); men vi
have aldrig kundet saae det i H nder. Det gior her ofte stor Sk -
de; is r fort rede det 1701 Gr sset over heele Skaftef lls-Syssel
og K ngerv lle paa S nderlandet. Aaret derefter giorde det lige-
saa paa Osterlandet. Det blev det forste Aar en Finger tyk.

Naturens Mærkværdigheder.

§. 819.

Ødelagte Egne
og Gaarde.
be.

Den Ødelæggelse, som Jisbiærgene have anrettet paa Østerlandet, er forfærdelig; vi have og fortaalt meget dergom ved adskillige Leiligheder i dette Stykke. Her ville vi i Særdeleshed viise, hvilke tilforn beboede Steder og Landskaber nu ere blevene til usfrugtbare Ørkener; meest er det skeet af samme Aarsag; dog giver man tildeels i Mule-Syssel haarde Aaringer Skyld, i Hensigt til de Steder oven for Langenæs, og Fiordene imellem samme og Bapnesfiord. Rastkeldsdal, et heelt Bygdelaaf af 20 Gaarde (see *Brandkroffa-Pått*), er for lang Tiid siden øde; ligeledes Njødredalen og tilgrændsende Øræfer; men alle disse Steder kunde beboes igien. Hvad Jlotsdals-Herred angaaer, skal Grunden der være bleven fordærvet, deels af Elvenes Oversvømmelse, deels og af Skredfald. Livindsdal ved Ketilstadhals, som har været beboet, er af denne sidste Aarsag øde. Men de fordærvede Egne i Skaptæfells-Syssel ere af større Betydning, og staae ikke til at forbedre igien, nogle faa undtagne. Skogey kaldes et Stykke Land i Hornesfiorden ved Væsterhorn, hvor 18 Gaarde siges at have staaet; og siden Grunden endnu giver noget Græs, skönt den er kun lidet frugtbar, og Jøkkelen har ikke gjort her Skade, maae nogen Forsømmelse have her havt Skylden. De andre ødelagte Gaarde og Jorde i Hornesfiorden staae ikke til Redning; ikke heller Breedemarken, uden der kunde opkomme saadan en Vandflod og Jidsprudning, at den lave Jøkel blev ført ud i Havet, hvilket kunde skee. Da vi reisde her forbi, saae vi tydelige Beviiser paa, at her havde været Jordstøer og Skov i forrige Tiider; thi Vandet førde daglig ud fra Jøke-

Jökulens Grundvolde tykke Klumper af Torv, og store Stykker Vike-Træ, hvoraf nogle være 1 Fod tykke. Det smukke Stykke Jord, der ligger norden for Jisen, er og en Levning af Bredemarken. Da vi drog tilbage over Bredemarksand, førde vor Vejviiser os til Vesterkanten af Jisen, hvor Kirken haver staaet: men vi saae intet, uden tæt ved Jisen, nogle Klumper af gammel roget grøn Jord, og en Hoi af opkastede Steene. Derimod fortaalte de ældste Mænd, at et Stykke af Tuunet og Kirkens Bæge havde endda været tilovers for 90 Aar siden. Uden for Kirkedøren laae en stor firkantet libet aflag Hælde, hvorunder en besvoint tapper Mand, ved Navn Kaare Solmundsen, som levede og boede her først i det 11. Hundrede Aar (see Riats-Saga og Landnama-Saga p. 169.), skulde ligge begravet. Endskiont Stedet var ødelagt, holdte dog de Reisende, som drog her forbi, det at være deres Pligt, at reense denne Liigsteen fra det Grus og Ureentighed, som Jökulen satte derpaa. Paa denne vidtloftige Strækning oven og neden for Jisen, haver staaet en anseelig Bygd, endskiont man ikke veed hvor mange Gaarde. Derimod finder man om Øræferne, som tilforn kaldtes Litla-Gerad, at der have været 70 Jorde beboede, og som det synes, 3de Kirker, foruden Jökulfeldsdal bag ved Skafestæld, som havde et heelt Kirke-Sogn. Om Skeideraasands Bygd have vi intet udfortligt; thi det kan ikke just sees af Landnama-Saga (Part. 4. Cap. 11.), om denne Plads har været bygget eller beboet i de første Tiider, da det heele Landskab, som siden blev kaldet Litla-Gerad og nu Øræfe, kaldtes Ingolfshöfðahverfe, og Skeideraæn Jökulsaa. Derimod er det afgjort om Myrdalsand, og at Jordbrand har gjort der megen Skade, strax efter den første Beboelse, saa at Indbyggere

gerne maatte flygte derfra (see Landnama-Saga Part. 4. Cap. 11. og 12.). Den Tiid vi reisde over disse Steder, berettede de ældste Mænd, at deres Forældre havde fortaalt dem, at der i deres unge Aar havde endnu været 6 Gaarde tilovers paa Myrdalsland. Dierleishofde har maaskee været regnet med i dette Tal: der staaer og endnu nogle Hytter, beboede af en liden Familie. Solheimers sand har ogsaa haft byggeligt Græsland tilførn.

§. 820.

Uffe-Mister.

Da vi den 6te Octobr. vare paa Hjemreisen over Siden og Alptevær, paakom os om Aftenen en mørk Taage med stærkt Uffes fald, endskiont vi havde haft Solskinsvair om Dagen, og Lusten endnu var klar oven over, med nogen Blæst og Frost. Aften kom fra Katlegiaa, hvoraf vi sluttede, at den maatte sprude igien; endelig traf dog Vedsageren, i dette Mørke, paa Serjolsstad, en stor øde Gaard. Dagen efter var endog det ubehageligste Væir, som vi have erfarer; thi endskiont Solen skinnede klart oven over, var Taagen saa tyk, at vi ikke kunde see uden saa Skridt fra os. Den bestod af en rødagtig Uffe; og hvor denne kunde trænge igiennem i Kofferterne, blev alting sort; den trak sig endog giennem Klæderne, lige ind til Kroppen: Ansigterne bleve ganske sorte, og til Bets paa, at man maatte, enten man vilde eller ikke, tage en Deel deraf til sig tilligemed Lusten, da var alt det sort som man spyttede op. Høstene kunde hverken æde eller holde Vinene aabne; to af dem bleve blinde, ved det Vinene groede sammen, og der gik end og Materie i; tilsidst maatte vi flutte ind i de forladte Huuse. Dagen efter var Regn, og Taagen borte, da vi reisde over Myrdalsfjund, og de 3de nye Halve af Jokel-Fis, Gruus og Steene, som Katlegiaa havde flirket her ned næstafvigte Vinter; disse Fis-
rygge

rygge vare nu bleve lave, dog farlige nok at reise over, for Hüller-
nes Skyld imellem Jisshyfferne. Vi toge Veien videre frem over
Eyræa, som nævnes i Landnama-Saga, fordi der har været
Bygd imellem den og Alptevær i forrige Tider.

§. 821.

Vi vare Natten over paa Hofdebræka, et Kirkested østligst
i Myrdal, som er bleven nogle Gange ødelagt, og Gaarden tillige
med Kirken støttet høier op, og bygget der igien. Dette sidste skee
de efter Jidsprudningen 1661. Den næstfølgende, 1721, gjorde her
store Forandringer, især paa Havet, hvilket den paa nogle Milles
Længde har efterhaanden opfyldt med Vinpесand, Gruus og Steene.
Riærlingedal, vesten for Hofdebrecke, haver efter Indvaanernes
Beretning været en Fiord tilførn, og er bleven kaldet Riærlinges-
fiord; den nævnes i Landnama-Saga (Part. 4. Cap. 13. conf.
Part. 1. Cap. 6.); hvilken synes at bekræfte det samme. De ældste
Mænd kunne og erindre, at Havet for 60 Aar siden havde naaet
til Nabningen af denne Dal, og der var endda saa dybt Vand, at
man fiske med Meedefroge paa Klipperne. Om de steile Sand-
steen-Klipper, som frembringe det rare Salt (§. 801. c); og fra hvilke
man haver en Sandstrækning; en heel Mil lang, ud til Havet,
kunne endel endnu levende Folk huske, at Riærsgugle have opholdt
sig der, og Havets Belger spillet paa den nederste Deel af disse
Klipper. Følgelig haver Jisbiærgets Opsprudning 1721 gjort den-
ne store Forandring. Dette kom os dog ikke saa underligt for, da
vi betragtede Fjeld-Egnen oven for, især mellem Hofdebrecke og
Katlegiaa, hvis forfærdelige Nabning vi saae den 6te Octobr.; thi
den viiser sig som en stor Dal i Jokelen, hvor den begynder at hæl-
de, eller blive lavere, mod Østen. Oven for Nabningen rage nogle

Øst Land,
og Fjælde som
Belger.

Do o o

forre

forte Klipper op af Jisen, og til Siderne gaaer ogsaa en lang Klipperad nedad under Jældet. Neden for Nabningen har Naturen viist, i Jidens og Bændets sammenvirkende Magt, sin forfærdelige og hartad ubegribelige Styrke: der sees nemlig nedfaste mangfoldige Bjerge, det ene oven paa det andet, med dybe Kløfter eller Afgrunde imellem; hvilke Ruiner, om de skulde synes ved noget, see ud som et bruusende Hav; thi de opstude og kuldkaste de Bjerge ligge dog meest helgeviis, og de giennembrækkede Rønder, som Vandfoden, samt medfølgende Klipper og Jistykker, have aabnet sig, ned til den underliggende Egn, ere dog kiendelige, uagtet al denne Ontumling. Da vi betragtede disse Ting fra adskillige fordeelagtige Steder oven for Hofdebrecke, maatte vi lade det forfæt fare, at bellige Jældene paa denne sydlige Kant. Der var falden en Mængde Sneer natten for den 9 October, som gjorde Veien desuden besværlig; paa Nordsiden er derimod raadeligt og mindst Fare ved at bese Katlegiaa. Det var ellers ubegribeligt for os, hvorledes Hofdebrecke har dog kunnet bestaae, lige for og under Jisbiærget, saa at Grunden, med dens Klipper og Jord, er ikke reent bleven sloisset og bortført.

§. 822.

Småa Bække
blevne til store
Floder.

Alt småa Bække ere blevene til store Floder, er endnu en besynderlig Mærkværdighed paa Østerlandet. Indvaanerne vide at fortælle om een og anden Elv, at den er nu bleven større end tilspørn, ved een og anden Jid og Bændsprudning; men siden disse Bændsaide seer andre deres Rønder saa tidt, har man intet vist kunnet slutte, hvor meget de have voret. De sige og om Jokel-Elvene, naar de komme nær til og see deres Farve, som er sort og sæl, og mærke at Bændet er høit, samt at det fører rundagtige Jis-

Flum:

Flumper: Pat er hlaup i aarne; hvilket vil sige, at der er en bruisende Gang eller Flod i Elven; dette skeer tit og ofte hvert Sommer, uden nogen Orden, saavidt man veed, og uden at der mærkes nogen indvortes Bevægelse i Jisbiærgene; og dertil have vi været øiensynlige Vidner ved Nupsvandene. Men alt dette varer kun kort. Hvad derimod angaaer disse Elves vedvarende Tilvæxt, da høves derpaa to Exempler. Det første er Jökelsaa paa Solheimesand, eller Stank-Elven, som af Forstningen ifkun var en liden Bæk, men fik siden, ved Solheim-Jökels Nabning og Bevægelse, en betydelig nye Tilvæxt, oversvømmede det flade Land, og tog al Grønsværen bort, hvor Solheimesand nu er. Denne Tilvæxt, som er skeet henved Aar 900, fortælles som overnaturlig i Landnams-Saga (p. m. 208.). Efter den Tid har denne Bæk, som tilforn kaldtes Jufelæke, faaet Navn af Jökelsaa, som den og nu fører en Mængde Vand, og regnes iblandt de store Elve (§. 788. c). Det andet Exempel giver Tofelæk, østen paa Siden, som var kun en liden Bæk, men er siden bleven til en stor Flod, kaldet Almanna-Sliot (se Landnama-Saga p. 142.). Dette skeede kort efter at Landet blev besat med Folk, ved det at Side-Jökelen (§. 778.) kom i Gang og fik Nabning. Nu bliver da Spørgsmaal, hvoraf disse Vandfaldes hastige Tilvæxt, og siden deres bestandige Beddighedselse kommer? Vi maae heri nøies med at gjætte. Men i Følge den foranførte Formodning om Jökernes Oprindelse i Jsland, og i Særdeleshed om de Fld- og Vand-sprudende Jisbiærges Samfund med Havet (§. 772. & seq.), bliver den Marsag lettest at begribe, at hvis Havet ogsaa gjør sit til de Oversvømmelser, som skee ved Jökernes Opsprudninger, saa kan det ligeledes forskaffe Vand nok til Jök-Elvens Underholdning.

§. 823.

Blod i Hæ-
vet.

I Aaret 1638, vidst paa hvilken Aarets Tiid, mærkede Fiskerne en Mængde af Blod i Havet uden for Østfiordene, som drev ind til Landet, i aflange Flekker eller Strimler; dette anføres her alene for at holde det imod det ovenstrevne (§. 756. c). Naar ellers Hvalsfiskene slaaes i Havet, og allerhelst naar Spekhuggerne i 1000 Tal forfølge de store tandløse Hvale, og rive dem i Stykker, kan Søen ofte blive rød eller blodig paa nogle Milles Længde; og her har man da endnu en anden Aarsag til den røde Farve i Havet.

Mærkværdigheder om Indbyggerne.

§. 824.

Østerlandets
første Beboer:
se.

Denne Part af Island blev tiidlig besat med Folk, fordi Rykten laae lige for og nærmest for dem, der søgte hid fra Norge. Der er ellers mærkværdigt, som baade Ane Frode og Landnama-Saga give os Bished om, at Island, og især denne Kyst, var beboet til forn af etslags Folk, som kaldtes Papar, og vare Christne. Ane slutter, at de have været fra Irland, af Boger og andre Ting med Irlandske Ord og Characterer, som disse Folk efterlode dem, da de flygtede bort, thi de vilde ikke boe hos Hedningerne. Sølgelig maae de have havt Skibe hos sig, og maafee drevet Fiskerie. Men enten de nu have været fra Irland, eller en Levning af det gamle Britiske Folk, synes det rimeligt, at de ældgamle fremmede Ord, som forekomme endnu i Østlændernes Mundart (§. 809.), ere etslags Levning af deres Sprog; men desuden fløttede og adskillige Irlandsdere til Island, i de første Tiider, og forplantede der deres Afkom. Hine forstbemældte ere ventelig blevne kaldte Paper, enten af de Præster, som de have havt hos dem, eller af Paven, som Nordmandene

mændene, maaffee have tænkt at de troede paa. Papske, et Bygdelag i Hornesford, og Papske, have faaet Navn af dem. Deres fornemste Sæde var Kirkebø paa Siden, hvor Hedninger ikke kunde boe, fordi de troede at Stedet var saa helligt, at de strax bleve syge og døde (Landnama: Saga p. 143.). Een af Landets første Indtagere, som var en Christen, ved Navn Ketil Gistke, byggede her en Kirke, som maaffee haver været den første i Landet (§. 761. a).

§. 825.

Af Alderdoms Levninger ville vi mærke følgende. a) **Ulfstots-Laug**, den første Islandske Lov, som endnu for en stor Deel findes indført i Graagaasen, havde sin Oprindelse fra Østerlandet, hvor Laugmand Ulfstot boede, nemlig i Lønet, mellem Øster- og Vester-Horn. Dette steds henved Aar 928, hvorpaa Althinget strax blev stiftet (§. 111.). b) **Gamle Gravsteder** fremvillies hist og her, men de ere ikke at lide paa. F. Ex. Thidrandelsaag, i Alptefjord, er kun en gammel Aag-Rende. I Wapnefjord ere nogle Høie, som man taler meget om; men vi have ei seet dem. Levning af et gammelt Kastel sees paa Sleggestad-Præstegaard ved Langenæs. Efter de Gamles Vandleddninger paa Tuunene (§. 729.), findes ogsaa nogle Spor paa Østerlandet, især paa visse Steder, saasom Stafafells Præstegaard, hvor Bandsurrerne endnu ere kiendelige. c) I dette Steds Kirke viisies en meget stor og kunstig **Laas** for Døren: den har tvende Meen, skal to Gange lukkes op, og er indlagt med artigt Lovværk af fint Eals. Den er funden ved Roden af et Bierg, kort herfra, for 100 Aar siden, og Almuen vil, at Evesfolk skal have tabt den. I Kirken er et Messing Debesad, med samme Characterer og Ord, som det i Valls-Kirke (§. 758.).

DoD 00 3

Her

Her forbares ogsaa et meget gammelt Østerklæde, hvorpaa ere ind-
 skrede Mariae, Petri og Simonis Billeder; Overskrifterne ere ald-
 gamle Characterer, dog saadanne som endnu sees i gode Nordiske
 Skrifter paa Pergament.

§. 826.

Folkemæng-
 den.

Man seer af Ales Frodes Skrift (p. 12.), naar man vil giøre
 Slutning efter Bøndernes Tal, at Folkemængden i gamle Dage
 har været mindst i Øster-Gierdungen, nemlig 840 Bønder (de usor-
 muende uberegne), da der fandtes sonder paa 1200 Bønder, paa
 Vesterlandet 1180, og nordre paa 1440. Dette Mandtal blev
 taget Aar 1097. Men at endog den anførte Folkemængde paa
 Østerlandet er siden den Tiid anseelig formindsket, kan man sikkert
 slutte af Bygdens store Ødelæggelse (§ 819.) og flere Kiendetegn.
 Efter et Mandtal, som blev taget for 20 Aar siden, fandtes i Skafes-
 fells-Syssel 440 Bønder eller Familier i alt; i de 2de sydligere Vær-
 ter af Mule-Syssel 300 Bønder, og Mandtallet 2000; men i Nor-
 derparten 190 Bønder, og overalt 1281 Siæle. Man seer heraf,
 at Familierne i denne sidste Vært have i den Tiid været temmelig
 stærke, i Forhold mod de andre Sysseler, og at Mandtallet overalt
 paa Østerlandet kan i det høieste anslaaes til 6000 Siæle, men for
 nærværende Tiid er det endnu mindre.

§. 827.

Havne.

De fornemste Havne ere nævnte i Forveien (§. 765.); men
 foruden disse ere mange Ankerleier i Østfiordene, og paa denne Si-
 de af Langanæs, hvortil de Hollændere søge, som gaae paa Fiske-
 rie. I Breddals-Viigen er et Ankerleie, hvor de Engelse Fiske-
 skibhukkerter fornemmelig samles. Disse Fiskere maa holde Soen,
 naar Hav-Fisken kommer; og det Aar vi besøgte disse Kyster, løbe

de

de stor Fare formødest den. Et Engeskib Delogskib, som i den Tid conveyerede dem, skød med Kanoner paa de store Jæsthykker, som dreve til Skibet, for at splitte dem ad, paa det Skibsfolkene skulde kunne raade noget med dem, og sætte dem bort fra Skibet. I Backefjord skal være en god Havn. Ved Portland, eller Dyrhole, i Myrdalen, har været en god Havn i forrige Tiider, og den skal endnu være brugelig; men vi havde ei Leilighed til at besøge den. Skastefjælds Syffels Indvognere ønske, at denne Havn maatte blive besøgt, for at spare den besværlige og lange Reise aartlig til Drebach, paa hvilken Floderne ofte giøre dem Ophold. Imellem Myrdal og Almanfjærd, eller Besterhorn, ere ingen Ankergrunde.

Sønder-Jsland.

Rangearvaller = Aarnæs = og Guldbrynge = Sysseler.

§. 828.

Indledning
og Rejsen i
Almindelig-
hed.

De Reiser, og Observationer, hvorpaa dette Stykkes Beskrivelse er grundet, ere giorte og foretagne paa adskillige Eilænder og Steder. Det var denne Part af Jsland, og især Vedsee, et seculariseret Kloster, kort fra Reykevig eller Holmens Havn, hvor vi opholdte os om Vinteren, i de Aar, da vi reisde i Landet for at udforske og optegne de Ting, der kunde høre til dets Beskrivelse, fornemmelig dets naturlige Tilstand og Indvaanernes Huusholdning. Her gjorde vi Meteorologiske Observationer, samt holdte Breveplinger, angaaende disse og andre Ting, med adskillige, i Sædeleshed studerte Folk, hist og her, endog paa de længstbortliggende Steder i Landet. Vi tiltraadde altid hvert Aars Reise herfra, og besaae, ved den Leilighed, nu et, nu et andet Stykke af Sønderlandet, og nogle af dets Sysseler og Herreder ofter end en gang, fornemmelig Riosar-Syssel, og den vestlige Part af Guldbrynge og Aarnæs-Sysseler; nogle Steder derimod, f. Ex. den øverste Deel af Rangearvaller-Syssel, komme vi aldrig til i de 5 Aar, som denne Reise varede. Men denne Egn, tilligemed en Deel andre Herreder paa Sønder- og Vesterlandet, var alt besøgt og be-

skrevet

skrevet i Forveien af den eene af os, (nemlig Eggert Mafsen), i Aaret 1750. Ellers besaae vi Sonderlandet fornemmelig i Aarene 1755 og 1756, og især det første Aar Guldbrynge-Syffel, og Aaret efter de 2de Osten for, nemlig Narnæs- og Rangaarvalls-Syffeler. Klofar-Syffel havde vi allerførst besøgt, hvorfor det og er beskrevet i det første Stykke. Af anførte Aarsager have vi da agtet det tjenligst og naturligt, baade at begynde og ende dette Bærk med Sonderlandets Beskrivelse, da alle vore Reiser ere baade begyndte og endte sammesteds.

§. 829.

Sonderlandets Beliggenhed og Anseelse er ikke overalt den samme. Himmels-Egnen er vel den sydligste, og folgelig meest mild og fordeelagtig; men ved det den underjordiske Jld haver meget mishandlet adskillige Landstæder, saa see disse ikke nær saa vel ud, som det øvrige. Denne Deel af Jøland ligger da midt paa Landet imod Sønden, skildt fra Østerlandet ved Solheimesand, fra Nordlandet ved store Fjælde og Fjeldbiærge (§. 698.), og fra Vesterlandet, efter den ældste og retteste Inddeeling, ved Hvalfjord og Boresaa (§. 116.). Dens Strækning er en uordentlig Sirkelfant; hvis Bredde, i lige Linie mod Havet, mellem Jøfalsaa og Hvalfjord, er henved 25 Tydske Miile, da den jævnsides løbende Linie paa Fjældene, at regne fra midt for Hofs-Jøfel til Skialdsbreid (et beklendt Bierg kort norden for Thingvalle), neppe udgjør mere ligefrem end 12 Miile. Den østlige Side-Linie, fra Hofs-Jøfel til bemældte Aas-Udlob, er 20 Miile, og den vestlige, fra Skialdsbreid til Bessfled, 15. Men hvis man vil strække samme Linie ud til Pynten af Reykenæs og omliggende Der, bliver Sonderlandets Længde 30 Miile. Fjæld-Egnen, eller den ubeboede

Beliggenheden i Almindelighed.

de Deel, udgjør Halv-Parten heraf; og naar man holder denne Part imod Landets andre Fiordunger, bliver den knapt halv saa stor som Vesterlandet, og endnu meget mindre, imod de andre Parter (§. 698. og 763.) at regne. Men derimod, hvis man anseer Bygdens Tæthed og Folkemængden i Sonderlandets beboede Egn, da overgaaer den langt de andre Fiordunger. Den har i forrige Tiider havt de fleeste Indvaanere og Familier, næst efter Nordlandet (§. 826.); men nuomstunder giver den dette intet efter (§. 760.); men snarere overgaaer samme. Denne var da Styrrelsen; men Inddeelingen beroer paa de fire Sysseler; thi Vestmannse regnes under Rangaarvalle-Syssel, hvilket skilles fra Varnæs-Syssel ved Thiorsaa, og dette igjen fra Guldbrynge-Syssel ved Helligs- heide og Fiældet, som gaaer derfra ud til Røykenæs. Grandsø- Skial inellem denne sidste og Riosar-Syssel er Rollefjorden. Rangaarvalle-Syssel er det største, naar den ubeboede Egn bliver regnet med, og dernæst Varnæs-Syssel, hvilket Guldbrynge-Syssel ikke giver meget efter; Riosar-Syssel er derimod det mindste.

§. 830.

Egnens Be-
skaffenhed.

Egnens Beskaffenhed, saavel paa Oplandet som nær ved Søekanten, er meget ulige. Rangaarvalle-Syssel er overhoved at tale det smukkeste, hvor det er beboet, nemlig often fra til den vestligere Rangaa; thi der er Grunden jævn, tør og bedøven med Græs; der øvrige til Thiorsaa er ulige; dog overalt godt, saa at, hvis dette Syssel havde Skov nok, vilde vi give det Fortrin for, eller i det mindste sætte det ved Siden af de allerbeste og smukkeste Landkæbe i Jsland. Derimod er den ubeboede Deel desto slettere, og ei alene unyttig, men ogsaa skadelig; fornemmelig Oplandet og Fiæld-Egnen omkring Hekta, som haver havt tilforn en anseelig Bygd.

Der

Her er ikke andet end Sand og Støv af Vimpesteen og Afke, samt smaltede og forbrændte Klipper og Steene. Det jævnlige Sandfog og Mist, som driver herfra over heele Sonderlandet, naar der blæse østlige og nordøstlige Vinde, fordørrer meest Rangaaballes Bygd og Græsmarker. Aarnæs-Syssel har for den største Deel en nedrig, myrefuld og fugtig Egn, som, endskjønt den ikke er den smukkeste, er dog meget frugtbar og allermindst Ødelæggelse underkastet. De Bygder, som ligge nærmest ved Fjældene, ere tørre nok, men de beskadiges paa somme Steder af Skredfald. Her findes vel smaltede Klippeskræninger, men de formindste ikke Bygden meget, uden i Thingvalle-Sveit, en særskilt Fjældbygd vestligst i dette Syssel. Floen er det nedrigste og Havet nærmeste Landskab, som for en stor Deel bestaaer af Myrer, som heele Eiden staae under Vand; men dette uagtet gives der megen Høest. Fjældene oven og norden for Sysslet, især det Landskab Bispestunger, ere græsrigte og frugtbare paa Lyng, Kvat og Urter, især give Græsdalene, og den sydligste Deel af Risøveien, gode Afretter for Faar, Stude og Heste. Guldbrynge-Syssel er af ganske anden Beskaffenhed, end de 2de næstanførte, thi det er i forrige Tider ganske omtumlet ved Jordbrand, og oversvømmet af smaltede Stenfloder. Dette er skeet længe efter Landets oprindelige Jordbrand, og tildeels strax efter at Sysslet var besat med Indvaanere; dog findes her overalt smukke Stykker af græsrigt Skov mellem Graunene, og Afretsmarker til Fjæls, senden til og langs med Krysevig og Helligheides Bjerge til Mosfellsheiden. Ved Søekanten ere paa mange Steder smukke Madsø og bebyggede Jorde; dog er Fiskeriet det, som fornemmelig holder Folkemængden ved liige og nærer Indvaanerne. Risør-Syssel

er beskrevet i det første Stykke; dog skulle de mærkværdigste Egense deraf beskrives i Særdeelighed, hvor Materien kræver det.

§. 831.

Stranden og
Derne.

Ligesom Strandkanten uden for Skafelsø-Syssel er sandig, foranderlig og fuld af Brændinger, saa er ogsaa den største Part af Sønderlandets, ligesom at regne; hvilket uagtet, Indvaanerne dog holde Fisserbaade paa de fleste Steder, og lande der, endstønt med stor Fare, for de stærke Brændingers Skyld, hvorfor de ofte blive borte. Strandkanten for Solheimesand bruges ikke; men den øvrige bruges her, lige til Ørebæk, nemlig Vefstedsand, Landørne og Rangaasand. Paa Ørebæk er en Havn, men, som bekendt, meget farlig: Stranden er der fuld af Skær, som Brændingerne idelig slaar paa, samt Klipperne sorte, og af Begyndelsen smaltede, dog Hullerne meget tættede igien. Thorlaas Havn, som har været brugt tilforn, er fort her vesten for. Her begynder det store Næs, hvis yderste Odde kaldes Keykenæs, og som udgjør Guldbrynges-Syssel, naar man regner roers over, gien nem Krisetvig, sønder til Rollesfjord. Næsset har igien uden paa, og rundt omkring, mange Vigge, Næs og Fjorde, som under eet kaldes Sudurnæs, og er 12 Mille langt og 2 til 4 Mille bredt: det løber i S. V. ud i Havet, ligesom det øvrige af Sønderlandets Strandbred vender imod den samme Kant. Søfiden i Guldbrynges-Syssel er overalt meget klipperig, og af samme Art som Ørebæk, undtaget at den er endnu meer smeltet og omtumlet; dog ere her 5 gode Havne for de udenlandske Handlende, og overalt Landsteder for Fiskerne. Svalonæs er, næst Keykenæs, det største i Sysslet. Sønden for dette sidste Næs er Grindewigs Havn, og norden for, Baadsende, hvilken de Søfarende kalde

Baads

Baadsand. Norden paa Hvalsnaes er Riebleviig. Paa Strandkanten ere overalt store og smaa Fiskeleier anlagte. Havnesfiord er den 4de Havn, hvor det store Naes begynder, og imellem samme og sidstbenævnte Handlingssted ere Strandkapperne stelte; der boe Lunde og de 3de Arter af Alker; sønden paa Naes, imellem Grindeviik og Thorlakshavn, ere ogsaa stelte Klipper, som høre til Riebleviigs Gaard, hvor der boer en endnu større Mængde af disse Fugle. Norden for Havnesfiord er Alprenaes, hvor Kongens Gaard Besefted, Amtmændenes Boopæl, ligger. Sæltisrten næs er der Norden for, og en liden Bugt, Skeriefiord, der imellem; denne Viig har en gammel Havn, Seila, fort fra Besefted, hvor Skibene have lebet ind om Gøden. Norden til ved Sæltisrten næs er Holmenshavn og Reykeviig, hvorfra der ikkun er fort Vej ligesvem til Gufenaes Hospital paa denne Side af Kollefiorde. Kysten har her overalt, fra Hvalsnaes til Kollefiorde, gode Landsteder for Fiskerne, hvilke boe her overalt, og Egnen med dens mange Naes og Bugter kaldes Inn-Naes, enten fordi Havkanten boies saa meget ind, eller fordi de ligge inderst i den store Havbugt Fapafiord (§. 2.). At Kysten østen for Reykenæs har været lige saa farlig formedelst Brændinger i gamle Dage, viiser Landnama-Saga (Part. 5. Cap. 1.), som bevidner, at den ganske Strækning fra dette Naes til Østerhern eller Lonet, er tidligere bleven fuldkommenlig indtagen eller beboet, og det alene for Brændingernes Skyld.

De Øer, som høre til Riosar-Syssel, ere nævnte i det første Stykke (§. 2.), og overalt ere kun saa Øer paa Sønderlandet. Den betydeligste i Guldbringe-Syssel er Vidøe, som tilforn haver haft et Munkeløster, hvortil mestendeels hørde det anseelige Jorde-

gods, som Kongen eller her- og Jader forvalter ved Landfogeden. Bidoe er et Sted, som ikke har sin Ege Søndre paa: den giver overflødigst godt Græs til mange Koer, Saar og Heste, en Mængde vilde Fugle, Eg, og Vederruun; Stranden har Musflinger, Rundemaver (Steenbidere), Flyndre og andre Slags Havfiske. i Mængde; den ligger tæt ved det faste Land, og saa godt som inden Skiærs, hvorfor og Vandet som oftest er roeligt; en Sandbank, som gaaer uden for fra Kialernæs og Alstenæs og inden for samme, gjør det lidt ganske stille, naar der er Størrt uden for; hvad der er mærkt i det andet Stykke om Hvalfiorden (S. 186), forklarer dette endnu bæder. Engøe, et Kirkested, med nogle Gaarde, ligger ligeledes i Rø inde i Bugten kort fra Bidoe. Her fra søges Sikkeret ligesom fra det faste Land i Nærværelsen, paa alle Aarets Tider. Næse havde Kornland i forrige Tider; nu falder der godt Græs til Fæbæd og Høestet; Den ligger imellem Engøe og Skeltornenæs; men inden for, og imellem disse to vende Der, ligger endnu den 4de Ørsarøse, almindelig kaldet Ørsøey, og af de Færende, Solmen; thi her staae Handels-Huuse, og Havnen er der inden for midt imellem den og Røskvlig. Inden for disse Der er Soen stille, ligesom indenskiærs i Norge: Indbyggene fare her daglig frem og tilbage med deres Baade, dels for at fiske Smaa-Torsk, Helleflyndre, Røkker og Rødspætter, dels for at fiske vilde Fugle, og samle Musflinger om Ebben, i fuld og nye Maane; dels tage de ud til Øerne, især til Havnen om Sommeren, for at handle. Ellers har Ørsarøe et Eid op til det faste Land, hvorpaa man kan gaae ud naar Vandet er lavt. Røskianæs-Lyar kaldes under eet nogle Klipper, som ligger i Soen uden for Røskianæs, for hvilke de Søfarende maa tage dem i Agt, naar de skulle her forbi

Karl

Karl og Kiærlig, tvende høie Klipper tæt ved Pyntet, have
nogen Eigning efter Mennesker langt borte, hvorfor de og udgives
for Trødes Heller og etnande store og grumme Mennesker der rebeser
de Reisende. I Idey eller Ildøe ligger et Milt ud fra Pynten, og
kort der uden for Ideyars Drangår, en høj Klippe. Paa disse
Steder opholde sig Alker og Andre Søer og Viærg-Fugle; men de
ere saa steile, at ingen Huomstunder kan komme der op; men tilforn
har man haadt Stiger af Tov paa Ildøen, og der stode endnu store
Som i Klipperne, hvor disse Dove ere blegne hestode. Geirfugle
Skær ligger længer ude i Søen, en temmelig stor De, som er
lav, og derfor beftigelig paa den bestige Ende. Kort inden for er
en middeknadig Klippe, og uden for en anden, meget høj, der
har Afseelse af en Seiler langt borte. Den er ogsaa høi af Gals
ve, forvædelt Skarret af den store Mængde Viærgfugle, som op
holdt sig der. Disse Derstræffe sig i Mille ud fra Næfkenes, lige
i Vester, og i Mille der uden for, i samme Linie, er et blinde
Skær, som er meget farligt for Seilende; dog seer man ofte
Brændingen derpaa. Fremmede Seesolk kalde disse Der under et
Fugle Skærne, og dette yderste, det blinde Fugle Skær. Høi
Skibene komme her ind til Landet, og mellem Detne ere de lide
farne, thi her gaar en Rost eller Malstrom, hvor Vandet med
en stærk Fart, trækkes ind og ud, og altid til og omkring
disse Klipper, især naar Været er stille. Paa Geirfugle Skær
opholde sig Pingviner (Alca alis minimis) i store Mængde, thi
de kunne krybe her op, og de fanges iblandt af Søndelandets Ind
vaanere, som vove dem her ind, naar Havet bruiser mindst; de
kunne dog ikke lande; men een af Mandfæber maade vove at springe
med et Tov op paa Klipper, og naar de skulle bort igjen, maade de

ofte

de, ere 14 i Tallet, saa ere de fleeste af ingen, og de andre, endog de 4, som der voper Græs paa, ikkun af liden Betydning, at regne mod den eene, hvilken er behoet, og kaldes Zeima-Ey efter Ordet Hiemne-De; og denne bliver uden Modsigelse, i Hensigt til Handelen, den største og fordelagtigste paa heele Landet. Den udgjør, siden 1609, et Syffel og Handels-District for sig selv, hvorhen Compagniet aarlig sender eet Skib, og undertiden to paa eengang. Det er meest Fiskeriet, som bringer disse Fordeele; thi Den selv er klipperig og liden frugtbar, steil uden om, og oven paa besat med Graun og mange smaa Viærge, hvoraf nogle i de seene, re Tiider have sprudt Jid. Westmannoe blev ikke bebygget forend i det 10de Hundrede-Aar, da en Mand, ved Navn Herjolf, allerst først satte sig der ned; men for den Tiid søgte Folk fra det fæste Land derhen, alene for at fiske om Sommeren. Den har tvende Kirke-Sogne, af hvilke Kirkebær er det ældste og fornemste. De geistlige Indkomste forærede Biskop Arne af Skalholt, Aar 1298, til et Munkes-Kloster i Bergen, hvor han samme Aar døde, og derfor bruges her endnu den Norske Tiendemaade. Efter den Tiid bleve her bygte tvende Kirker, men nu er her kun een, af Sommer, men dog 2 Præster. I Aaret 1627 gjorde de barbariske Soerovere Landgang paa Den, og deels sloge ihjel, deels bortførte Indbyggerne, om hvilken Tildragelse en liden Bog er bleven trykt. Præsten Jon Thorstensen, som disse Røvere sloge ihjel, holdes for en Martyr, ei alene der paa Den, men og snart overalt i Landet; han var og en gudsfrygtig Mand, og den beste geistlige Poet i de Tiider, hvilket sees af hans Vers, hvoraf de over Skabelsens Bog og Psalmerne ere meest bekiendte, fordi de ere trykte. Skandsen, med nogle smaa Kanoner paa, som blev bygget strax efterat Soe-

foverne være borte, er endnu ved Magt. Den er ellers af Natu-
 ren temmelig befæstet, og læt at forsvare imod en Fiende, hvis Ind-
 byggerne være forsynede med Væbne, og vidste at omgaaes samme.
 Deres fornemste Handtering, foruden Kvægavlingen, er Fiske-
 ri, fornemmelig af Torsk, hvilket de drive med store Baade, paa 10
 til 14 Mand, Vinter og Sommer. Desuden have de Viærgfugle-
 Kød og Æg om Sommeren. Heimse giver meest deraf, og Fols-
 kene ere særdeles vant til og driftige i at klavre op i Klipperne, for
 at søge denne Næring; men de falde og ofte ned og omkomme der-
 ved. Zellerse er næst efter Heimse den beste, formedelst sin ypp-
 ertlige Græsgang for Stude og Saar, Vinter og Sommer; den
 haver 2de Huuler, hvor Kreaturene ligge om Natten, og naar der
 falder haardt Vair. Vestmannoerne have største Mængde af
 Viærgfugle, og foruden disse, Lunden, Sylingen (§. 700. og
 744.) og Rysen. Hav-Sulen (§. 337. og 670. b) yngler ingen-
 steds i Landet, uden her i en hoi, særskilt Klippe, Sulu-Skiær,
 som er mærkværdig deri, at den har en Dor eller Port, hvorigen-
 nem smaa Baade kunne roe, naar det er stille. De unge Hav-
 Suler fanges og splifes af Indbyggerne, men deres Kød er tranet,
 og derfor ikke saa velsmagende for Fremmede; dog, naar Skindet
 trækkes af, forgaaer den Smag mestendeels, ligesom hos andre
 tranede Søfugle. Sulestikaret ligger til S. fra Heimse, og et
 godt Stykke i V., der uden for, Geirfugla-Skiær, en liden flad
 Klippe, hvor Geirfuglen lægger Æg, ligesom paa hin uden for
 Repkenæs. Her splifes ogsaa Hav-Vexter, fornemmelig Saul
 (Alga saccharifera) og Stæregæs (§. 594.), hvilken sidste Ur-
 t haffes og kaages til Grod med lidt Meel til. Vestmannoe haver
 kun 23 Gaarde, og 52 Bønder eller Familier; Indvaanernes Tal
 er

er altsaa ikke stort; men en Deel Menneſker fra det faſte Land ſøge herhen for at fiſke. Kongen har her nogle Inventarii-Baade, ſom bruges til Fiſkerie, og, tillige med Dens Handling og Havnen, forpagtes bort til Compagniet, der holder her om Vintertiiden en Eſtertigger, ſom driver Handlingen og forſynet Indbyggerne med fremmede Varer. Havnen er her meget ſaak, og bekvem, i Læ for alle Vinde. Man løber derind ved en liden Omvei, og uden for den er en ſærſkilt ſteil Klippe, kaldet Zeimalektur, hvor man fanger Viærgfugle. Samme Klippe tager imod Soegangen fra Havet.

§. 833.

Om Viærgenes Beſkaſſenhet paa Sonderlandet, i Bygden, ^{De fornemſte Viærg.} er ikke meget at ſige, ſiden de ſleſte ere kun ſmaa og lave. Zengle-ſtiæld gaar fra Thingvalle til Hallsheide, og den ſamme Stædes rad holder ved at løbe imod S. og S.V. til Repkenæs, deelede ſaaledes Sonderlandet i 2 Parter, da de 2 Eyffeler, ſom have Navn af Rangaarvalle og Narnæs, ligge often for, og de andre 2 paa hin Side. Vi ville ikke opholde Læſerne med at opregne Bygdens Viærg; dog maae vi nævne Ingolfsfell, imellem de Bygder Olves og Grimsnæs, hvor Jølands forſte Beboers Ingolfs Hoi ſkal være oppe paa Stædet. Denne ſaakaldte Ingolfsbauge er kiendelig nok fra Bygden; den er 200 Favne i Omkreds, og ſynes at være en naturlig Hoi, beſtaaende af Gruus og Steen, og tiſdeels faſte Klipper. Det er ellers ikke urimeligt, at Ingolf lige her begravet. Naſſagen dertil anføres, at han vilde ligge der, fordi han i det andet Liv kunde desbedre overſee de Bygde og det Land, ſom han forſt havde indtaget; hvilket kommer overens med den hedenſke Overtroe i Norden. Biſkop Brynjulf Svendsen, en

stor Eiffer af Oldsager, gik engang her op, for at besøge Stedet. Han havde hos sig en af de bedste Poeter, der have været i Island, og lod ham paa Stedet gjøre en artig Vise om Ingolf; derpaa lod haa sit Folgeskab opstabe en Pyramide af Brucksteene oven paa Høien. De Fjælde over og omkring Sønderlandet ere de største og fornemste. Iblandt dem er Skialdbreid, et stort særskilt Viærg af besynderlig Skikkelse, omtrent som de gamle nordiske Skioede, naar man vendte det Huule ned ad. Viærgen har ingen steile Klipper, men beholder allevegne den ordentlige Dannelsse, saa at man uden Besværlighed kan gaae op til Toppen; det synes ellers at være en Levning af en gammel Opsprudning, thi Grunden er her overalt forbrændt, og haver store Strækninger af Jordfinner. Osten for dette Viærg er en smuk grøn Glette, kaldet Glaudevalle, hvor Riemperne, ved Landets Beboelses Tid, siges at have holdet Sammenkomst, for at sege og prøve deres Styrke og Legems Dvælske. Dette nævdes ogsaa i Vaarda-Saga, men er dog ei at lide paa (S. 113). Vesten fra Fjældet har en stor Flod af smaltet Materie taget sit Vøb forbi Ladevalle til Helliastard, en Bei giennem Viærgene ned til Græsðalene (S. 710). Her har været Skov i forrige Tider; thi Stumper af gamle Birkeræer stode endnu op af Sandet. Fra Græsðalene til Blåafell ligger Bei i Nordost. Man har de store Jisbiærge bestandig paa venstre Haand: den sydvestligste Deel deraf er Geitlands-Jökul, omtalt i det andet Stykke; den middeste er Kirkus-Jökull, hvilken her er paa Siden, gaaer i en Bugt fra Bei, og nærmer sig meer til Nordlandet. Den nordligste Deel af bemældte Jisfjælde er Vald-Jökul; den ligger oven for Kiølvæien, og slipper paa høire Haand, hvor Zofa-Jökul begynder paa den venstre, hvis nærmeste Deel ligeledes horer til Sønder-

Sønderlandet. Paa Nordkanten af den første Jøkelstrækning er Sand, en lang Fjældvei fra Sønderlandet og Borgefiord til Nordlandet; den bruges meest nuomstunder. Alle disse Jisbiærge ere meget høie, og overalt takkede med Jøkel-Jis. Tindastianll ere meget høie og spidse forbrændte Biærge, i N. fra Skjaldbreid, og paa denne Side af Eiriks-Jøkel, inde i hvis Bugt en Råd af sammeslags Biærge vedvarer langs med Jøkelbredden, og det er sært, at denne gaanske Jøkelstrækning giver ingen Vandfalde fra sig, undtagen den liden Eto Sandaa. Blaaflædet staaer for sig selv, bort fra Veien til den høire Haand, og er meest en Breccia af Moberg, fuldt med Steene af Jordfinner, baade store og smaa. I dette Biærg siges at være en Ræmpe-Huule, som man gaaer op til paa udhugne Trapper; men det er endnu uvist. Tinsfalla-Jøkeall er et særskilt Jisbiærg oven for Rangaarvalle-Eyff til Øster, og i Vester fra Torfa-Jøkel (S. 774.); dog haver den ikke saa jævn eller fast Jis, som de andre Jisbiærge. Imellem denne og Hofs-Jøkel er en breed Abning af lave Fjælde, hvor ogsaa nogle Biærge staae for sig selv, dog af liden Betydning; her gaaer den gamle Fjældvei Sprengsand op fra Sønderlandet, i Nord, til Østfiordene. Sella er eet af Landets mindre Biærge, men dog bekendt hos Fremmede fremfor dem alle sammen. Det nævnes i Aarbøgerne med dets rette Navn Sellaall, og deraf have Fremmede, især de Tydske, kaldt det Sellenfeld, men de Danske Sellaall. Dette Biærg er intet Forbiærg, ligger heller ikke nær ved Havet, som det almindelig viises i Kaarterne. Det staaer vesten for Tinsfjælds-Jøkel, og oven for Bygden paa Rangaarvalle. Tilførn stod det i Bygden, men nu er denne efterhaanden ødelagt, ved Biærgets mange og store Opsprudninger.

Reisen til Heklesfjæld.

§. 834.

Anledning til
samme.

Anledningen til denne Reise var, at den eene af os (nemlig Eggert Nassen) havde i Aaret 1749 udgivet en liden Afhandling om Jælands naturlige Beskaffenhed, især hvorledes samme Land var, formedest den underjordiske Jæds Virkninger, dannet og om-dannet Tiid efter anden. Den første Part handlede om Landet, indtil den Tiid det blev besat med Indvaanere, og den anden skulde viise de Virkninger, som Jordbranden havde gjort siden, paa adskillige Tiider og Steder. Ved denne Anledning reisde han over til Landet Aar 1750, besøgte Hekla og mange andre mærkværdige Steder paa Sender og Væsterlandet, samt holdt en Dagbog paa Latin, og gjorde en Beskrivelse over denne Reise. Biarne Povelsen, som samme Aar agtede sig til Jæland, fik da ogsaa Lust til at besøge Hekla. Vi toge da, med eet af Handelskibene, til Væstermannoe, og derfra op til det fæste Land.

§. 835.

Egnen omkring
Hekla,
og Væsterget
selv.

Efter at vi vare komne til den lille Bondegaard Selsund, som ligger nærmest ved Hekla, formaaede vi Manden sammesteds til at viise os Veien. Han var Egnen omkring Fjældet godt bekendt, dog var han aldrig kommen til Roden af samme. Indbyggernes holdte det for en Formastelse, at undersøge noget om Hekla: de forsikrede desuden, at det var reent umueligt at komme der op, for de færlige Leerpole, der skulde ryge og brænde af Svovel allevegne i Nærværelsen. Paa Toppen af Væsterget skulde være fælgende Springvande, og store Nabninger, som gave idelig fra sig nogen Jæd og Røg. Overmeere fortaalte de, at underlige sorte Fugle,

Sugle, af Skabning som Navne, med hvasse Jærn-Næb, skulde
 opholde sig her, og tage meget ubehagelig imod alle dem, som for-
 dristede sig at komme der op. Dette sidste især var en gammel
 Snak, grundet paa den Overtro, som alle Folk i Norden have
 haadt om dette Viærg, og som den eensfoldige Almue andensteds og-
 saa har om andre sæle, vanskelige, og ubekiendte Steder (§. 140.
 152. 422.), at der skulde være de Fjerdomes Piinested. Vi spur-
 de denne Bonde, om han havde mærket til sligt, eller seet nogen
 Røg eller Ild opstige af Fjældet, eller Egnen der i Nærvaærelsen;
 men han nægtede det. Derimod var den Beviis, som førde os
 til Selsund, fuld af deslige Tanker og Indbildninger. Vi besaae,
 i det vi reisde, Egnen omkring Hekla, som imod Sønden og Væs-
 sten viiser de allerbedrøveligste Virkninger af ofte igientagne Op-
 sprudninger. Den deiligste Egn, og mangfoldige Gaarde, ere til-
 deels oversvømmede ved Steenslod, og begravne under denne smæl-
 tede Materie, tildeels ogsaa skulte med Vinpsteen, Sand og Aske.
 Vi saae hist og her, inde i Graunets Bugter, Stykker af Tuune,
 afbrudte Begge og Gaarder, iblandt hvilke Storaskard tilforn var
 een af de fornemste Gaarde og Kirkesteder sønden for Fjældet. Imod
 Vesten var endnu meere af deslige opkastede Materier, og Bonden
 fortæalde os, at man Norden og Osten for kunde see endnu langt
 større og forfærfeligere Levninger af dette Slags. Paa 2 Milie
 nær Viærgen er intet Græs eller Urter, men Grunden bestaaer deels
 af Jordfinner, samt sorte og røde Vinpsteene, og deels af Aske.
 Kunde opkastede Høie, af samme Farve og Væne, staae her over-
 alt, hvor Jorden er kommen op af Grunden igien, eller hvor de ikke
 fuldkommelig slukkede eller udbrændte Materier have brændt paa
 nye. Jo nærmere man kommer til Viærgen, jo større blive disse
 Høie:

Hoie; og oven paa mange af dem aabnes en rund Dal, hvor Opkastelserne ere komne fra. Det fornemste af disse smaa Viærge kaldes Raud-Øldur: det er langagtigt, og havde oven i saadan en Aabning, der var 180 Fod dyb, og 840 i Omkreds; og bestod overalt af smæltede røde, udvendig glindsende Smaaflæene. Men den mærkværdigste Prove, vi bragte med fra Hekla, var den vi opdagede paa Roden af dette Viærg. Det var en tæt sortblaalig Steenart, til Anseelse som Jaspis, men havde derhos tydelige Tegninger af Eræ. Vi fattede strax den Tanke, at denne Steen havde af Forstningen været forvandlet Eræ, som siden i Jordbranden var blevet halv-smæltet, uden at Erævlernes indvortes Læge vare komne af Løbe. Denne Meening blev bestyrket derved, at vi blandt andre Stykker saae en tyk Stamme af bemæltte Materie. Den var 4 Fod høj, 5 Fod i Giennemsnidt, samt revnet og tværbrustet overalt. Denne Steenart klingede som Metal, og den havde iblandt Anseelse af rustet Jærn, naar det efter den første Smæltning, eller Jld, er jævnet i Erken. Jo nærmere vi komme til Heklesfædet selv, jo besværligere blev Veien, især da vi opnaaede de høie Braun-Årme, der løbe ned fra Viærget. Af denne Materie boies en Hals, eller Viærgryg, som en Bold, omkring Hekla. Denne er meget ulige, paa nogle Steder 40, paa andre 70 Fod høj, bestaaende af store smæltede Hælder. Her maatte vi forlade Hestene; vor Vej viiser undskyldte sig og fra at gaae med, fordi han havde faaet ondt i sit Hoved; men vi tænkte, hans Indbildninger forbode ham at nærme sig til dette forfærdelige Fjæld. Man maatte, paa Hænder og Fødder, og med megen Varsomhed, klavre op paa bemæltte Bold; Hæiderne var løse, dog overtrofne med Moss, og dybe Huuler imellem dem. Inden for Bolden mødte en bedre Vej:

Rode

Rodderne af Flædet, og Siderne, vare ganske jævne, og gode at gaae paa: vi ginge op ad den vestlige Side. Klipperne vare ret besynderlige: det knagede idelig under Fodderne. Vi bleve halsbange, og tænkte det maatte være Huiler neden under; men da vi saae efter, vare Klipperne ogsaa udbændte til Plimpesten, og bestode af tynde Lag, eet over det andet, som overalt vare tværbrustne. Dette giver Anledning til at forestille sig, hvor overmaade Jorden maag have indtaget og udpiint det ganske Fjeld, og skulde det sprunde oftere, da ville vel Klipperne falde i Afse tilsidst. Veien op ad gik uden Hinder, hvilket vi allermindst havde forestillet os. Fjædet stiger trappetvis op, og disse Brinke eller Trapper ere, med det øverste eller Toppen iberegnet, 7 i Tallet. Her gaar og smaa Dale op og ned, som tiene til Vand-Render om Foraaret, men have af Forstningen været Render for den smeltede Materie. I dem, og imellem Brinkene, fandtes den røde, sorte og hvide Skursteen, og især den sidste saa overmaade fin og læt, at den snart syntes at overgaar den, som findes i Ørverne (§. 798). Dette kommer overens med det, som nogle have berettet om Hekla, at den skal ogsaa have sprudt Vand imellem, dog ikke i saadan Mængde, at derved er frembrudt nogen skadelig Vandflod. Man har ogsaa strax efter nogle af Heklefjældets Opsprudninger fundet en stor Mængde Salt, saa at mange Heste kunde i en Hast belæsses dermed; hvilket synes ikke lidet at bestyrke den Formodning, at de Jld- og Vand-sprudende Viærge maae have Samfund med Havet (§. 772). Om Østlandets Gisbiærge kan det med Joie sluttes, fordi de staae Havet saa nær, og stikke ned i samme med deres dybe Rodder, ja virkelig sprunde langt meere Vand, end nogeninde kunde blive af den smeltede Jis. Man har derforuden mærket Salted derved.

Man kunde vel, hvad Hekla angaaer, svare, at der maatte være en Mængde Salt neder i Grunden: men denne Grund naaer jo ned til Havet; og foruden andre Nationers og lærde Mænds almindelige Meening, at dette Bjærg har hemmelig Samsund med Vena i Sicilien, da disse to Bjærg saae lidt have sprudet paa een gang, er det i et endnu utrykt Skrift, med mangfoldige rare Exemppler, lagt for Dagen, hvilken Samsund Hekla, i adskillige Op-
 sprudninger, har viist sig at staae i med andre paa samme Maade rasende Jølandske Fjælde, der ligge længer fra den end Havet, ja endog med de længstbortliggende. Hvad de hvide Skursteene angaaer, da findes meget lidt af dem paa, eller nær ved Hekla; derimod findes de længer fra, 2 Miile, og derover, paa Rangaarvalle. De synes at være den første Virkning af hver Jødsprudning; den anden er Graun og den sorte Skursteen; Sand og Aske den sidste. Overalt, hvad der treffes nær ved Fjældet, er meget udbrændt. Vi leedte overalt efter det nysoimtalte smæltede Steentræ, og fundt det dog ikke i den Stand, som neden for paa Rodalben. Vel laae her paa Roden saadanne Stykker, som lignede dette Træ; men de vare ikke aleene smæltede, men ogsaa udbrændte til en Art af grov Pimpesteen, som dog havde endnu beholdet Træets Trærter, men meget tværprukne. Denne Prove glindsede indvendig, naar man brækkede den, og man mærkede overalt deri Smuul af hvidt Glas i de største Huller. Her laae ogsaa Stykker af Klipper, udbrændte til Pimpesteen, der vare meget fastere end Resten, og smittede Hænderne: inden i dem sandtes smaa rundagtige Stykker af sorte blaa-graa noget glindsende Steene, der lode til at være en Middel-Art af Blaagryte (§. 477. a) og Jaspis; formodentlig holde disse Eitler Jærn, og ere halvsmlætede. Det var om Nat-

ten til den 20 Junii, at vi ginge op ad Heklefjælden. Været var klart og stille; men da vi komme høit op, begyndte det at blive koldt. Viærgen oven til er tækket med Jis og Sneer, dog ikke af Jofeler Arren; thi den toes sædvanlig op om Sommeren, uden det, som sidder dybt i Klippernes Rifter og Nabninger, ligesom dette skeer ved andre Fjælde, som ikke ere Jisbjærge. Da vi komme paa Jisen, mærkede vi nye Sneer, som blev des dybere, jo høiere vi komme op; den var 12 Fod tyk oppe paa Fjælden. Denne og næst foregaaende Dage havde været ganske klar. Himmet i Bygden, da Hekla, som andre Viærge sædvanlig giøre (S. 435.), haver trækker Skyerne til sin Top, og indsvøb den deri i nogen Tiid, hvilket dog dens Naboer ikke havde agtet paa. Men siden det var kun paa Jisen paa Hekla, at den nye Sneer var falden, og ikke noget paa Klipperne der neden for, kan man slutte, at Jisen paa Fjældene viiser det Maal og Hoide, som grove Skyer og Damppe kunne opholde sig i, om Sommeren, da Luft-Egnen neden under er roen og klar; folgelig er der paa denne Hoide saadan en vis Tyngde og Lag af Luft, at Jis og Sneer kan opholde sig der, og saa og saa høit op derfra, men ikke neden for. Hekla'er ellers kun liden, i Hensigt til de høie Jofeler og Opplandets Fjælde. Dens Omkreds er 3 til 4 Meile, og dens Hoide (som vi slutte af andre maalte Fjælde) henved 3000 Fod, at regne fra Sandstetten neden for dens Bolde, men Høiden over Havet er endnu ubekendt. Efter en besværlig Baden igiennem den nyfaldne Sneer, som naaede os til Ræverne, komme vi endelig op til Toppen af Heklefjælden. Kloffen 12 om Natten; men her var alting stille, og intet andet end Jis at see; derimod saae man ingen Rifter eller Vandfælde, og endnu mindre opkgaende Springsvande, Røg eller Ild. Det var lyst ligesom om Dagen;

vi saae vilde og breedt omkring, alle Østerlandets Jisbiærge og et firkanter høit Biærg længst borte: det saae ud som et Slot, og Bonhen sagde siden, at det var Hærbreede. Ligeledes saae vi alle de høie Fjælde, der staae over Nordlandet, og mangfoldige forskellige Søer, som Veivissøren ikke ydste Navn paa. Her oppe var da intet videre at bestille. Vi havde naaet vort Duffe, at komme op paa Hekla, og vendte derfor ned igien, da Veien saldt ikke nær saa besværlig som op ad; tilmed var den nyefaldne Sne nu ganske tilsroffen, saa at vi kunde gaae open paa den; Lusten var her meget kold, dog stille. Vi ginge ned af Fjældets vestlige Kant, langs med en dyb Dal eller Kløfte, der begynder paa det øverste, og holder ved ned igennem Rodderne. Denne Kløfte er uden Tvivl den Rende, som den store Opsprudning i Aaret 1300 har havt, da Landets Aarbøger mælde, at Hekla ganske revnede ned igennem; thi endstignet denne Kløfte nuomstunder ifkun har Anseelse af en dyb Dal, har den af Fjærningen været aaben lige ned til Afgrunden: men denne dens Aabning er, mod Slutningen af Jidens Kaserie, ligesom det skeer med alle slige Opsprudninger, bleven tillukket af det tilbagefaldende Græs og Steene. Paa Bredderne af denne Kløfte, især neder til, og des meer jo længer man kommer ned ad, findes Klipper og Steene, og for Enden neder paa Sletten, høie Banker af smaltet og forbrændt Materie, opkastede. Vi komme lykkelig ned, og kunde vor Veivissær igien, som nu var bleven ganske frisk. Han undredes over, at vi vare komne tilbage uden Skade.

§. 836.

Slutning om
Heklaens og
dets Opspru-
dninger.

Dette Biærg haver rimeligst begyndt sine Jidsprudninger længe før end Landet fik Indvaanere. Een af de Islandske Aarbøger, anmelder dets første Opsprudning i Aaret 1004; en anden siger,

at

at det var den tredie som steede 1029, og overalt komme Aarbøgerne ikke overeens i denne Post; thi efter nogle, som regne kun de største Jidsprudninger, blive de kun 11, og efter andre 16; men efter en nøie Giennemlæsning og Undersøgning i denne Materie, blive de i alt 22 i Tallet, og dog regnes nogle fra, som ere uvisse, men som dog lægges til af andre, ved det at Tiaetdet har holdt ved længer end eet Aar ad Gangen, eller og begyndt at brænde om Vinteren, for det følgende Aars Begyndelse. Tilgemaade regnes de mindre Jidsprudninger fra, som ikke ere komne op af Tiaetdet selv, men i Nærværelsen, enten af Graunene eller de mindre Bierge; dog siden disse Jidssteder ere Heklesiaetdets Affodninger, og Jiden er kommen fra dets underjordiske Gange, seer jeg intet derimod, at jo disse Opsprudninger, uden omkring Hekla, kunde lægges til det anførte Tal. De fleeste Aarbøger henføre den første bekiendte Jidsprudning i Hekla til Aar 1104, 1105 eller 1106, og den sidste af dem, som ere komne op af dens Toppe, steede 1693. I Graunet brændte Jiden nogen Tiid 1728. 1554 mærkede man temmelig stærke Opsprudninger fra de Tiaede, som ligge kort norden for Hekla, og den sidste Gang saae man Jordbrand i Graunet vesten for den 1754. Den varede kun 3 Dage. Tiden inellem Heklesiaetdets Bevæggelser har været meget ulige, dog denne Orden deri, at undertiden har den kun ladet faa Aar, som 2, 5 til 10, gaae forbi, undertiden har den hvilet i 50 til 60 Aar. Nu tilsidst har den holdt inde over 70 Aar, hvorfor dens Naboer leve i stændig Frygt for at den vil brække løs med det første *), og det med større Hastighed end tilforn. 1762 blev Heklesiaetd igjen besøgt af Biarne Povelsen,

Rr rr 3

for

*) Saadant er og stæet, siden dette blev skrevet, ved Biatgetts sidste Jidsprudning i Aaret 1766.

for at samle Prover af det Slags Materier, som pleie at frembringes ved Jordbrand; men han kunde ikke komme op paa Bierget, formedelsf indfaldende Taage. Han fandt aleene en Forandring af den smæltede Træsteen, der lignede Jaspis, og var rød af Farve, inden i med gulagtige Aarer, hvilke komme til Syne i Træbrundet. Inderst paa Lang-Siden, hvor Stykket havde været flødet fra, vare Træstjerne sorte; men uden om gik et Lag af samme Materie, som var gulagtigt, og Barken, eller den yderste Skæl, var tynd, skarp at føle paa, og fuld af smaa Huller. Denne Prove, ligesom den førstbemældte sorte (§. 835.), holder Jærn, hvilket har gjort, at Smeltningen er bleven tempereret. Om det ved Jordbrand til Kull forbrændte Træ, eller Surterbrand, som derpaa er blevet forvandlet til Steen, have vi nævnt tilforn (§. 447). Den ene af os, nemlig Eggert Olaffen, traf den Prove 1750 i Drapes Hidskjæld, og man kan af disse 2de Steenarter see, hvor forunderlige Omkiftelser den oftomtalte Jordbrand haver kundet frembringe i Jesland.

Jærste Søer, Floder og andre Bænde.

§. 837.

Sør.

De mærkværdigste Søer ere følgende. a) Sissevautn, som ligger oppe paa Fjældene mellem Rangaarvalles og Skaptesfjælds Opstæler, 10 Milie i Nord fra Hekla. Nuomstunder besøges disse Søer ikkun sjælden af Sønderlandets Folk; men i forrige Tider haver der været Fiskevær, saavel østen som sønden fra. Man finder der endnu Levninger af Fiskehuse, og lange Rader eller Opstablinger af Steen, som de Gamle have bygget, til at tørre Fisken paa. b) Svilitaarvæn, er en bekendt stor og fiskerlig Sø, oppe

oppe paa Fjældene imellem Baldjokel og Blaafæll (§. 833.), 1 Mil
 lang, og $\frac{1}{2}$ Mil breed. Den har sin Oprindelse fra Jisbjerg,
 og den store Elv Sviidaa, paa Sønderlandet, kommer derfra,
 uden at man kan see, hvor Vandet fra Jokelen styrtes ud i Søen.
 Den har en stor Mængde af Foreller, som Indvaanerne fra Har-
 næs-Syffel have fanget i forrige Tiider, da de Vinter og Sommer
 have været her oppe for at fiske. I Isen eller Mundingen, hvor
 Elven løber ud, skal det være bekvemmest at bruge Trækarn, og
 siden Egnen giver her deilig Græs, og Mængde af Angelik, hvis
 Rodder aartlig hentes fra Bygden, en 4 til 6 Milles Wei, kunde
 her gjerne sættes 2 eller flere Gaarde; i det mindste kunde her byg-
 ges Fiskerhytter, og Huuse til Tilflugt for dem, som vilde reise over
 Kiofsfældet om Vinteren. c) Harnæs-Syffel har i Bygden man-
 ge fiskerige Søer, hvoriblandt vi ville nævne Villingholtsvatn,
 Skoetiærn, Muletiærn, Laugarvatn og Apavatn: i disse 2de,
 og meest i den sidste, drives Fangsten med god Fordeel. d) Thing-
 vallevatn, beliggende høit oppe, nær ved Althinget, er den største
 færske Sø i Island, meget dyb, og anseelig forindevist Mængde
 af Fisk. Man har 5 til 6 Mile at reise deromkring. Egnen er
 beboet, og Bygden kaldes Thingvalle-Sveit. Indbyggerne fiske
 her Vinter og Sommer, deels med Baade og Angel-Liner, deels
 paa Jis med Dorg, eller smal Linie og liden Weedekrog, gjerne
 uden Madning. Der hænges en Pialt rødt Klæde paa Krogen,
 og en Messingknep, eller noget saadant glimrende af Metal, bru-
 ges i Stedet for Badsteen, thi Forellerne søge der efter. Fiskerne
 bruge her endnu en Maade, med store Angler, eller Kroge, som de
 lade synke ned til Grunden, giennem Isen om Foraaret, paa visse
 Weed, hvor der er mindst Dyb, saa at man kan see hvad der gaar

for

for sig paa Bunden: disse Kroge ere skarpe, og saa store at de kunne fange Fisken over Bugen, som, naar den seer det blanke Jærn, foommer derover, og lægger sig derpaa, rimeligst for at skrabe sig, hvortil Færkvands-Fiske, og især de af Laxe-Slægten, have stor Eyst. Fiskeren rykker da strax Fisken op med Krogen, som løber ind i Bugen paa den. Andre bruge 2de Kroge jævnfides, for at være des vissere paa Fangsten. Nogle binde hvide Torrfeskind paa Krogen, for at skule den, naar Fisken er bleven sney; thi den søger ogsaa denne hvide Farve, og synes godt om at ligge paa de bløde Skind. Overalt, naar der begyndes med Forellesfangsten paa Fisen, som endnu er tynd og giennemsigtig, blive disse Fiske bange, naar de mærke de bevægelige Skygger oven over dem. Derfor samle Fiskeerne Krattris paa Fisen, binde det sammien og giøre det fast, for at ligge paa, hver Mand paa sit Meed og kort fra sit Hiem; da Fisken, som mærker den stadige Skygge, trækkes derhen, og vil gjerne blive derunder, som et sikkert Vilmæsted. Saa som heele Thingvalle-Sveit er omringet ved Jordbrand, og fuld af Graun, saa har ogsaa Soen overalt i Bunden denne smæltede Steenart, ligesom Myvand, men den er langt dybere, saa at Indvaanerne finde, paa somme Steder, ingen Grund, nemlig hvor Klipperne have Rifter og Abninger. Uagtet denne foranstorte Kunst tiene Stedets Bønder til Livets Ophold, kunde dog dette Fiskerie drives endnu langt bæder og blive meer fordeelagtigt, hvis man overalt vilde bruge Sættegarn, ligesom ved Myvand (§. 703, 734 og 751). Den lille Elv Operaa falder i Soen igiennem Althinget; men en langt større, kaldet Sog, rinder derfra ned over den lavere Egn. Sandse er en stor Holm, som ligger midt i Soen. Denne De er høi, som et Bjærg. Svartbagen yngler der, og man samler

famler dens Æg til Spiise. En anden Holm er her ogsaa, hvorefter paa Jagle sægges Æg. e) Kort fra Havet oven for Ørbæk, ere nogle færste Søer, hvori de Gamle have bygget Holme, og loffet Ederfuglen derhen, for at sægges Æg. Denne Hellighed tilhører Gaustadbyes Præstegaard. Island viser endnu mangfoldige Kiendetegn paa de Gamles Gittighed og store Arbeidsomhed, og deriblandt dette, at de have bygget Holme hist og her, hvor Helligheden har villet tillade det. For Exempel: i en færst Sø kort fra Stadestad; og især ganske af nyt den Holm i Helgafells-Bælt (S. 450.), hvilken er udvendig opført af Tommer, saa at man seer endnu hvorledes Bælterne ligge. f) I Guldbrynge-Syffel findes ogsaa fiskeriige Søer. For Ex. Kleyfarvatn, kort fra Kriesevigs Svovelbjerg, hvor Naboerne havde skion Fangst tilforn, men som nu er nedlagt. Værevand og Viskstadevand give endnu nogen Fangst, og Urridavand ligeledes. Disse Søer ligge paa Indnæssene, oven for Kleyfevig og nærliggende Steder.

§. 838.

Alf Floder og Aar findes mange sonder paa, dog de færste i Rangaarvælle og Harnæs-Syffeler. a) Markersflor er nævnt tilforn, og ligeledes de tvende Rangaar. Lax og Ørreder løbe op ad disse Floder, og fanges paa nogle Steder af dem, som boe i Nærøarelsen. b) Thorsaa er en af Landets største Elve. Den har nogle Færgesteder og et Badsted, kaldet Nautavad. For Færgen betaler en reisende Person 1 Alen, det er 2 Skæ eller 4 Sk. Specie, og ligesaa meget for 2 Bagger, eller een Hestes Byrde. Hestene enten kødes og svømme bag efter Baaden, eller og, hvis de ere vant til slige Reiser og mange i Folge, drives ud i Elven, og svømme siden selv over. Slagter-Kvæg, som skal til Ørbæk,

§§§§

føres

feres ogsaa over paa Færgerne. Om Thiorsaaens Oprindelse er talt tilforn (§. 766). I den sigge fornemmelig 3de Der: den ovennævnte Aarnæs, Ølmodøse, hvor nogle Fugle lægge Æg, og Sagase; hvilken giver god Udgang for Heste om Vinteren. c) Imellem Thiorsaa og Hvidaa kaldes Bygden oppe i Landet Greppar, hvor de 3de Aar, Kalsaa, Store-Laxaa og Lille-Laxaa, give temmelig Laxefangst: den drives af Eierne, deels ved Trækkegarn, deels ved Laxekister, deels ogsaa (som de kalde det, og som paa mange andre Steder er brugeligt) ved Sting eller Lyster (§. 91. og 343.), med 3de røvhagede Brædder. d) Hvita, eller Hvidaaen, er den anden Flod af dette Ravn i Island: den har sit Udspring fra Hvitaarvatn, og dens nederste Deel imod Havet kaldes Ølvesaa, fordi den flyder forbi det Bygdela Ølves, og imellem samme og Floen. Hvidaaen er her saa stor, som nogen anden Flod i Landet; thi den tager til sig mange andre Elve og Bække, og deriblandt 3 saa store, at man maae gaae over dem paa Færger, nemlig Sliotet, som kommer ned fra Siældet vesten for Blaafell, og forenes med Hvidaaen, kort østen for Skalholt; og dernæst Brueraa, der falder i den kort vesten for samme. Denne Elv har tildeels sit Udspring fra Apavatn, og havde tilforn een af Naturen dannet Steenbroe, norden for Skalholt. Men det mindste Stykke af denne Broe er afbrækket for mange Aar siden: det repareres aarlig, og er ellers ikke større, end at en dristig Karl kan springe derover. Soget er den 3die store Elv, som dog ikke forener sig med Hvidaa, forend kort fra Havet. Hvita har en stor Mængde Lax, af hvilken Indvaanerne ikkun fange den mindste Deel, (undtaget hvad der fanges i Sliotet og Laxaerne), thi de kunne ikke, formeddelt Fattigdom og Mangel paa nødvendige Anstalter.

Denne

Denne Flod har 4 Der, nemlig: Tungese hoit oppe i Landet, hvilken er græsrig, Thengelsøse, lige for Bispestolen, uden Rytte, og endnu tvende smaa Holme neder imod Havet, hvor man faaer nogle Eg. Denne store Flod løber undertiiden over sine Bredder, og gior ofte stor Skade paa det flade og lave Land. Floen er meest underkastet saadanne Overfloommelser, og dette skeer helst om Vinteren, naar Elvene i lang Tid have ligget tilfroesne. Hvidaaen brækker da løs oven til, løber oven paa Isen, og saaledes sætter det ganske Bygdelav under Vand. Det er ogsaa truffet ind nogle Gange, at Thiorsaa ligeledes har lobet over alle Bredder, og til selsamme Tid, saa at de have forenet deres Vand, og søgt Udvei til Havet igiennem de laveste Steder. I saadanne Vandflode ere Creaturene ofte druknede, og nogle af Gaardene bleve satte under Vand, endskiont de fleeste staae paa høie Steder. Aarsagen er, nu en hastig Tøe til Fjælds, og Vandets overmaade Tilvæxt, da Nenden bliver alt for liden, og Isen er saa stærk at Vandet ei kan brække den op; nu at Nenden i Ølvesaa tilstyser neden under, saa at Vandet maae søge en anden Vart. Isen over Nenden sultner da ogsaa op, og bliver højere, ved Vandets Tilflod, hvorfor det kan breede sig ud oven for Ørebæks-Bygden, og denne Deel af Strandbredden, der staaer noget højere. Paa Hvidaa ere 6 Færgesteder, og eet paa hver af de andre store Floder. Færgeskonen er den samme, som paa Thiorsaa. De beste og største Færger ere paa Ølvisaa; og Færgemandene passé der bære paa Detallingen, end de paa de andre Færgesteder, da de Reisende ikkun meget sjælden ville eller kunne betale med Penge, men bruge allelags Varer, byde ogsaa saadanne, som ikke ere affættelige igen. Men naar en Reisende kommer til en Færge paa Ølvesaa,

og bliver afviist, fordi han ikke haver Penge eller tienlige Varer, da gaaer han til eet af de andre to Færgesæder, der ere nær ved hinanden, og imidlertid søger paa de Gaarde, der ligge nær ved Veien, enten at laane eller tilbytte sig gangbar Vænt eller Varer, som over alt ere antagelige. c) Raldaa er en siden Elv i Guldsbrunge-Epffel; den springer ud ved Helgasfæll, i den Bjerge-Nad oven over Havnefiorden, som kaldes Undirheidar. Efterat denne Elv har løbet et kort Stykke ned ad, bliver den reent borte, thi Grunden er her overalt hraunagtig og huul. Dette har givet Anledning til den Meening hos endeel Folk paa Sønderlandet, at Raldaa skulde løbe ud i Havet, jønden paa Pynten af Reskenæs, efter hvilken Formodning denne Elv er saaledes afslagt i det paa Kongelig Beføstning sidst optagne almindelige Landkaart over Island. Vel er det rimeligt, at store Vandfælde maae udstyrttes her i Havet, fra den udhullede Grund, fordi her gaar en meget stærk Strøm, lige fra Næset ud til de ovennævnte Der, og i stille Væir om Ebben, naar Fisserne vove dem her ud til (thi her er altid Døds nok for dem), da springer det søde Vand overalt op af Havet lige som Pistappe; Fisserne have og ofte taget det i deres Øskar, og drukket det for Proves Skjld. Men Raldaa fører alt for lidt Vand til at strømme saa stærkt herud, og dens naturlige Rende ligger ned til Havnefiord, den korteste Bei, en halv Mil, til Hvalpø, hvor man seer vandslidte Steene i en gammel Rende, og tillige en Bæk at springe frem af Hraun-Bækken og ud i Stranden.

§. 839.

Underlige
Søer og
Vandfælde.

Følgende Søer og Vandfælde, og iblandt dem nogle af de allerede opregnede, meenes at indeholde forunderlige Ting, nemlig:
a) Bær, et dybt Vandfæle i den Bygd Land, kort fra Heklefærd.

Stedet

Stedet er en udhulet Klippe, hvori den Bæk Galtatæk styrer sig ned. Vandet er nogle Favne dybt, og Graun i Grunden. Nabningen er kun 2 til 3 Favne breed, hvor Vandet hviroler inden i, og viiser sig i alle slags Skikkelse. Indvaanerne forsikre, at der ere seet mange underlige Skabninger, dog oftest kun to, og Manden, der viisede os Stedet, paastod, at han havde seet dem mange en Gang, imedens han var ung, i Form af en Rokke og en stor Hellefynder. Vi saae ikke noget sligt, og kunne derfor intet videre mælde derom. b) Om Thingvallavatn (§. 837.) mældes og, at der skulde i stille Væir være blevne seet, dog ikkun sjælden, uhyrlig store Skabninger at komme op over Vandet, samt megen Røg eller Damp, som Hvalblæst eller Hvalfiske-Pusten, at stige hastig op deraf. Aarsagen bliver her uden Tvil den samme, som til de foransorte Lufsfyner paa Lagarflot (§. 788. b). Egnen og Grunden i Thingvalle-Sveit synes meget læt at kunne frembringe saadanne. c) Hvítaa (§. 838.) er ogsaa bleven bekjendt af deslige Syner, baade i ældere og nyere Tiider. Ifær anføres ved Aaret 1595, at nogle af Sognefolkene, da de en Søndag Eftermiddag drog fra Skaltholtes Kirke, over denne Flod, paa Færgestedet, nær derved, skulde have seet en uhyrlig Skabning, saa stor, som et middelmaadigt Huus, komme op af Floden, og styde sig med stærk Fart et godt Stykke ned ad samme, hvor den igien duffede under: Hovedet beskrives som paa en Sælhund, Ryggen besat med høie Takker, og Dyret stumpet bag til. 1636, om Sommeren, saaes tidt en stor Drm, som ikke beskrives af nogen, imellem Arnerbøle og Oddgershøler, i Gloen; den kaldes kun Økynd, det er, en uhyrlig Skabning. 1702 kom igien tilsyne, paa den samme Flod og Sted, en stor rundagtig Skabning, som paa Ryggen lignede en

Sælhund, naar den vil dukke under, og har alt faaet Hovedet ned i Vandet. d) Der ere endeel færste Søer, hvor Indbyggerne sige, at Nicker skal opholde sig. Dette er alt for almindeligt, og vi have i Forveien sagt vor Meening derom (§. 745 og 78). e) Grænavatn, eller den grønne Søe, som ligger kort fra Kriseviig, er ei aleene mærkværdig for Farvens Skyld, som dog dens Dybhed maa foraarstaae, men og deraf, at Naboerne fortælle, at de have ofte seet forunderlige Skabninger komme op af den, hvilke dog ikke kun kort Tiid have ladet sig see over Vandet. En Mand forsikrede os, at han selv havde seet saadan en, dog kun siden af Bært, som lignede et Marsvin: men at dette Syn forsvandt strax igien. f) Om den færste Søe, Kleyfarvatn, har man dog endnu udførligere Efterretninger. 1755 fortaalde en især, at han for kort Tiid siden havde her seet en Skabning oven paa Vandet, af Skikkelse og Farve som en Kofke, men overmaade stor; ligesom alle vare eenige i, at de Skabninger, som man saae i denne Søe, vare baade større, end hine i den grønne Søe, og lode sig see en længere Tiid. 1750, da vi vare her, blev os og fortaald adskilligt om Kleyfarvatn, fornemmelig, at Naboerne turde ikke gaa der (endskjønt de vidste at Søen var fuld af Fisk, som sprang jævnlig op og legede i Vandet), for den Døms eller Slanges Skyld, som ridt og ofte lod sig her tilskjue; den skulde være sort af Farve, samt af Skabning og Størrelse, som en middelmaadig Hval, 30 til 40 Alne lang. Vor Rejsefører sagde, at han mange Gange baade i Selskab med andre, og aleene, havde seet og betragtet den, da den, de fleeste Gange, var bleven over Vandet henved 2 Minuter. Han lagde endog til, at adskillige Mandfolk og Fruentimmer, som vare her nær ved Søen paa Høeslæts Arbeide, i smukt og stille Solskinsveir,

1749 i Augusti Maaned, havde allesammen seet denne Orm langt hæder end nogen Tiid tilforn, i det den krob op af Vandet paa en Lange eller et lavt og smalt Næs, der gaaer ud i Soen, og blev der liggende henved 2 Timer, da den søgte Vandet igien. Folkene vare den heele Tiid saa bange, at de ikke turde nærme sig til Ormen; men siden den laae stille, flygtede de ikke derfra; dog kunde de ikke forklare, hvorledes den kom op paa Landet eller derfra igien. Men Meeningen blev denne, at den kom op, vorede eller forhoiedes saa uiformærkt, samt bevægedes frem ad, og derpaa forsvandt igien, eller var bleven borte, den Tiid de saae til Stedet. Vi have ellers indfort dette, aleene for at holde det imod, og bestyrke det, som er anført og sluttet i Forveien om Lagerfloden (§. 788).

§. 840.

Om hastig forsvundene Vandfalde fortælles her adskillige ^{Hastig forsvundene Vandfalde.} Tildragelser, som ere deels virkelige og sandfærdige, deels endnu uviste, og deels af samme Beskaffenhed, som nysonnæidte Syner. Vi ville kun anføre saa, men betydelige. a) Om forberæidte store Flod Hvidgaen fortælles almindelig, at den forsvinder i et Dieblis, paa et eller andet Sted, hvorpaa Vandet igien strax foreenes, og tager den sædvanlige Gart. De Islandske Harboger-Skrivere have anført nogle saadanne Tildragelser. 1694 fortælles omstændelig, at Naen blev tør den 19 Novembr., Osten til paa 2 Steder, nemlig ved Hren i Skeider-Hygden, og ved Brunestad i Gloen, dog aleene paa den Maade, at den ikke forsvandt tværs over, men vige de kun langt fra de østlige Bredder, saa at Grunden blev tør, et godt Stykke ud i Renden, og Folk paa det sidste Sted kunde gaae tørskode ud i en liden Holm, der ligger i Elven, og toge derfra, til Brevis, nogle Birketræer, som vorede der. Indbyggerne for-

undrede

undrede dem herover; det blæfede stærkt, skönt der ikke mælses, fra hvilken Kant, men Aaen brusede meget paa den anden Side. Hvor dybt Vandet har været, imellem Aabredde og anførte Holm, bestemmes ikke, uden alene, at der var bestandig ufsørt eller oreidt, det er, at man ikke kunde ride derover, uden at lade Hesten svømme, hvilket gaar nær ved Livsfare i de Elve, der have stærk Fart og føre meget Vand. Man kan altsaa anslaae den optørrede Rens des Dybhed til 4 eller 5 Fod. Aarsagen hertil bliver efter al Rimelighed den stærke Blæst, samlet med Luftens øvrige Beskaffenhed. Aarbøgerne mælde desuden, ved den samme Tiid, om usædvanlige Brændinger i samme Elvs Udlob til Havet og paa Drebacken. Især kaldes det *Utsog*, naar Hav-Vandet, i stærke Brændinger, trækkes langt ud, og bort fra Strandkanten, saa at denne bliver tør, undertiiden et overmaade stort Stykke, og en rum Tiid, indtil Vandet kommer igjen. Saadant kan sættelig være skeet denne Gang, da Elven imidlertid er løben ud, og bleven formindsket des meer, jo nærmer den var ved sit Udlob. Endelig have Exempler paa saa stærke og hastige Hvirvelvinde i Jsland, at de have optaget og bortført Vandet af smaa særste Søer. 1702 anføres i forbemældte Aarbøger, at Hvidaa mistede sin Fart, eller blev stille, etsteds kort fra Bispestolen, saa at den blev tør nær ved den Gaard Høen, da den ommældte Skabning (S. 848.), strax efter lod sig tilshyne. Dog fortælles dette ikke tydelig, saa at det synes, som et Slags tyk sammenpakked Dunst over Elven har giort, at Vandet syntes for Tisfluernes Dine, at være blevet borte paa det Sted.

b) Om *Soget*, eller den ovenmældte store Elv, som kommer fra Thingvallevatn og løber ned i Hvita, berette Aarbøgerne tydelig, at den blev ganske optørret 1532, saa at man kunde tage Fiske, nemlig

nemlig Ørreder og Foreller, i den tomme Nende. Der mædtes ikke om, hvad Tiid af Aaret dette skeede; ikke heller om Soen selv blev tillige formindstet, eller den Elv, som falder i samme fra Flødsdene; thi dette er og skeet tilforn, og det ganske naturligt, i en langvarig Tørke, som synes i samme Aar at have optørret Jorden over, alt der i Landet, da Senen, eller det forrige Aars Græs, og Skoven, skal paa mange Steder være bleven afbrændt ved de Ønister, der fløie ud fra Huusene. Ellers, siden den heele Egn, hvor Thingvalleratn og Søget ligge, er aaben, forbrændt og smelter, med dybe Rifter neder i Grunden, kunde Grunden tættelig, ved et lidet Jordstælv, være bleven forandret, og nogle underjordiske Gange have taget imod endel af Soens Vand: men ved Ørreaens tilbragte Vand, eller andre forborgne Vandsalder, er Soen snart tilvopen, og folgelig har Søget faaet sit Vandsald igien. d) Ørreaa (S. 837.) er nogle Gange virkelig forsvunden. Den er mindre end middelmaadig, og kan hastig være ved Regnvær, og formindstkes igien i langvarig Tørke. Det Exempel, der er skeet i MandssMinde, har een af os selv seet i Aaret 1740, da Elven blev i Althings-Tiiden ganske borte, saa at man en 8 Dages Tiid kunde daglig gaae med tørre Fodder over den imellem Consistorium og Althinget. Det artigste var, at den ikke tog til efterhaanden, som den havde aflaget, men fremkom en Morgenstund usfordømtlig og i et Dieblis, imedens det Tørrevær endnu holdt ved. Alle de, som vare tilstede paa Althinget, bleve forbausede og vidste ikke hvad der var paa Gærde, da der pludselig opkom et skrækkelig Bulder, i det Elven sprang frem paa nye oven fra Klipperne, giennem den snevre Wei, ned i Almannegiaa; men denne Frygt var strax forbi, da de saae, at det ikkun var Vandsaldet, som kom ned fra Kloften,

og fortsatte sit forrige Lob, hvilket det og siden haver bestandig holdt ved Ege. Torsken synes ikke at have været den Gang den eeneste Aarsag til Operaens Vortelblivelse: men der maa være fleet nogen Forandring i Fældene, hvor den har sit Udspring. Maaskee et Skredfald har stoppet Kilden til, og lukket Vandet inde, til det enten er vøjet over, eller har bortsfort det, som har staaet i Beien.

Hverer og varme Bade, især Reisen til Geysir og dens Beskrivelse.

§. 841.

Anledning til
Reisen.

Paa ovennævnte Reise til Jesland (§. 834.) 1750 besøgte vi og Bispestolen paa Skalholt, for at see de varme Bade, som ere der i Nærværelsen. Men vor fornemste Hensigt var dog at besee det over heele Landet bekiendte forunderlige Springsvand, som paa visse Tider om Dagen kommer op af en Klippe, 3 Mille i N. til O. fra Skalholt, i Høgedal. Dette Vandspring kaldes Geysir, hvilket betyder en, som i Brede eller Raserie tager meget grunt og hastig afsted, eller som i sin Fremgang viiser nogen usædvanlig Hæftighed. Nogle flere vandsprudende Hverer i Jesland betegnes vel med dette samme Navn: men det hører dog denne først og egentligst til, ligesom de andre ikke kunne komme i Ligning med den. Geysir findes beskrevet paa Latin i ovennævnte lidet Værk (§. 834.): men Forfatteren vilde nu paa nye holde Beskrivelsen imod Originale, thi Hukommelsen kunde læt have slaget ham feil, efter saa mange Aar; da han den første Gang ikke havde besøgt Stedet, i den Tanke at udgive Beskrivelse derover.

§. 842.

§. 842.

Omkring Skalhølt's Bispestol findes nogle heede Kilder paa ^{Hverer om-} adskillige Steder, men især 2 nær ved, østen og vesten for. ^{kring Skal-} Det ^{holts Bispe-} fornemste Bad har været vesten for, kort fra den Elv Brueraa ^{stol.} (S. 838). Det har været opbygget af Muursteen, men er blevet nedrevet i Biskop Arnesens Tiid, ved det Kilden, i et Jordstæls, var bleven forandret, og dens Veligheden forrykket. Det Bad, som bruges nu, ligger en liden Fierdingveis fra Skalhølt, paa et Sted kaldet Laugaraas, og er kun bygget slet og ret, af Jordsvær og Sten, paa en jævn Klippe, nogle Skridt neden for det Kaagende Springsvand, som samles i en Rende og falder ned til Badet, dog saa, at naar Badet er fuldt af Vand, flyder den heede Bæk forbi, ned til Hvidaaen, som her danner et lidet Aflob eller Biig, hvor Grunden er jævn og leeragtig, og Vandet kun 2 til 3 Fod dybt, og lunket; her bader man sig om Foraaret og Sommeren, naar det er varmt i Været. En heed Bæk, fra en anden varm Kilde, rinder ogsaa ned til dette Aflob. Denne Hver bruges til at kaage Mad i, fornemmelig Mælk og Rind, til at boie Splitter og Karbaand, samt til Dvæt og Balfen, med videre. Faars eller Ofte-Been, som her ligge paa Bunden, ere forbrændte. Vandet i begge disse Hverer er ellers klart, læt, og velsmagende, og Badet befundet at være sundt; det sætter ingen Skorpe, eller forvandler til Sten, dog er Dagens Lugt ikke behagelig. Endnu eet Kaagende Springsvand, kaldet Reykholtshver, ligger 1 Miil norden for Skalhølt; Høttet eller Bassen, hvori det ligger, kaldes deraf Røgholt, som ikke maae sammenblandes med den Præstegaard i Borgersfiorden, der har samme Navn (S. 178). Denne Reykholtshver opsprunder det Kaagende Vand, med Afvekslinger, 2 til 3 Favn høit,

og forvandler Træ og Urter til Steen, dog først efter lang Tid. Dens Vand sætter og en hvid kalklignende Skorpe, ligesom de fleeste andre Høerers (§. 225. 1c.).

§. 843.

Geyser.

Da vi komme til Geyser, var der Flod i samme, saa at det heede Vand flød over alle Bredder, hvorpaa vi inden kort Tid hørde under Jorden nogen Varm og langsomme Knald, hvorefter Vandet begyndte at springe: dog blev dens Opsprudning denne Gang kun liden; thi Vandet steg ikke over 20 Favne i Høiden, hvorpaa Klippen holdt inde, og begyndte siden igien nogle Gange, med mindre og mindre Hæstighed, til Nabningen var ganske tom; vor Vejviiser sagde og, at det var rart, at Geyser sprudede saa lidt og uordentlig. Skaalen eller Bækkenet i Klippen var ganske uden Vand; dog kunde vi ikke see ned til Bunden af den, fordi det nederste var fuldt af Røg, og Klippen heed, af den underjordiske Varme, eller af det kaagende Vand, der er i Afgrunden. Vi havde Lod og Line ved Haanden, og maalede Klippens eller Skaalens Dybhed inden i: den var 72 Fod, og Giennemsnidtet af dens runde Nabning oven til, 57 Fod; neden til, noget fra Bunden, var den kun 18 Fod, og allernederst, ganske smal, og dannet som en Tragt. Det som allermest satte os i Forundring, var, at da vi kastede Loddet ned igien, i Haab om at træffe de smalle Huller, der ere paa den øverste Bund, hvorigiennem Vandet først stiger sagte, siden voxer til, og endelig opsprudes, da kom der strax en heed Vandsprudning op af Klippen, og det var en Eykke, at den ikke traf os. Vi forsøgte anden Gang det samme, men i det vi kastede Loddet ned, kom der igien et Vandstød, saa at vi maatte springe tilbage. Vor Vejviiser blev bange herover, og vi kunde mærke



a. Is. hærge langt-borte. b. Lava-fell et lidet Biers bag Klippen. c. Smaa Vandt, som megenes at have forborgne Gange under jorden at samles under Gejser. d. Varme Bæde.



mærke paa ham, som vi og havde fornummet af andre, at det var ikke tilladt at randsage lige hemmelige Steder i Naturen, hvor der maaskee kunde boe mægtige Aander, som ikke kunde lide dette Slags Forvidenhed. Det lod ogsaa virkelig, som her var et fornuftigt Bæsen, som vilde herved forbyde os at udspæde dens Boelig. Men vi indsaae lettelig den rette Marsag hertil, nemlig at Grunden og Bandets Gart neden fra maatte komme i Vorden, saasnart der kom den ringeste Bevægelse i Luften, eller nogen Hindring i eller over de smaa Bandhuller, som ere paa Bunden. Disse kunde vi aldrig træffe, hvor ofte vi end prøvede det, enten fordi Loddet var for stort (thi det var 3 Tomme tykt), eller og at disse Gange vare alt for krogede: det sidste er nok det visseste, som vi og have erfaret det paa Øverevalle (S. 706.). Men efter den sidste uordenittige Bandsprudning, og de smaa derpaa følgende, som bleve foraar- sagede ved Lodets ofte igientagne Nedkastelser, holdt Geysrer inde hele Natten. Bandet steg meget langsom, og Skaalen blev ikke opfyldt, førend Klokken 4 om Formiddagen. Vi holdte os derfor i Nærværelsen, for at give Agt paa Opsprudningen. Imidlertid havde vi kastet ned i Klippens Bækken nogle Hælder og Steene af Concretis Thymarum, som her ligge overalt. Først hørde vi et stærkt dunkelt Knald under Fodderne, ligesom naar Kanoner affyres langt borte. Al disse Skud komme 5 i Ræk efter hinanden, alle større og større, og med det samme rykkedes Grunden haardt, ligesom den vilde opløstes og revne. Med det 6 Knald kom det første Bandskud vridt op af Skaalen, og siden ved hvert Skud, sprudtes Bandet stedse høier og høier op, alt i Epidser, da de nedkastede Steene, sonderlagsne i mange smaa Stykker, de største, som en knyttet Næve, bleve skudte op med, og det undertiden høier end

Bandet. Vi stode paa den Kant, som Binden kom fra, for at det kaagende Band ikke skulde giøre os Skade, og for at see desto noiere til; thi den Mængde af tyk Røg, som kom op med Bandet, havde ganske betaget os Synet paa den anden Side. Vi mærkede af Forstningen, at Bandet ikke aleene blev sprudet op ved hvert Skud, men tillige, at alt det Band, der var i Skaalen, blev ligesom opløstet, eller malet op, og ved denne Bevægelse styrtes det ud over alle Bredder, dog meest paa den nordlige Kant, hvor det faldt ned i en liden Dal, og samlede i en Bæk, der faldt ned forbi Stedet. Bandet i den er ganske heedt ved samme Tid, endogsaa et godt Stykke borte, hvor Røgets Bei falder over, hvorfor samme ofte bliver brændt paa Beenene. Bandsprudningen i Geyser var denne Gang en af de allerførste og hæftigste, som almindelig pleier at see; dog gik den, efter Diesynet, ikke nær saa hoit, som det lidet Viærg Laugafell, der staaer kort herfra oven for Geyser, og er henvend 70 Favne hoit. Bandsprudningens Hoide kan altsaa denne Gang omtrent regnes for 60 Favne. Derimod sige Indbyggerne, som daglig see Geyser, baade fra Høgedal og andre Gaarde, at den undertiden spruder lige hoit med Viærgets Top, og naaer dette træffer ind, venne de snart Regn og Bæst. Opsprudningen varede i alt i 10 Minuter; der vare 3 Secunder imellem hvert Knald; og folgelig gav Geyser denne Gang i alt 200 Bandskud.

§. 844.

Stedets
Natur og
Beskaffenhed.

Stedets Natur og Beskaffenhed kan tildeels sees af foromnævnte Latinske Beskrivelse; det hvori den synes at vige fra samme, er aleene følgende. Skaalens eller Bækkens Dybhed sættes der 3 Favne; men det bør forståaas aleene efter Diesynet, og om den overste

øverste og største Deel af Flabningen ned til Nogen, som altid flus-
 ler den nederste Bund. Skaalen siges videre, at være 20 Bayne
 i Omfærd, men det er kun at forstaae om dens Bredder udvendig.
 Hvad ellers angaaer Grundens indvortes Beskaffenhed, da er man
 ikke vis paa, enten det Vand, der tjener til Udsprængningen, kom-
 mer ned fra Bjældene, hvilket er den gamle, og maa skee mest an-
 tagelige Meening, eller fra Havet; ellers viiser den Efterretning
 om Geyser, som er indført i Mercure Danois for 1754, at dens
 Omverlinger ei have nogen fastsat Tiid. Klippen udvendig er til-
 vorren Tiid efter anden, formedest Vandets daglige Bæden, som
 efterlader en Art af de ovennævnte Tophis, der i Farve og Anseelse
 ligner den, som sætter sig paa Bunden af Theefiedeler, paa det nær,
 at den Tophus, som Geyser bringer frem, er meget haard, samt
 mere knudret og ujævn end hin, og ligger i tynde Lag oven paa
 hinanden; og deraf bestaaer denne heele Klippe. Det heede Vand
 forvandler til Steen, hvorpaa vi her faa mange Beviiser, frem-
 for paa andre Steder; thi Hverhælderne, her neden for Klippen,
 ere fulde af Urtestilke og smaa Virkegrene, heelt igiennem forvand-
 lede til en bleegfarvet haard Steen. Vi funde og, i Klippen selv,
 Urtestilke blevne til hvid Steen; og desuden nogle Træarter, Gaare-
 been og Knogler, samt Bæsteparer, alt forvandelt til en haard hvid-
 agtig Tophus; og endelig en Gaare-Stoe (Beener inden i Hornet
 af et Gaar), og endnu eet Been af samme Dyr, som syntes at være
 et afbrudt Stykke af osse sacro, med smaa Pileblade paa; men
 denne Tophus er finere, end de andre, som falde paa dette Sted.
 Geyser har og frembragt et meget artigt Stykke af samme Materie,
 som den Hveresteen, der falder fort fra Veyraa (S. 224.), med smaa
 Virkeblade paaegnede, hvori alle deres Traxler findes tydelig ud-
 trykte.

trykte. Bladene ere hvide, af et fint Hversteens Vorne, men Steen selv sieshyntlig bleven til Jordsinner. Saadan en Steen-Vorvanding er ingensteds funden uden her aleene.

§. 845.

Andre Høer
rer nær ved
Geyser.

Laugafell har en Dal midt oven paa, hvis Steene inden i ere overtrukne med en hvid gipslignende Hverestørpe. Vi ginge her op og saae det; men i Mands Minde haver dog ingen mærket her nogen Heede eller Røg. Besten for Geyser ere nogle heede Kilder, af hvilke 4 ere de største, og den længst borte liggende bruges til Døtt, og at vaske Badmet. Endte af dem have hote Bredder og meget dybt og stille Vand, som ei synderlig kaager op. Dybden er 6 til 8 Favne, og Vandet meget klart. Der fortælles, at den eene af dem er bleven kaldet Geyser i forrige Tider, da den daglig sprudede det kaagende Vand høit op i Luften: men at den, ved et hæftigt Jordskielv, er bleven sagtet, og ved samme Tid opkommen en nye Høer, hvor Geyser nu staaer. Om dette er sandt, vilde vi ikke; i det mindste strider det dog ikke imod Hverernes Natur i Island, hvilke forandres og forløbe dem saa tidt. Men om det er her virkelig gaaet saaledes, saa maae der være en forborgten Søe under den ganske Egn ved Laugafell, hvorfra alle disse Kilder trække deres Vand, eller have deres Oprindelse. At her maae være Jordsbrand, som ligger skjult og ulmer i Grunden, vilser den stærke Heede; det strider og aldeles ikke imod Erfarenheden, som er indført i Mercure Danois, efter nogle Mands Vidnesbyrd, som ofte have besøgt Geyser, at der, skiont ikkun skjult, skulde være sekte Jordsfunke at stige op tilligemed Vandet. Paa nogle af de omnævnte Kilder findes voren paa Bredderne, og ud over Vandet, den hvide Porcellain-lignende Materie, som ikke træffes nogensteds

paa

paa Landet, uden her og paa Hverevælle (§. 706). Her findes ogsaa nogle opkragende Leerpole, samt de feede og fine Jordarter af alleflags Farver, som der er maeldet om i Svovelbierget's Beskrivelse ved Nyvaan. Den røde Bolus er øverst og oven paa Jorden, med vitrioliske Alunblomster; dog kun i liden Mængde, lige som her og ikke findes reent eller modent Svovel. Under det røde Lag kommer det blaa, som er fuldt af smaa messingfarvede Svovelkugler; det er iblandt isprængt med hvide Strimler, og under dette blaa Lag kommer det gule hvidagtige. Disse Jordarter smage meget syrlig, og den hvideste Bolus findes i Bredden af nys ommældte Bæk, tæt ved Geyser (§. 752). Paa Høgedalsgaard, kort fra Kirken, er et saa kaldet St. Mortens Bad, som er meget i Brug og afholder af Indbyggernes. Nogle ville at Morten, den anden evangeliske Biskop paa Skalholt, skal først have bygget det; men andre sige, at det skal, i Kraft af et Mirakel, i gamle Dage være blevet tilegnet Martino Euronensi, som har været bekiendt overalt i Island, saaat man, indtil for kort Tid siden, haver drukket hans Minde i alle Brylluper og andre store Gæstebude. Naboerne fortælle om dette Mortens-Bad, at den herde Kilde skal paa en overnaturlig Maade være sprungen op af en haard Klippe, og gjennem en hvelvet Rende oven paa Klippen være falden ned til Badet; samt at Vandet har en overnaturlig legende Kraft, saa at der opregnes mangfoldige Mennesker, som skulde her være blevene helbredede. Dette maae staae ved sit Værd; men det er i Sandhed ret artig, at Vandet springer her ned fra Grunden, op igien nem en 2 Al. høi eller tyk, og 3 Al. breed, haard og tæt Steen, og løber derfra, oven paa Steenen, i en 2 Tommer vid aaben Rende. Man siger at nogle skielmske Drengs skal have afbrakket dens Hvelv:

olig; men det synes rimeligt, at Nenden heele Tiden har været aaben, som den er nu; thi den er af en anden Materie end Steenen; og tilloopen ved det heede Vands inkrusterende Kraft. Badets Vand er klart og uden mindste Affrag, og Badet selv baade sundt og behageligt; hvorfor Gode fra Nabobelævet besøge det jævnlig, og staae Tæst dets over. Græsset her i det Vandsskabs Grepper, mellem Hvidaa og Thorsaa, kaager stærkt og har en viid Nabning. Bakken, som ligger derfra, samles i et stort Badsted, neden for Ridsen; Hvoren er mærkværdig det, at Indbyggertne forskre, at de see det under Tiden Fugle, som svømme i det kaagheede Vand. Om dette er sandt, saaledes som det fortælles, da er dette visselig een af Naturrens Hemmeligheder. Men Naboerne ere ikke eenstemmige om disse Fugles Størrelse; somme sige at de ere som Ravnene, andre, som smaa Ender, og endnu andre, at de ere som Drosselfugle; der sees stæden flere end to paa eengang; Farven kunde de ikke rigtig beskrive, men de fleste sagde dog, at den var mørkagtig. Ved Thorsaa, norden til, kort fra den Bondeggaard Thorsaaes Høst, i en blødt Jordgrund findes et rødt Bad; opbygger i gamle Dage af flittkantede Grausteen. Det er 8 Fod dybt, 6 Fod breedt i en Sirkant, og haver neder i Bunden een Barne-Hull i hvert Hjørne. Det ene af disse Huller er tilstoppet, eller opfyldt med Jord, og Badet bruges nuomstunder ifkun meget stæden, da det dog er sundt og godt, uden al Stank, og meget tempereret. Det kunde være tjenligt for Indbyggerne, at betjene sig oftere deraf, især mod de Svagheder, som Uddantningens Forstoppelse forarsager.

§. 846.

Hverene
i Olves.

Hverene i Olves, et Bygdela i Larnæs-Eyssel, norden til ved Olvesaa, ere iblandt de fornemste og meest bekiendte i Island.

Stedet

Stedet er nær ved Næse-Kæde, hvor de heeder: Ståden springe op i og paa begge Sider af Elven, som løber her forbi. De 2de mest opkagende ere Geyser og Vadsstofa; den første er tæt ved Gaars den eller Næse-Kæde, og har taget grumt i stied med sin Vand spruden i forrige Lieder; men en Skæpholder, 60 Aln siden har oplyst og tilstoppet den med store Steene; saa at den sprudt nu kun lidt; dog med Alfværlinger; men den bræler stærkt. Ved det Våndet finder Modstand. Vadsstofet overmæler Vadsstuen, er fore neden for Geyser, i Alfværliden. Det kagende Vand springer op paa visse Stæder, 4. 6. til 8. Sæns høit; ligesom Værlighet er til; Vandspruden ligen, varer 10 Minuter; og holder inde lige saa længe; mens Vandet vover til; ligen. Det opkastede Vand falder mest inde i den i Elven. Når denne Dør springer; høier end sedvænlig, med megen Røg; og stærk Røgsten; vilde Ande hygger sig; at det inden fort. Tid vil stæse og vover. Paa den anden Side af Elven ligger 2de store og vidde Vånder, kastede Afgræver, fordi her have været Agte i forrige Lieder. Den sydliges Dyb er 12 Aln; og den nordliges 12 Aln; og de 2de. De ere de dybeste; 6. 9. til 12. Aln. De 2de. De ere som almindel høst ikke kage op; her dette besynderligt; da vi høstede. For det ved den første, at Vandet straks sank i den over 12 Fod; da det stod over Væderne i den anden; Rummet; imellem den over næppe 3 Sæns. Men for Næse liden ere og nogle små Vøse; som vi ved den samme Forandring i det vi lodde dem. Geyser, eller Sydere, kaldes en stor Høer fort fra Geyser. Hullet eller Staden i Klippen har intet Vånd; mest hygger dog stærkt; og Heben er saa hestigt; at Maboerne kage i en Høst Klod; Giff; Mæst og andet deri. Dette er atter noget Nyt; og især det, som vi bleve tillige forst

fredede om, at Måden faages der ligesaa hastig, som neder i Bæltet i de andre Hverer, og faaer ingen Affmag. Røgen, som Geyser der forer, og Måden bliver kaagt i, er og uden al Stank eller Svovelslugt, dog har den endeei opstigende Damp, hvilke ogsaa maae trænge igiennem og hielpe til Raagnningen. Heedens Grad i disse Hverer er snart overalt den samme, ligesom det er at formeeds om Vandets Løshed, hvilken vi ikke kunde maale, uden for saavidt, at de Hydromettra, som os vare tilsendte af Societetet, sank strax til Bunds i dem allesammen, hvoraaf vi saae, at disse vare iblandt de lætteste af dette Slags (§. 704). Fahrenheits Thermometer steg i Vandet til 182 Gr., og, i Røgen eller Dampene, tæt ved Vandet, til den gode, selgelig er Heeden i Olves-Hverene lidet stærkere end i den anden Røsthole-Hver (§. 555). I Badstues-Hverer kunde vi ikke bruge Instrumentet, fordi Vandet er der saauroligt. Heeden er og maafee der stærkere end i Krablande (l. cit. og §. 704). Af Steenforvandlinger findes her mangfoldige nær ved Hverene, dog kun i smaa Stykker, og fornemmelig Træ og Stiske af Urter, hvoriblandt vi opdagede forsteenede Blade af Gaafe-Urten, som vover her. De hvide gipsalignende Accreta ere her overalt. En fornustig Mand, navnlig Salsdan Jonsen, som henvend Aar 1700 har boet her paa Røst, og forfattet en Beskrivelse over Olves-Bygden, beretter iblandt andet, at der ved Hverene er funden Uld, bleven til Steen. Den fine Hveres-Jord, af samme Slags Farve, som den ved Geyser (§. 845.); findes her omkring nogle af de nordligste Hverer. Dens Nytte i Huusholdningen fortiener dog at anføres; nemlig, at naar Hverenes Naboer om Esters høsten have slagtet, og samlet ind deres Vinter-Forraad, saasom Skier, saltet Kød, samt i Eyre nedfystede Rundemaver, Kallun

og deslige, som Kvindfolkene behandle og giemme i store Kar, saa lægge de et Laag over hvert Kar, som de derpaa oversnøre med omsmældte Jordart, saa at Luften ikke kan komme til, da Maden bliver paa denne Maade meget godt forvaret. Den største Mængde af denne Jord findes omkring Geyser, samt desuden i endel Pøle, hvis Vand er tykt deraf, ligesom en Bælling, oftest med blaalig Farve; det skyder store Bobler op og buldrer derhos sørgelig; og somme Steder horer man denne Murren neder i Jorden. Af Svo-vel findes her kun lidt; dets Blomster sidde paa Klipperne nær ved det opkaagende Vand. Alun og Vitriol treffes ved de øverste eller nordligste Hverer, af samme Beskaffenhed, som det ved Myrvandet (§. 752.), dog ikke saa meget, at det kan forslaae til noget Anlæg. Afra-Hverer ere især blevene bekendte af de saakaldte Svrefugle (§. 845). Vi kunde ikke faae dem at see, hverken den første eller sidste Gang, da vi vare her, endskiont vi mange Gange begave os derhen, og biede nær ved Vandet en langsommelig Tiid. Men saavel de nu levende Indbyggere, som deres Forsædte, siges at have seet dem, baade paa disse Afrahverer, paa Grasarhøer, Hveren Eene i Guldbrynge-Syffel, og paa andre stige Steder i Landet. Nybemældte Halsdan Jonsen bekræfter og det samme om Olves-Hverene, at nemlig mange troeværdige Mænd, som vare nyelig døde, og nogle endda levende i hans Tiid, havde noie seet dem. Han beskriver dem viidere: at de ere af Skabning og Størrelse som en liden And, samt mørkebrunne af Farve over heele Legemet, undtaget at der sees en kiendelig hvid Ring omkring Dinene. De som leve endnu, og have seet dem, forsikke, at de ei alene somme, men og duffe under, og hvis man vil træde nær til, blive de en lang Tiid under Vandet, og komme undertiden

ikke op igien. De sees ikke jævnlig, men der kunne gaae 3 til 4 Maaneder imellem; nogle af Naboerne have og aldrig seet dem; de sees endelig ikkun paa visse Hverer, og det giærne de store og dybe, dog ogsaa om Vinteren. Enhver maa tænke hvad han vil om disse Hverefugle. Kun de færste i Jsland ansee dem for naturlige: thi nogle mene, at det ikkun er Indbildningen, som haver dannet dem, ved Hielp af de Skiffesker, som Rogen over Vandet undertiiden forestiller; andre derimod troe, at det er Spogelser; og nogle saa, meest gamle Folk, som vist nok have derine Meening fra de ældere Tiider, holde dem især for de Asrodes Stale, som skulde tage denne Skikkelse paa. Vi blande os ikke i dette Slags Trætter. At giøre et almindeligt Sagn, og saa mange troeværdige Mænds Diesyn, til Stet intet, vove vi ikke; og ville vi antage disse Fugle for naturlige, da muede store Bankeligheder, en skient de ikke opholde dem i det faagende Vand, men som de kunde paa for en kort Tid, og dukke under, for maaskee at krybe ind i nogle Huuler ude i Jorden, ligesom Rilde-Sviiinet (S. 346). Deres Fiædre, samt Næbbet og Fodderens haard skallede Huud, kunde maaskee taale Heeden, og styde Vandet fra dem. Men hvad skal man sige om Dinene? De maatte være af en nye og ubekendt Beskaffenhed. Man svarer: at en Salamander har ogsaa Dine; men de nyeste Estreeminger viise, at den ikke opholder sig i Jiden, men gaar kun eller tober en kort Bei igiennem den. Dog, den anførte Bankelighed er ikke den eneste. Man kan endnu spørge, hvorledes disse Fugles Blod maae være beskaftet? hos Fugle-Slægten er det giærne læt, og mange Soefugle kunne ikke dukke under for deres Lægheds Skjld; men man kan ogsaa soare, at Hverevand er lettere end noget andet Vand, og at Vender ere i Almindelighed tunge.

tunge. Heeden i Hverene bliver dog alligevel en meget stor Ban-
 skelighed; thi omendskiont Gaardene og Fuglen overalt kunde flyde
 Bandet fra sig, da bliver den dog deslægtig i Heeden, og naar
 Heeden enten i Lusten, eller et andet Element, hvor et Dyr opholds
 der sig, overgaaer den Grad, der er indvortes hos Dyret, da maae
 der doe; men dette er fornemmelig at forstaae om heede Dyr, eller
 dem; der have varmt Blod, et tveekamret Hjerter, og trække Lusten
 til sig. Vil man derimod giøre disse Fugle til Amphibier, da saa
 der maafee deres Biskelighed troelligere, og dersom de da blive
 virkelige Fugle, saa vilse de i Sandhed en meget stor og forunderlig
 Nyhed i den naturlige Historie.

§. 847.

Reyknaes-Hverer i Guldbrynge-Syssel ere og meget bekiendte. Reyknaes er overalt omtumlet ved Jordbrand. Der skal til-
 forn have staaet en Gaard, og man har talt om i disse Tiider, at
 indrette der Fiskeleier, fordi Stedet ligger beleilig dertil; men der
 er ikke Vand nok. Man seer der overalt forbrændt Graun og sort
 Sand; men deriblandt ere dog 3de smaa Leerbjærge, fiendelige og
 forskiellige fra den øvrige Egn; nemlig Hverholmar, Trasell og
 Vatsfell: dette sidste Sted giver lidet sumpigt Vand, hvilket samles
 ved Sne og Regn; og her kunde maafee graves en liden Brønd
 til Prove. Hverholme giver og ingen Hver med klart Vand; thi
 hvis det var, kunde Vand heistes derfra: men da her dog ere Leerpole,
 som ligne dem i Øies, saa maa man slutte, at her er Vand i Nær-
 værelsen. Disse Pole ere mange, og Leeret der kaager op, meget
 tykt, som smættet Metal i en Digel. Svovelst pebler op ved som-
 me af disse Abninger, i meget fine Aarer, og paa andre Steder
 sætter det sig Lagespis i tynde Hinder.

Reyknaes-
 Hverer.

§. 848.

Hverren Ene.

Hverren Ene kaldes en bekendt faagende Brønd, som ligger nogle Milie i N. fra Repkenæs, midt imellem samme og Krisesviig, hvilke 3de heede Steder ligge i lige Linie med Øibes-Hverene. Denne Hver, at forstaae den største, som egentlig fører Navnet, (thi her ere flere heede Spring og Vand-Aarer), er rundagtig og temmelig stor, 7 Al. i Siennemsiidte, og 4 Al. dyb. Vandet i den er ikke klart, men blandet med hvidt Leer, hvilket samles inden paa Bredderne, og hærdes der efterhaanden. Hverren Ene har faaet Navn deraf, at den ligger eene, det er alene for sig selv. Den er deri adskillig fra andre, at den saa tidt har støttet sig, og saa meget omtumlet Egnen i Nærværelsen, som viiser meget tydelig de mange Lage, der ere blevene frembragte deels i dens Omtumlinger, og deels imellem dem. I Særdeleshed har den dannet smaa Høie af hærdet Sten, bestaaende af adskillige Slags Sand- og Leers-Aarer, hvilke dog ikke ere eens paa alle Steder, fordi Grunden, som Hverren har støttet sig til, har været adskillig. Disse smaa Lag ere hvide, graa, blaaagtige og sorte; og det øverste altid besat med smaa Korn, af en hvidgraa Farve, ligesom de der oftest findes paa slige Steder. Her falde ligeledes nogle tynde Mellemag af guult meget fint Svovel. Egnen i Nærværelsen bestaaer af smaltede og forbrændte Materier. Man treffer ogsaa blandt de Lag, som Hverren haver frembragt ved sit Opkaag, smaltede Steene, der ere temmelig udpiinte. Sagle af samme Natur, som de sidst ommældte (§. 846.), siges og ofte at være seete paa Hverren Ene, hvilken da bliver den eeneste Leer-Hver, som har denne Siældsomsind at fremviise. De siges at dukke under, naar man kommer til Bredden, men beskrives her ellers noget anderledes, end paa andre Steder, nemlig,

nemlig, foruden at de ere ganske sorte, og kun som smaa Vender i Storfisken, at deres Krop skal være uden Fiædre, og Bingerne ganske smaa. Anderson (Nachr. v. Isl.) beretter om disse Høres fugle, i Anledning af Beskrivelsen over en Høer paa Nordlandet, at de ere sorte, og have lange Næb, som Snepper. Disse saa meget adskillige Beretninger kunne let gjøre den heele Sag mistænkelig, og for denne og andre, mest de seransorte, Narsagers Skjld, bliver den ikke antagen i Horeboms Tilf. Esterr. p. 60. Det er ikke at fortaenke, og vi staae endnu i Tvil. Ellers falder mig nu ind den Efterretning, som een af Høregaards Beboere i Ølvet har givet mig, at man ikke har seet Hørefugle paa Høreføer, siden Jordstiftet samme Steds 1734 forandrede Grunden, da de dog tilforn vare meget almindelige.

§. 849.

Krisseviig er bekiendt, endog i andre Lande, især for Svove, ^{Krisseviigs} Høer. Iets Skjld, hvilket den Jordbrand, som her ulmer i Grunden, driver op af Jorden, hvorfor det og samles her, til at føres ud af Landet, og er nu i nogle Aar, af det nye privilegerede Islandske Interessentskab, raffineret her paa Stedet. Det findes vel ogsaa omkring de heede Klæder paa de lavere Steder, men dog i større Overflodighed, hvor der ere lange Røgge af de farvede Bolis. Vi have allerede handlet om denne Sag i Anledning af Myvands Gynen (§. 752.), og Horebow (Tilf. Esterr. om Isl. p. 71.) har ligeledes givet en god Underretning derom. Derimod er det urigtigt, som Anderson beretter (i hans Nachr. §. 17.), at der er gediegen Svovel alle vegne i Island, da det alene findes paa disse to Steder, og paa et Par andre ikkun nogle smaa Prover deraf. Hørene i Krisseviig ere i en Dal, under høie Fjælde, paa en for-

brændt Grund. Fjældveien ned til denne Dal kaldes Ketilstiig; den er kort og temmelig steil. Paa den anden Side, under Fjælden, fornemmes ogsaa Varme i Jorden; der voper og liden Svovel, og der oven paa sees de mangsartede Boli, hvoraf dog den allerførste Mængde falder omkring Krisefvigs Hverer, saa at dette Sted giver ikke Myvands-Egnen meget efter deri. Der ere vel Både og varme Kilder med reent Vand, men kun ganske faa, imod de andre Hverer og Pole, der kaage op med tykt Leer, sammenvort med Vandet, hvilket er meget suurt og sammentrækkende, fordi alle disse Leerarter eller Boli holde Aluun og Vitriol, ligesom de ved Myvatn. Saavel disse Materier selv, som deres Lag, ere de samme, som hine paa Nordlandet (§. 752. 2c.); Aluunen spirer her i Blomster op af Grunden. Af den gipsartede hvide Steen (l. cit.), samt en violet, meget fin Bolus, som den paa Skardsheide (§. 202.), falder her ogsaa noget. Nogle af Hverene kaage neder i Grunden, endstønt Jorden er heel oven paa, og om man træffer paa saadanne Steder, løber man Fare for at synke ned. Men naar man seer sig noie for, mærker man gjerne et liden Hull, stönt ikke større, end at man kan putte en Finger deri, ersteds oven paa disse underjordiske Hverer. Horelsen kan og tages til Hielp; thi naar man er agtsom, kan man altid høre noget til Hverens Raagen igiennem den lille Nabving. Egnen deeles i to Stykker: det første er Zeimar-Namar, hvor Svovelet er; det ligger imod Sønden, nærmer ved Gaarden Krisfviig og Havet. Det andet er nordligere og oppe til Fjælds, og der er størst Mængde af Hverer, og der iblandt 4 de anseeligste: vi maaede den første, som kaager op med Blaaleer, og bruges af Naboerne til at bøde Eptitier og Karbaand; den er oventil 6 Alne dyb. Den anden er ganske nye,

Rangaaballe-Arnæs- og Guldbrynge-Syff. 899

nye, og allerførst opkommen om Vinteren 1754 og 55, da man fornam til Jordstikelv i Krissevig, saa at de, der vare i Svovels-Hyterne, bleve bange for, at Huusene skulde falde. Denne Hver sprang op 30 Favne fra den første, hvor Grunden var haard og tæt; den var, da vi saae den, Aaret efter, 6 Favne breed, rundagtig, og Dybheden 3 Favne. Den tredie er ikke heedere end saa, at man kan i en Hast stikke en Finger ned i Bandet; den kaager med hvidt Leer, og seer ud som Faaremelk. Den fjerde kaager meget hæftig, med stærk Røg, og ved den er det besynderligt, fremfor alle de andre, at Bandet vilser adskillige Farver, baade paa een-gang, og atter paa en kort Tiid den eene Farve efter den anden. Dette maae komme deraf, at den haver adskillige Lusthuller og Band-Aarer, der ligge i de mange Lag af uslige Jordarter, hvilke her falde røde, brune og lyseblaa. Den sidste er tydeligst for Smagen; de toende andre ere fine, og kunde ved Udlaugning, Slemning og anden Omgang blive tienlig til Leerkar. Af gamle Jordarter ere her og toende Forandringer, den eene lyseguul, og den anden dunkel: de ere begge fine og seie, især den sidste, hvilken er desuden temmelig bestandig i Tiden. Jordarter af de anførte Farver findes her ogsaa blandede, og ligesom de vare isprængte med Kunst. Krissevigs-Biaidet giver altsaa ret et arrigt Syn, formesdelt disse og andre Farver, tilligemed den opstigende Røg.

§. 850.

Laugarnæs er en Gaard og et Kirkested, mellem Repkeviik og Hver og Bad Bidee, som har Navn af Badet der i Narvarelsen. Hver^{paa Laugar-næs.} som den varme Væk rinder fra til Badet, er kaagheed, og fører en temmelig Mængde Vand, endssiont dens Vækken oven i er ikke dybt. Bandet er klart og tæt; dog sætter det paa Hverens Bred-

Rxx xx 2

der

der noget af den hvide Materie. Badet er temmelig stort og dybt: den heede Bæk falder deri; men den tager og koldt Vand til sig, hvorved Heeden tempereres; dog er det Vand, som løber ned derfra, forbi Gaardens Tuum til Stranden, ligeledes varmt. Man haver altsaa, neden for Badet, 2 til 3 andre Steder, som ere bekvemlige, og bruges til at bade sig i, naar det øverste Bad er for heedt om Sommeren, eller naar der ere mange Folk paa eensgang; thi Laugarnæs besøges meget, for dette Vands Skyld, fra de mange omliggende Gaarde, og især af de Færende fra Holmens Havn, og af Haandværksfolkene i Reykniig, om Loverdags og Søndags Aftener. Paa Bunden af de lavere Badsteder treffes ofte Aal, deels levende, naar Vandet er kun lunken, deels ogsaa døde, naar de af Banvare løbe ud i Badet, naar det er for heedt, fra Vands Narerne paa Siden, hvor de jævnlig opholde dem; thi Grunden er her overalt løs og myragtig. Her fanges ogsaa temmelig store Aal, men det er mærkværdigt, at de gamle eller suldvorne findes aldrig døde i det heede Vand, men kun de smaa eller unge, som ikke have endnu lært at tage dem vare for Heeden. Saavidt om de fornemste Hverer og Bade paa Sønderlandet: det eneste i Riosar-Syssel er omtalt i det første Stykke (§. 10). Drillevandet paa Sønderlandet er af alleslags ligesom i Vørgersfjorden, dog sædvanligst som det i Riosar-Syssel (§. 9). Paa Rångervalle er ofte Mangel derpaa, paa visse Steder.

Lusten og Værliget.

§. 851.

Værliget i
Almindelig-
hed.

Om Lusten og Værliget er overhovedet det samme at sige, som i Riosar-Syssel, især paa den Kant fra Bidee til Havneshjorden.

De

De skarpe eller gienientkrængende Vinde (§. 11.) viske meest paa Søekanten, især i Guldbrynge-Syffel. Strandklipper, som ere forædte af Lusten, sees paa Bidoe. Nister (§. 15.), som her er almindeligt, kommer med øst og nordøstlige Vinde, og gjør allerstørst Skade paa Kangaavalle, og dernæst paa de høie eller tørre Steder i Narnæs-Syffel; i det den sorte Sand fra Hekla og den omtumlede Jordbrands-Egn falder saa tykt paa Tuunene, at man maa med meget Arbeide, skuffe den bort fra Huuse, Gaarde og lave Steder. Al Værligeth er jævnt mildere paa Sonderlandet, end andensteds i Jsland, er en almindelig Meening; som aldrig har været tagen i Vil. Vi ville og tilstaae det for meere end Halvparten af Tiden; men vi maae dog derhos mælde, at det er ikke rart, at jo Væiret falder godt i andre-Egne, naar det er slet paa Sonderlandet; ja der ere tidt indfaldne heele Vintere og Aar, som have været bærdre vester og øster paa, end seilder paa Landet. Den betydelige Forskiel, der er imellem Væirligeth nord og sonder paa, med sydlige og nordlige Vinde, kan sees i det 5te Stykke (§. 709.); sydlige Vinde falde her gierne fugtige, endskiont man ikke veed meget af Taage at sige. Erfarenheden viiser og, at Lusten paa andre Steder i Landet, og især nord paa, er nok saa sund, som her. Hvad ellers Horrebow, i hans trykte Meteorol. Observationer, mælder og slutter om Jsland, af den Erfarenhed, han selv har faaet paa denne Kant, at der nemlig ikke er nær saa slet eller haardt Væirlig; Frost, eller Kulde, som Fremmede tænke, og den gangbare Meening om den umilde Himmel-Egn kunde føre med sig, det er og bliver en unægtelig Sandhed. Der ere især to Ting, som forstille Jsland, og ligeledes Sonderlandet, usfordelagtigt i denne Henseende for Fremmedes Indbildning. Den første er Hav-

Isen, tilligemed det ubehagelige og haarde Værlig, som den fører med sig (§. 645. og 710.). Den anden er Blæsten, hvilken i dette Land er langt meer almindelig, end enten i Danmark, eller andre flade og lave Lande, ja almindeligere og jævnligere, end i de bjærgfulde, som Norge og Sæere. Denne stærke Blæst kommer dog ikke meget ofte, og varer meget sjelden længer end en halv eller heel Dag. Hvirvelvinde ere her meget rare, og de store Orkaner, som i andre Lande have saa meget skrækkelige Virkninger, falde næsten aldrig i Island. Derimod er i Island ikkun meget sjelden saa aldeles stille, at det ei skulde blæse noget. Middelmaadig, og stærkere end middelmaadig Blæst er der almindeligst; og dette dæmper Varmen saa meget, og gjør Lusten saa tielig, at Fremmede, som i deres eget Land ere vant til stille Væir, liden Blæst, og ubehindret Varme i Lusten, synes at erfare, ligesom de og meene og paastaae, at den Islandske Himmel-Egn er umild; endskiont Græs og Urter, i det de trives og opdrives bader i Island ved Blæst, end ved stille Væir, kunne overbevise dem om det, som er toertimod. Aarsagen til de jævnlige Vinde i Island er ellers Landets Beskaffenhed, og især de høie og lave, og overalt med Dale afvejlende Bjærg, samt Havet og Lusten, der bevæges frit omkring Landet, og endelig de hemmelige Trækhuller, som findes overalt i Landets aabne Grundvoide.

§. 852.

Meteorologiske
Observationer.

Saa længe vi vare i Island, nemlig fra 1752 til 1757, gjorde vi daglig, endog paa Reisen, men især om Vinterne, paa Sønderlandet Meteorologiske Observationer. Vi holdte en Dagbog derover, og skikkede eet Stykke for hvert Aar til Videnskabsnæs Societet. Disse Agtpaagivelser handlede vel meest om Lusten

og

og Bærliget, og derhos om Nordlyset og alleflags besynderlige Luftsyn; men dog tillige om Aaringerne, og Indbyggernes Tilstand, samt om den Tid, naar Trækfuglene lode sig først see eller droge bort, naar visse Urter spirede frem, blomstrede, eller ginge ud, og andet meere. De, som hørde til Lusten og Bærliget, udgjorde dog den største Deel, og til disse brugte vi Thermometra, Barometra og Anemometra. Vi førde desuden Brevveplinger om denne Sag med andre længer borte. Fornemmelig holdt Provsten Hr. Thorgerfen, i Guldbrynge-Syffel, paa hans Præstegaard Garde ved Havnesfiorden, en rigtig Dagbog over de Baroscopiske Observationer, hvilcke han gjorde med et Instrument, som vi havde skicket ham; samt tillige forfattede en rigtig Optegnelse over Været og Vindene hver Dag. Velbemeldte Provst har vedligeholdt dette sit Arbejde til nærværende Tid. Den een af os, nemlig Eggert Olaffen, da han sidste Gang var i Island, gjorde ligesledes sammeslags Observationer, paa Vesterlandet, fra Novembers Maanedes Begyndelse 1760 til Augusti-Maanedes Udgang 1764.

§. 853.

Det almindeligste om Sneede og Kulde paa Sønderlandet er mældt i det første Stykke (§. 12). I den Tid vi opholdt os paa denne Kant, er vel, efter Thermometeren, undertiiden falden skarp Frost, men dette skeer gjerne ikkun i klart og stille Væir, ligesom paa andre Steder, og staaer de fleeste Gange ikkun en kort Tid; overmaade stærk Frost med Væst og skyet Luft, faldet kun imod Foraaret, i Februarii- og Martii-Maaneder, og kan vare 2 til 3 Dage. Aarbøgerne berette, at Vinteren var saa haard Aar 1348, at Havet fros rundt omkring Landet, saa at man kunde ride fra et Næs til et andet, og at alle Flode vare tillagte med Iis.

ren

ren 1755 var temmelig stærk paa Sønderlandet, især i Februaris Maaned, da Thermometeren, den 22. i samme Maaned, faldt til den 7 Grad. De andre Vintere var Frosten ikke saa stærk, nemlig, 1754 den 13 Jan. 9 Grader, den 13. Febr. 8 Gr., den 14 Martii 11 Gr., den 6 Decembr. 11½ Gr.; om Vinteren 1755 var den, den 12 Febr. 14 Gr., og den 11 Decembr. 12 Grader. Denne Sommer, sidst i Maa-Maaned, fros dog 1 L. 3 Lin. tyk Is paa Bandet om Ratten hjemme i Bygden ved Strandkanten paa Sønderlandet. Hav-Zisen bringer ogsaa Frost og Kulde til Sønderlandet, endskjønt den ikke kommer det nær. Dette er erfarret utallige Gange, endog naar den ikke eengang er kommen forbi Østerhorn eller Jugsbiærget, men haver kun ligget midt for Nordslandet; dog har den naturligvis vasket endnu hæftiger, naar den har overskredet bemældte Grændser; og allermeest naar den er kommen til Sønderkanten selv, hvilket, efter Aarbogernes Vidnesbyrd, er skeet nogle Gange i de senere Tider, s. Ex. i Aaret 1615, da den saaledes omringede hele Landet, at man fangede Både, Sæle paa den, sonder paa Næsene; en stor Mængde Bjørne kom ligeledes den Gang til Landet, og nogle af dem bleve og dræbte sonder paa; endel store Skibe, som man blev vat uden for Landet, bleve borte sammesteds med Folk og alt. 1639 belagde Hav-Zisen den største Deel af Sønderkanten, nemlig often fra til Kysten eller Nalstrømmen sammesteds, hvilken vel forde Zisshykkerne ud til Havet, men noget af dem drev dog op igien vesten for Næsset. Aar 1683 kom Zisen often fra til Grindevigs Havn. 1695 belagde den igien hele Kysten paa Sønderlandet, lige til Borgerfjorden, saa at man kunde gaae tvert over fra Alkenæs til Holmen; nogle Skibe bleve borte i denne Zis, ligesom og Mandskabet fra et fransk Skib,

og et andet fra Skotland, gik over Zisen ind til det faste Land. I disse sidste Aaringer naaede Zisen 1756 til Repkenæs, og 1759 til Grindeviig. Det er ellers mærkværdigt, i Hensigt til Strømmene, at Hav-Zisen altid er kommen til Sønderlandet oftest og ikke, vesten-fra. Forbi Fuglebiærget er den kun meget seldten kommen til Bred' stor den (§. 645).

§. 854.

Lustens Tyngde og Bevægelse viiser i Jøsland meget større Forandringer, end de foransatte Ting, og endnu større Forskiel ^{Lustens Tyngde og Bevægelse.} imellem den Danske og Jøslandske Himmel-Egn. Denne store Forskiel i Lustens Tyngde eller Barometrets høieste og laveste Stand, har N. Horrebom allerførst opdager (see Tilføit. Esterr. §. 476). Han fik paa Væststed 2 Tommer og 5 Linier: vi have og paa Biddøe nogle Gange faaet dette, og derover. 1755, den 18 Jan., saldt Kvægsølvbet til 26 Tom. 10½ Linie, og steg igjen den 28. i samme Maaned til 29 T. 4 L., saa at den heele Forskiel blev denne Gang 2 Tommer og halvsiette Linie: men den som vi mærkede 1756 og 1757 blev endnu større; thi det første Aar, den 17 Decembr., sank Instrumetent til 26 Tom. 9½ Linie, og steg igjen, den 4 Martii Aaret efter, til 29 Tom. 6½ Lin., saa at Forskiellen bliver 2 Tom. 9 Lin. eller 2½ Tomme. Den allerførste Forandring er dog mærket paa Væstlandet. Barometeren saldt der den 27 Jan. 1762 til 27 Tommer og 8 Linier; men den 7 Febr. samme Aar steg den igjen til 30 Tom. 3 Lin., det er 2 Tom. 10 Lin. Siden den nu Aaret tilføit, nemlig 1761 den 11 Jan., steg til 30 T. 4 Lin., bliver den største Forskiel, som hidindtil er funden i Jøsland, 2 Tommer og 1½ Linier, eller 3 Tommer mindre 1 Linie. Vindenes største og mindste Kraft er ikke forsøgt uden paa Sønderlandet.

Vyy yy

Man

Man kan dog gjøre sig Sturninger deraf; thi det er rimeligt, at der ikke falder stærkere Blæst paa eet Sted, end paa et andet. For at viide denne Lustens Bevægelse, lode vi forfærdige et Anemometer eller en Vindmaaler, efter Wolffs Forskrift i hans Aerometrie, og erfarede derved, den 14 Februar. 1756, da der var paa Sønderlandet en overmaade stærk Blæst af Sydvest med Sne og Hagel, at Stangen oploste 10 Pund 14½ Lod til den 86 Grad. Den 10 April samme Aar kom den anden hæftigste Storm, som vi mærkede til i dette og det efterfølgende Aar; den blæste af Norden, med Drivestyer og Solskin; man kunde ikke gaae imellem Huusene, men maatte krybe frem: dog var det ingen Hvirvelvind, men en stadig Blæst. Axelen oploste denne Gang 11 Pund og 23 Lod til den 90 Grad. Lustens følgeslignende Fart over Jordens Overflade var denne Dag besynderlig; alle saae den, og meenede, at det var Driveregns fra Haver; thi Solen skinnede, og denne Driveregns er almindelig ved Søekanten i Jsland, naar det blæser stærkt, da Jorden bagefter bliver hvid, ligesom af Rimefrost. Men vi mærkede denne Gang, baade af det, at Vinden kom fra det faste Land, og tillige deraf, at den voldsomme Blæst trykkede Bølgerne ned, og gjorde Søen jævn, at det var ingen Driveregns, men kun Lustens Bevægelse, som lod sig tilskyne i Solskinnet. Forsøge paa den sagreste og mindste Blæst i Jsland ere disse tre. 1756 den 25 Jan. var klar nordlig Lust, da Møllen løste 2 Punds Tyngde til 45 Grader. Den 16 Julii samme Aar, med liden Vind af Sydpøst, løste den kun 1 Pund til 45 Gr., og to Dage for, nemlig den 14de, et halvt Pund til den 30 Grad, hvilket er den sagreste Blæst, som vi kunde maale med dette Instrument. Den Ruuling, der er mindre, regnes for Logn, eller stille Vær,

Væir, i Island, og indfalder kun sielden, undtagen en Times Tiid eller en liden Deel af Dagen. Blæva-Logn i Luften og Svita-Logn paa Havet, hvilket da er blankt som et Speil, varer meget sielden en halv Dag, eller fra Morgen til Aften.

§. 855.

Om Nordlyset vilke vi kun anmærke dette, at det sees meest Nordlyset. i Island om Aftningerne indtil Kl. 12, saa at det treffer tiid ind, at det, efter den Tiid, ikke kommer til Syne, endskiont Luften bliver klar den heele Nat; dog er dette alene at forstaae om maanlose Nætter, thi i Maaneskin, især naar Maanen er nær ved at blive fuld og gier lyst paa Jorden, sees ei gierne Nordlys. Ellers hændes det dog iblandt, uagtet Maanen er klar og lyser godt, at Nordlyset ogsaa kommer frem langt borte, og nærmer sig til den, dog des svager, jo nærmer det kommer. 1753 den 18 Novembr., Kl. 7 om Aftenen, kom Nordlyset i S. D. op paa Horizonten, og gik først i en lys Bue til N. B., men bredede sig derpaa ud i en Haft over heele Himmelen, med usædvanlig stærk Lysning. Det mærkeligste var, at det forsvandt nogle Gange i et Dieblif, da man ikkun mærkede et lidet Glimt deraf neder ved Horizonten i S. D.; om Dagen havde været stærk Blæst, som lagde sig Kl. 5 Efterm. Frosten var begyndt een Dag tilforn, og blev derpaa saa stærk, at Havet, Dagen efter, var tilfrussat inden for Verne. Binden var denne, og efterfølgende 8 Dage, nordostlig og stille, undtagen den 23 og 24. 1754 den 18 Decembr. var, den heele Dag, stærk Blæst med Hagelbyger, og allerhæftigst om Aftenen og Natten derpaa, da det tillige tordnede og lynede forstræffelig; imellem Bygerne var klar Himmel og Maaneskin, og Binden S. S. V. Da kom ogsaa Nordlyset til Syne, og var meget stadigt: det gik fra

Vest-Nordvest, i mange smalle lyse Buer, først op til Zenith, og derefter ned til Horizonten i N. N. O. Dagen efter (den 19de) var samme Veir, med Lynild, og endnu stærkere Frost, men ingen Torden. Dog Nordlyset havde endda den samme Skikkelse, som Aftenen tilforn. Aaret 1755, den 9 Dec., var siden østlig Blæst, og om Dagen klart Veir og Solskin. Kl. 9 $\frac{1}{2}$ om Aftenen færes det temmelig, og Maanen skinnede i V. S. V., da Nordlyset pludselig sprang op i V., og deelede i 2de store Buer, gaaende ganske højt over den nordlige og sydlige Horizont, indtil de stødte sammen i D.; den ganske Himmel oven over var uden Nordlys: dette var rede 2 Time med stærk Lysning. Men Kl. 10 kom en Bue op fra D., som gik over Zenith til V., og brejede sig alt meer og meer ud, indtil den indtog den ganske Øvre-Himmel med en flammende Gld og klar Lysning Kl. 11 $\frac{1}{2}$; dog saae man endnu Himmelet knækket: dette Lys og forbermældte Ring der laae omkring Horizonten. Kl. 12 var alt Nordlyset borte, undtagen den store Ring, der holdt endnu ved en Times Tid, spillende med stærkere Lys paa den nordlige Side. 1756 den 1 Octobr., da Vinden var fagte af N. V., med klart Veir og liden Frost, saae man først en tyk, middelmaadig lys Bue, der gik op fra V. til Zenith, da der igjen udgik fra Midten af samme til N. en lys Spids i en ret Vinkel, som deelede sig igjen i tvende Spidse. Saadant et Syn af Nordlys saae vi hverken for eller siden. Kort derefter trak Nordlyset sig til den østlige Himmel-Egn, og spillede der stærkt med en klar Lysning; det blev alt tykkere og høiere med mange bolseformede bævende Buer, som stode sig meer og meer paa begge Sider til S. og N. Fra Kl. 9 til 10 formindskedes Lyset igjen og blev ganske borte, og Kl. 11 blev Himmelet skyet. Dette Lustsyn saae vi paa

Bredø

Breedemarks-Sand. Den 25 Octobr., samme Aar, var en liden sydlig Blæst, og temmelig klart Veir med Solfin, uden Frost, og de efterfølgende 3 Dage var Regn. Nordlyset kom frem Kl. 7, med en lys Bue fra V. til N., 10 Grader høit over den sydlige Horizont; men den blev efterhaanden tykkere og høiere, saa at den Kl. 8 indtog den halve Deel af Himmelen, nemlig den sydlige. Kl. 9 fik Nordlyset en rar Skikkelse: det gik i store Straaler, som flammende Pyramider, ned til Horizonten paa alle Kanter, dog med den stærkeste Lysning, omvejlende, nu i N., nu i V., og beholdt denne Skikkelse en halv Times Tid. Kl. 10 var den allerstærkeste Lysning overalt paa Himmelen, og i en Hast kom der Regn, som dog snart gik over, da Nordlyset kom til Synne igien, men meget dunkelt, og blev saaledes ved heele Natten, dog usladigt og uordentligt. Aaret 1757 den 7 Febr. spillede Nordlyset meget artig sonder paa. Værtiget var smukt og klart i disse Dage, med mildelmaadig Frost og Ost-Syds-Vinde. Nordlyset begyndte Kl. 6 om Aftenen, først over den nordlige Horizont, hvor det kom hastig frem og spillede med usædvanlig stærke Bevægelser, dog uden nogen vis Figur. Kl. 7½ var det allerstærkest, da Himmelen overalt fra S. til N. stod ligesom i Baal og Brand, lige op til Zenith, med en hoi purpurred Farve, hvormod Resten af Himmelen var jævnt besat med opstaaende klart lysende Flammer. Dette Luftefy, hvis Lige vi ikke havde seet tilforn, varede neppe 5 Minuter; thi Nordlyset stoi i en Hast til den nørdlige Horizont, hvor det spillede til Kl. 9 med ulige dannede meget lysende Jidstotter. Det forsvandt der i en Hast, og fra den Tid kom det ikke til Synne om Natten, skönt Himmelen var klar. Dagen efter var samme Veir sig, og om Natten var Nordlyset uordentligt: det stød sig op i store

og smaa jævnsides gaaende Flammer, ligesom Jdsstuer; de efter følgende Dage var ustadigt Vær med Blæst, Regn, Sne og Hagel. Heraf kan da Læseren see, hvor foranderligt Nordlyset viiser sig i Jsland. Det er meget rart at see det stille, eller Himlen rød overalt deraf, uden mærkelig Bevægelse, som det er bleset seet i de sydligere Lande i Europa. Men ofte spiller det med guule, grønne, og purpurrode Flammer paa eengang, nu i Epidese, nu Volgeviis. Magnetens Forrykkelse, under stærkt spillende Nordlys, have vi vel fornummet, dog ikke ofte eller tydelig; thi den Magnetnaal, som vi havde ved Haanden, var hverken levende nok, ikke heller dannet til dette Slags Observationer.

§. 856.

Udførlige
Lufthjerner.

Om andre Slags Lufthændelser er fornemmelig følgende at mærke: a) Rosabaugur, eller Uvæirs-Ringen omkring Naanen, er almindelig i Jsland, og betyder gjerne stærk Blæst med Regn eller Sne: jo større den er, des haardere Vær siges den at betyde. Derimod holdes det ikke for ondt Tegn, naar man seer, med klar Himmel og stille Luft, en stor lys og udbendig liden rød-gul Ring om Naanen. b) Ziaa-Soler eller Vi-Sole, Parhelii, sees ofte paa Sønderlandet og andensteds. Naar man seer to, een paa hver Side af Solen, som meget lyse Abninger, kaldes det Ulfakreppa, hvilket Ord har sin Oprindelse fra Hedenkabet, og forklæres saaledes i Edda, at der ere to Ulve, der forfølge Solen, som flygter hvor den kan, men bliver dog tilsidst opsluget af den eene, hvorpaa Verdens Undergang umiddelbar skal følge: men nuomstunder forklæres dette alene om Værliget. Thriar Soler, eller tree Sole, kaldes især det, naar de to saadanne Vi-Sole skinne stærkt og i Runding, lignende den rette Sol; og naar dette

dette sees ofte i Nad, meenes det at betyde store Ting. Nin So-
ler kaldes det, naar der synes omkring Solen 9 saadanne Vi-Sole.
Det agtes ogsaa som et Tegn paa noget betydeligt Tilfaelde: men
de fleste sige dog, at det aleene betegner Lustens Kulde og Aarstii-
dens Strængighed. Saaledes findes optegnet i Landets Aarbøger,
om den strænge Hav-Fis-Vinter 1615, at Solen, naar man saae
den, havde de fleste Gange een, to, ja tidt og ofte 4, 5, 6, 7,
8, og nogle Gange 9 Vi-Sole, hvilke giærne havde Ringe uden
om, ligesom Rosebuer, samt at man ofte blev en Regnbue vaer,
lige imod eller over for Solen, endskiont det var karp Frost, og
temmelig klart i Været. Om Vinteren, i middelmaadig Frost
og godt Væir, sees imellemstunder en stor Ring omkring Solen,
af Farve som en Regnbue, dog smallere og ikke saa tydelig.
c) Viiga-Synsttur, eller Drabs-Bold, kaldes saadant et ildag-
tigt Lust-Syn, som vi have beskrevet i Reisen til Oster-Foklerne
(§. 775). Det er blevet seet viffe Aar i Nad, og hoit oppe i Lus-
ten, paa Sonderlandet; og Almuen tænker, at det betyder Krig
og Mandslæt i andre Lande. Naar saadant Lys er langagtigt,
dog derhos bestandigt, ligesom det forste, kaldes det Viigabrande
eller Nordsværd, og meenes at betyde det samme. De Uvidende
have blandet disse Lustsyn med Halestærner eller Cometer, hvilke
ogsaa anfores i de Islandske Aarbøger. Aaret 1595 saae man
mange saadanne Lustsyn over heele Landet; de ere blevene seete i Form
af Drager, skiont ikkun meget siælden. Ellers er det ikke rart at
see saadanne Lys i alleslags Skiffelser, naar der ere Jordstælv-
og Jidsprudninger. d) Løst-Aldur eller Lust-Jld, af samme
Art og Virkninger, som den der er nævnt i det 5 Stykke (§. 711.),
er ikke rar paa Sonderlandet. Den har endog undertiden gjort

der

der nogen Skade; og man holder for, at den er kommen fra Heklesfiærdet, thi der i Nærverrelsen sees ofte allehaande ildagtige Skæfeler i Luften. Denne Lynild skal to Gange have afbrændt Skælholtets Domkirke; især mældes det tydelig den første Gang, nemlig i Aaret 1309. Aar 1634 brændte den Overdeelen af Hunsene i Brodreunge, en stor Gaard og et Kirkested imellem Skæholt og Hekla. c) Upphillingar, bestaaende deri, at Næs, Der og Skær, som ere noget borte, forhoies for Synet, ere meget almindelige i Jsland, og holdes for Tegn til godt og stille Væir. De mærkes meest om Sommeren, i stille Væir og Varme, og om Vinteren, i middelmåadig Kold og tyk, dog stille Luft. Hr. Strøm beretter at dette Lustsyn holdes for at bemærke vestlig Vind med Taage i Norge (see Sødm. Beskr. pag. 427.), og Prof. Kalm (Nörra Amer. T. II. p. 89.) at det betyder Regn.

§. 857.

Jordfiælve.

Jordfiælve ere ingensteds i Jsland almindeligere, end paa Sønderlandet, uden Tvil fordi der ulmer saa megen Ild i Jorden. Man holder for, som og ofte er erfaret, at Hekla er Aarsagen til disse Jordfiælve; thi de indfalde altid for, og nær ved en Jordbrand. Dog er derhos mærkværdigt, at Jordfiælvene mærkes ikke saa meget nær ved samme Viærg, f. Ex. paa Rangaarvælle eller i Grepperne, som længer borte, især i Grimsnæs, mellem Brueraa og Hvidaa, saa og i Olveset. Jordfiælvene mærkes og, ei aleene ved Heklesfiærdets, men og ved andre, endog de allerlangst bortliggende, Fiælves Opsprudninger, og findes derfor overalt an tegnede, i Anledning af disse, baade i Landets gamle Historier og de senere Aarbøger. Thingvælle-Sveit, saa nær som den ligger, og saa forbrændt som den er i Bund og Grund, staaer dog mindst

Sare

Fare for dette Slags Rystelser, just fordi dens Grund er saa meget hult og aaben; dog er det rimeligt, at Jordbrandens Træk huller løbe derhen, og at Jordskælvene forplantes der fra igien til den lave Egn, i Ølves og Grimsnæs, som haver langt tættere Grund; hvis Modstand da forårsager des hæftigere Rystelser. 1693 mærkede man i Ølveset nogle langsomme, men ikke meget hæftige Bevægelser i Jorden, hvorved Bandet i alle Hverer sammefteds sank ned og forbandt. Indbyggerne forundrede dem meget herover, thi det var ikke skeet tilforn; men man fik snart Forklaring herpaa, da den store Jidsprudning i Hekla begyndte 3 Dage efter. Dette skeede om Vinteren, og een af de Islandske Aarbogskrivere anmærker, at Sicilien har udstaaet forfærdelige Jordskælve i dette samme Aar, hvilket vi anføre i Anledning af den almindelige Meening, at Hekla og Vtna skulde staae i Forening sammen (§. 835). 1706, tiidlig om Foraaret, fornam man ogsaa meget stærke Jordskælve i Grimsnæs og Ølves, hvorved især den sidste Bygd maatte udstaae meget; thi ei alene fulde mange Huuse og endel Gaarde ned i Grund, men Mennesker og Creature inde i Huusene bleve hift og her sonderknusede. Jordskælvet i Aaret 1734 er nævnt tilforn. 1749 indfaldt igien et stærkt Jordskælve paa Sønderlandet, som meest rammede Ølveshygden, hvor mange Huuse komme af Lave. Gaarden Hälle kom dog meest til Skade, og Hølene bleve truede med en gruelig Uldergang, i det saavel Gaardens Huuse som Kirken sank ned i Jorden, til 2 Alnes Dybde.

Jordarterne.

§. 858.

Den sorte og almindelige Værte-Jord (§. 16.) findes her Værte-Jord, overalt, dog meest i Narnæs og Rangaavalle-Syffeler; thi Guld- ^{Morads-} Jord, o. s.

311 11

brynge.

bryngs-Syffel, og især dets vestlige Deel, har meest af den, stette røde Jord, som ligeledes findes i Kiosar-Syffel; dog kunde denne Jord blive noget fastere, ved riigelig Gødning. Den er ikke saa ufrugtbar paa Græs, som den er løs og aaben, hvorfor den bliver sæt lættelig op, hvorved Grønsøaren ødelægges, og den torrede Muld føres bort af Blæsten. Et Paraters Plantning er den meget god, men til de andre almindelige Kioffen-Arter ickun middelmaadig. Af Morads-Jorden haves alt for meget i de 3de vestligste Syffeter, dog allermest i Alarnæs-Syffel. Tørv, af temmelig Fasthed og Feedme, er her snart overalt, som og den sorte Sarver-Jord. Om de finere Jordarter er her ikke meget at sige, naar man undtager dem, der findes ved de varme Bade, hvilke ere for bekvem, ved foreskudne Leiligheder; vi skulle nu og straf handle noget nærmere om dem, i Henseende til deres Lage i Jorden. Det gemeene Blaaleer og det sorte Dynd af raadnede Hav-Værter (§. 472.), ere almindelige her ved Stranden. Peters-Muld (§ 704 og 712 a) findes paa Rangaavalle. Strand-Tørv (§. 19) falder og bruges paa Alptenæs.

§. 859.

Undersøgninger med Jordboren paa Laugarnæs.

De Undersøgninger, som ere bleve giorte med Jordboren, ved Høer og Svovel-Vele i Jsland, hvor der er Heede i Jorden, bliver maaskee noget nyt, i det mindste i de nordiske Lande. Men Anledningen dertil var, at Videnskabernes Societæt havde i Aaret 1755 befoftet og tilsendt os en Jordbor, for at undersøge Jordens Lage, især paa de Steder, hvor man fornemmer til underjordig Heede. Vi havde allerede Aar 1752 været i Svovelminerne ved Myvatn, og forsøgt denne Vost, endskjønt det ikke kunde skee med al den Fremgang som vi havde ønsket (§. 752). Men nu have

De

de vi derimod den beste Lelighed nær hos os, nemlig paa Laugarnæs (§. 850.), hvorhen dette svære Instrument kunde bringes med liden Besøstning, først til Soes, og siden til Hest et lidet Stykke Veis.

Vi komme betiids derhen, den 12 Augusti 1755, og satte, ved Hielp af vort Mandskab, Jordboren ned paa en grøn Banke, kort fra Hverem. Her var da først et Lag, 1 God tykt, af bruun rodt, løs, og mudderagtig Jordart, som den foromnævnte (§. 16.); dernæst 2 God mørkegraat, noget grønagtigt, blødt Leer; og der under igjen endnu af samme Slags Jordart, et 2 God tykt Lag, blandet med grovt Sand. Under dette Lag, 5 God dybt, mødte os et nyt af temmelig haard Steen, af Oprindelsen hærdet Blaasteer, og 2 God tykt; den nederste halve Deel var blandet med gul og hvidagtig Ofker; og i dette Lag begyndte Warmen, saa at det overste deraf var sunkent, og det nederste temmelig heedt. Et halvt anden God tykt Lag, af violerfarvet Steenart, laae under det næste bemældte; og denne Steen var, af Oprindelsen, en hærdet Bolus, mættet; i det nederste, med rødagtige martialske Jord-Partikler. Her var Heeden stærkest, og vi sluttede, at dens fornemste Sæde maatte være i dette Lag; thi her neden under begyndte den efterhaanden at formindskes. Under anførte violerfarvede Steenart laae en blaagraa Sandsteen, 12 God tyk, og ikke fuldt saa haard, som foranførte Steenarter, men dog fuld af haarde Smaaastene. Vi borede endnu een God dybere ned, da Steenarten blev løsere, og meer graaagtig, meen mindre blaatig, med hvidagtige Scriiber inden i. Med dette Lag holdte vi op om Aftenen; Heeden var ogsaa, nederst i samme, reent forsbunden. Vi havde altsaa giensnemboret denne Dag 10½ God. Den 13, Kl. 4 om Morgenen,

begyndte vi igien, og holdte ved med Boringen til Kl. 12, da vi i alt havde boret $2\frac{1}{2}$ Fod, igiennem et meget haardt graat Sandsteens-Viærg, bestaaende af Leer, Grus, og sammenbagte hvidagtige Hvere-Levninger, eller Smuuler af den ostbenævnte Tophus. Vi sluttede heraf, at Hveren paa Laugarnæs (§. 850.) maatte eensgang tilforn have ligget saa lavt, tilligemed Jorden der omkring, og siden, Tid efter anden, have foretaget sig ligesom Jorden var tilvoeren; thi man mærker snart allesteds, hvor heede Bønde springe op i Island, saadan en Forhoielse; Klipperne med Vandets Bredde ere og ofte vogne 2, 3 til 4 Alne i Høiden. Da vi nu vare komne 13 Fod dybt, mærkede vi igien at dette Sandsteens-Lag blev omklistret med et blodere af meget fin Jord, der dog hverken var feed eller limagtig, men ganske uden Varme; dette Lag var 2 Fod tykt. Herpaa blev Boringen begyndt paa nye, og en lang Tid fortsat, uden at Instrumentet sank det allerringeste: vi forsundrede os derover, og forsøgte derfor med Bergbøren, men det hjalp heller ikke, thi den blev strax slov og forslidt paa den overmaade haarde Bergart. Vi lode en Kille falde ned, men der var ogsaa forgieves; dog blev vi, af de opbrækkede Steensmuuler, forvissede om, at dette Viærg bestod af smeltet Graun: vi undersøgte det viidere, og mærkede da, ei aleene at dette Lag kom frem af en Bakke kort fra Hveren, men og at det laae under heele Laugarnæsset, og sommesteds der ovenpaa en haard Graasteen-Art, ligeledes angreben paa mange Steder af den almindelige Jordbrand. Laget af denne smeltede Steen er 4 til 6 Alne tykt, og ligger ei aleene under Laugarnæsset, men og under heele Sønderlandet, og især de nærliggende Der Vidoe og Engoe. Det er den samme Bergart, som vi have nævnt om i Risfar-Spyssel, i Anledning af

Lunds

Lundoe (§. 26.); og den sees tydelig paa de fleeste Steder i Jøland, ved Strandbredden.

§. 860.

Hvad Jordheeden paa dette Sted er angaaende, da seer man klarlig, at den ikke gaar saa dybt, som man skulde tænke; men derfor maae man ikke slutte, at det er ligesaa paa andre Steder; hvor Anlaget (om man tør kalde det saaledes) er større end her; ikke at tale om ildsprudende Steder, og de Høer, der sprude det kaagende Vand mange Favne høit op i Luften. Den heedgiorende Materie have vi ikke kundet prøve, formedelt Mangel af Øvne og flere dertil nødvendige Ting. Vi kunne ikkun mælde, at den blaa og violfarvede Leerart er fornemmelig den, hvori Jorden opholder sig; den lugter af Svovel, og holder derhos Jern: I Ziden er den temmelig fast og bestandig, og gæerer ikke med Sædvand.

§. 861.

Aaret efter, 1756, forde vi Jordbøren til Kriseviig (§. 849.), og begyndte at arbeide den 1 Julii, i Middagslavet, paa Bredden af den store Høer, som var først opkommen det forrige Aar om Winteren, ved Jordstælv, da der tillige aabnede sig kort derfra, mod Østen, nogle sydende Høle paa Marken, hvilke endnu var gren allevegne omkring, og prunkede med dobbelte Blomstre af *Argentina*, *Tormentilla* og *Ranunculis*. Vi funde da paa dette Sted: 1) et Lag, 3 Fod tykt, af en brunnrod Jordart, som oven til var forbløst og maver, og derfor lysere end sædvanlig; den synes af Oprindelsen at være den røde Bolus *Thermarum*; og i det nedreste af dette Lag begyndte Varmen. 2) En brunnrod, mørkagtig, temmelig fin og seet Jordart, 2 Fod tyk. Den er ogsaa

Slutning
heraf.

Kriseviigs
Svovelsbjerg.

fastere end den forrige. 3) En gul, mindre feed, tør, noget grov og skarp, 1 Fod tyk Jordart. 4) Et Lag, 5 Fod tykt, af adskillige Farver, og deri stærk Heede. Jordarten var fin, først gul og rød, stribet, 2 Fod; dernæst stribet med blaa, grønagtig, rød og hvidagtig Farve. De nederste 2 Fod vare af en langt fastere og feedere Jordart, end hin, som laae oven paa. Farven var graa, med blegge hvide haarde Årner overalt. I dette tykke Lag var Heeden saa stærk, at man ei kunde holde Haanden paa den Jord, som Boren bragte op. 6) Et Lag, paa 1 Fod, af en blaagraa blød og løs Jordart. 7) Et andet Lag af samme Slags, men meget lysere og endnu blodere Leer, 4^{te} Fod tykt. Ved Begyndelsen af dette Lag, da vi net op vare komne 12 Fod dybt, mærkede vi først det underjordiske Vand, hvilket gjorde Grunden blød. Det stod altsaa ligesaa dybt, som det kaagende Leervand i den store Høv; Heeden var her og brændende, med en Lyd af stærk Kaagning. 8) En feedere og finere blaagraa Jordart, 2 Fod. 9) Endnu en af samme Farve, dog noget lysere, grovere og haardere, med smaa hvide Steene, eller en haard Materie. I dette Lag var Heeden allerhæftigst og meest suusende, ligesom det er berettet om Grovten ved Nyvatn; Lagets Tykkelse her var kun halvanden Fod. 10) Tre Fod tykt Leer af samme Slags, dog noget finere, haardere og tættere, samt opfyldt med de hvide rundagtige Steene. Det heele blaagraa Hovedlag, fra No. 8 til 10, hvori Heeden var allerstærkest, er 6 $\frac{1}{2}$ Fod tykt. 11) En halv Fod tyk mørk-vioisfarvet fin og feed Jord; men Heeden alt mindre. 12) En rød og blaa-spraglet fin Jordart med leverrød Farve iblandt, og 1 $\frac{1}{2}$ Fod tyk, hvori Heeden begyndte kiendelig at tage af. Her holdte vi og op om Natten, da vi i alt vare komne 25 Fod ned. Den 2 Julii var Mariae

De

Befølgelses-Dag. Om Aftenen vendte vi til Stedet igien; Hullet var næsten fuldt af Vand; vi begyndte at arbejde den 3 Julii Kl. 1 Formiddag, og funde da fremdeles: 13) En mørkerød, særdeles fin Jord, 1 Fod tyk; men Heeden som sidst. 14) En guul og rød Leerart, noget grovere, en halv Fod. 15) En grønagtig Jordart, temmelig fin, $\frac{1}{2}$ Fod tyk. I disse 2 sidste Lag vopede Heeden til igien. 16) Et meget haardt Lag af en lysblaa Jord, med foromtalte hvide Smuler, halvanden Fod. Her vopede Heeden liendeligst, men begyndte siden at tage af. 17) Hviere blaa Farve, finere og blodere Jordart, $1\frac{1}{2}$ Fod. 18) En særdeles muldagtig Jordart, mørk-violet i Farven, samt tæt, tør og mager. Laget var neppe $\frac{1}{2}$ Fod; men denne Prøve forandrede Farven, i det den blev tør i Luften, saa at den blev meget nær Kaffebrun; i dette tynde Lag tog Varmen af igien. 19) En mørkebrun-rød, fed og fast Jord, Laget 1 Fod; Heeden syntes i dette Lag at tage lidet til igien. Men her maatte vi holde op, thi vi havde ikke flere Leed af Jordboren ved Haanden. Vi vare i alt komne 32 Fod ned, og tænkte ikke at komme saa langt; thi saavidt vi kunne slutte af Jordgrunden i Nærværelsen, vare vi virkelig komne ned imod Klipperne, hvor Varmen vel holder op. Bønderne her paa Stedet, naar de grave efter Tero, komme ikke dyber ned end 14 Alne; men de berette, at der mode paa denne Dybde, 3 til 4 Gange, 1 Fod tykke Lag af en blaa, guul og rødguul Leerart, samt at de mærke lidet Varme i de blaa Mellemtage. Fra foransorte Sted flottes de vi Boren til udsommaldte Pole, fort her often for, hvilke vare sprungne frem paa den grønne Mark, ved den samme Tid, som den store Hver. Disse have mangfoldige smaa Trækuller, hvorfra der opstiger den hæftigste Svovelskank med en utaalelig Heede.

Her

Her vager baade Svovel (S) og Hvere-Salt, eller det ved Nye-
vann beskrevne vitrioliske Aluum. Vi begyndte paa et Sted at gra-
ve lidet med Spader; men Grunden var her saa overmaade heed,
og dertil baade los og usikker, at vi hverken kunde eller torde blive
der. Vi udvalgte derfor et andet Sted, hvor Grunden oven til
var mindre heed og meere fast. Her satte vi da Jordboren ned,
og, uden Noie, borede 6 Fod dybt. Jorden var der overalt blaa-
lig, dog hvidstrøbet iblandt, meest Lagevis, og saa heed nederst,
at man ikke kunde røre ved den, uden at brænde sig. Grunden blev
des blodere, jo længer man kom ned, og da Boren var 7 Fod dybt,
hørde vi tydelig neder i Hullet en usædvanlig Lyd eller Bulder af
en stærk Raagning. Alligevel holdt man ved at bore, til Instru-
mentet stod 9 Fod dybt. Men her begyndte Grunden at bevæges,
og hvor smalt end Hullet var, omkring Boren, begyndte dog den
tynde Materie at sprudes op med en overmaade stærk Voldsomhed.
Vi maatte altsaa paa nye staae fra vort Forsæt, og trække Boren
op, hvorved Heeden ret fik Luft, saa at det leeragtige brændende
Band sprang 6 til 8 Fod i Hoiden. Efter en kort Tiid holdt dog
denne Uroelighed op, saa vi tænkte at Heeden havde alt raset ud;
men det varede ikke ret længe, inden den fik Kræfter igen, og be-
gyndte da for Alvor at sprude, og uden Ophold at faaage op.
Vi mærkede altsaa, at vi, ved denne Leilighed, havde frembragt
en nye Hver.

§. 862.

Slutninger
af disse For-
søge.

Man vil ikke opholde Læserne med at igientage alt det, som er
sagt i Forveien, ved saa mange Leiligheder, om den underjordiske
Brand og Heede i Jsland, og især om visse Hverer, Keerpole og
Svovelmener, hvor denne Brand har vuiset sig. De, som ønske
at

at have en fuldkommen Underretning herom, maae, paa sine Steder, læse disse Stykker igien, for at fatte et almindeligt og rigtigt Begreb om denne Natürens ligesaa forunderlige som stræffelige Huusholdning og Arbeide i og med vor Jordklode. Til denne Sags Oplysning maae man og eftersee andre Verdens Parters Eindrægtelser i ældere og nyere Tiider, fornemmelig Jordbrandene, saavel paa det Torre som i Havet, samt Jordstælte, og de ved slige Omtumlinger deels opkomne, deels undergangne Jordstykker og heele Lande. Men naar dette altsammen holdes imod det, der er skeet og erfaret i Island, saa vil det, som vi have skrevet og sluttet om denne De, i samme Henseende ikke komme en Fornuftig saa meget underligt og ubegribeligt for. Hvad ellers den næst foran undersøgte og beskrevne underjordiske Heede er angaaende, da maae det især sammenlignes med Krisseviigs, Myvandets og Laugarnæssets Beskrivelser (§. 751 til 755, og 859 til 860). I øvrigt blive vi ved vor eengang antagne Meening, at den Brand og Jordheede, der ulmer i Islands udvendige Jordkorpe, og især om de oftbemældte Høver og Leerpole, at de ikke hente deres Heede neden fra Landets Grundvolde, men have den nogle Fod, og i det høieste nogle Favn, dybt i Jorden, i den glærende Materie, der befindes i visse Læge. Herhos meene vi dog, at de fleeste, om ikke alle, saadanne Steder, faae nogen Luft neden fra Jordens Afgrund og de lontige Gange, der gaae imellem de store, meest de ildsprudende Bjerge, og ned til Havet; følgelig at de ogsaa kunne, ved de Dæmpe, Luften har i sig, faae Tilførsel af saadanne Materier, som tiene til deres Underholdning. Alligevel maa denne Tilførsel ikkun være sparsom de fleeste Gange, og Foreeningen imellem Høvene og de omtælte underjordiske Gange ikkun være liden, ja Deien neppe aaben, uden

naar Jordens Grundboisde ere i Bevægelse. 3 Steder for de Dampe og Materier, som idelig opstige og bortgaae fra Hvere, Leerpole og Svovelminer, saae disse igien det største Tillæg oven fra. Det er ellers klart nok, af foransorte Forsøg, at denne underjordiske Heede i Jsland opholder sig i den blaalige suuragtige seende Jord, og fornemmelig i det hærdede Lag eller den Bergart, som er bereedet og sammenperst af bemældte Jordart. Denne blaa fiine Bolus indeholder Svovel, Vitriol og Aluun; den haver og, ved adskillige Prover, i Jiden viist sig at være jærnholdende; og nogle visse Foranderligheder i dens Farve, give der samme tilkiendte. Herforuden har en anden Saltart ladet sig tilsyne, fornemmelig i Heedens Sæde selv, eller i denne blaa Bergart: den er endnu ikke bleven prøvet, endskiont vi, af visse Formodninger, holde den for et slags Middelsalt. At der er Salmiak ikke alene her, men ogsaa i de opkaagende Leervande, tage vi ikke i Tvil. Omstændighederne ere her de samme, som i Solfatara (S. 721, 752 ic.), og denne selsomme modne Saltart viiser sig her i Klumper, i Klippernes Rister, hvor Jordbrand haver udraiset tilforn. De smaa Cubi og Avner af Svovelskis ligge synlige overalt paa de fleeste Steder i de blaa Hverelag. Syrligheden er meger stærk i de heede, feedagtige og stinkende Jordlage, og denne Syrlighed holder sig stærkt bunden til Materien paa mange Steder i Landet, hvor ingen Hverer sees nuomstunder, ja endog hvor man veed, at ingen Hverer have været siden Landets Beboelse. Det er herhos mærkbart, at denne Syrlighed er stærkest i den blaa Jord, nærmest saavel over som under det heede Berg; men i Bergarten selv er den snart ingen, eller kun lidet følelig for Smagen; følgelig er den der dels udkaagt, dels forandret, og Materien er i dets Sted, naar

man

man tager den i Munden, mangfoldig torrende og sammensnærende. Hertil kommer endnu een Ting, som Heedens fornævnte Sæde har for sig selv, men er ikke endnu noie bleven prøvet, nemlig den hvide, haarde og tørre Materie, som vi have kaldet Magnesia calcarea alba, fordi vi have befundet, ved det lidet vi have kundet samle deraf, at den ikke giærer med suure Safter, og fordi her, i Hverestederne, forefindes det Slags Sager, hvorved besnævnte Magnesia frembringes. Endelig bliver foranførte Meening om denne Jordheede, at den kun opholder sig i visse Læge oven i Jorden, og haver ikke, som almindelig holdes for, sit Udspring dybere ned, fra Landets Grundvoode, bekræftet derved, at Heeden paa samme Tiid tager til og af, i 2 til 3 Læge under hinanden; at den er stærkest i eet Læge paa een Tiid, hvorimod et andet Læge haver paa en anden Tiid den største Heede; endelig og, at den er eet eller nogle visse Aar stærkest i een Egn, og derimod svagere sammesteds paa en anden Tiid, ligesom Materien indvortes giæres, eller dens Mængde bliver større eller mindre, og ligesom Lusten og Værlighet falder til; thi efter denne Tingenes Værfæffenhed og Forandringer kunne Materierne samles, modnes og komme i Giæring, og følger lig Jordbrand, Hverer og deslige opkomme af nye, hvor intet saadant har været tilforn. Erfarenheden har og viist, hvor utroeligen disse Naturens Arbeidere kunne forvandle Vand og Damp, Jordarter og Steene, Metaller og Mineraller til deres egen Slægt og Ræring; thi det er skeet saa fuldkommetlig, at den som kommer her, og vil betragte disse Ting, skal ikke finde andet, end den sammenslags Leerart overalt. Paa samme Maade gaaer det til i de stærke Jordbrænde. Man haver hidindtil ikke kundet opspore, hvor de mangeslags Ting, som Jordbranden har opsluget, ere blevene af,

eller hvad de ere bleve til. Man veed, at den medtager endog heele Landflaaber paa een gang, og anvender mangeslags Klipper, Jordarter, Urter og Skove til sin Næring: og dog finder man ikke andet, som den har ladet efter sig, end Graun, Sinner, Pimpersteen og Aske. Om Graunene veed man, at de ere en smættet Materie, der indeholder mange og ulige Ting: men man har endnu ikke lært dem alle tydelig at kjende, og endnu mindre fundet komme efter, hvad de have været, førend de bleve til Graun.

§. 863.

Steenarterne
i Almindelighed.

Om Steenarterne er ikke meget at skrive paa dette Sted; thi de fleste ere anførte i de andre Stykker. De almindeligste Fjeld-Klipper, hoit oppe, ere her af samme Slags, som i Kiøbenhavn (§. 22). Grundvænnet til adskillige andre Steenarter, samt Dracmoe og Smidium, o. f. findes her ligeledes. Ræmpe, mure (§. 567. d) komme her til Syne, endskjønt ikke almindelig. Strubleberg (§. 476.) er her paa mange Steder; og især nogle af de største eller tykkeste Støtter, med 5 til 6 Kanter, iblandt Strand-Klipperne paa Bidoe. Den røde Sand- og Leer-beblandede Steenart, der tjener til Mellemstak i de ældste Fjeld-Klipper i Jesland (§. 208.), er her ogsaa at finde. Af finere Steenarter, som Kristaller, Agater og deslige (§. 568.), falder ikke ret meget, eller nye smukke Forandringer paa Sønderlandet, fordi Grunden overalt er saa meget omtumlet. Vi ville derfor nævne nogle især af de andre Klipper og Steen-Urter, ved hvilke der kan være noget at anmærke.

§. 864.

Moberg,
og dets Nytte
m. v.

Den bekendte og offtbenævnte Sandsteen-Art Moberg, anvendes til Nytte paa Sønderlandet. I Harnæs-Syssel, i Gloen, findes

findes en liden Gaard, udhuggen i denne Bergart, og bestaaende af nogle Kammere; dog har der været en Huule af Forstningen: Paa Lyngdals-Græden, oven for Althinget, er en Huule i Klippe, kaldet Laugarvats-Hellar, hvilken tjener til Stælehuus eller Herberg for alle dem, der reise over de vidtløstige Stæde, fra Vester- og Sønderlandet, til Skalholt og omliggende Egn. I Rangaavalle-Syssel findes nogle saadanne Steder, enten ganske udhuggne ved Kunst, eller tillige dannede af Naturen. I Aas, i det Præstegjæld Holtene, paa det sidste Land, i Luuner, er en stor Høelade udhuggen, med 2 Døre, een paa hver Side. Rutasfells-Huulen, ved Desfaldet, er dog meest bekiendt, for det store Værelses Skjld, der er koret fra Gaarden af samme Navn; ja Folkene have af og til boet der for Mageligheds Skjld, og derfor er der endnu en stor Dor for Nabningen. Huulen bestaaer af brunt Berg, der er middelmaadig haardt, dog jævnt og godt at arbeide; og Værelset er udhugget af Mennesker i de ældste Tider, 24 Alne langt, 8 Al. bredt, 4 Al. høit, og hvælvet oven til. Imod det indreste paa den venstre Haand fra Døren, er et liden Kammer, med Udgang eller Dor: det er 4 Alne høit, under Loftet, hvilket ogsaa er fiendeligen udhugget, som der fortælles, for at tjene til Sængsted. Historien er denne. En Kæmpe, navnlig Natur, skal have boet her paa Stedet i de allerældste Tider, og selv udhugget denne Huule, for at være i Sikkerhed, da han havde et og andet udestaaende med hans Naboer. Men disse hans Fiender passede paa, og funde Leilighed at komme ind i Huulen, medens han laa og sov. Han vognede ved denne Varm, førend de endnu kun de kom til ham, eller giøre ham nogen Skade, og greb til sine Naaben, som han havde hos sig. Men de brækkede Hull paa

Løftet, som var 1 Al. tykt, hvorigiennem de naaede til ham med deres Spyde, og til Slutning dræbte ham. Denne Lidragelse findes ingensteds optegnet; men Indvaanerne have fra Mund til Mund fortaalt den saaledes, og Tingene vilse sig endnu: nemlig Huusen, Kammeret, og Løftet, med et rundt, 1 Al. vidt Hull midt paa, som man ellers ei kan vlide til hvad Ende det skulde være giort. Sængestedet der oppe er 5 Al. langt og 3 Al. bredt. Gaarden Glidarende, i den østlige Deel af Rangaarvalle-Syssel, er bygget af Sandsteen. De største Stykker, som ere smukt hugne, findes foran ved Porten. Bergarten er lysebrun, meget fin og jævn, men fortæres noget af den skarpe Lust. Den trækker ellers Vand, og gjør Huusene fugtige.

§. 865.

Andre
Steenarter.

Al andre Steenarter mærke vi kun følgende: a) Graa-berg falder ret godt og tjenligt til Bygninger ved Hellaen, som Fremmede kalde Lap-Elven. Denne Steen er og bleven brugt til Vindues-Karme i det Huus, som Hans Majestet Kongen har ladet bygge paa Vidoe; ligeledes til Farver-Huusets Godstykker, og til at indmuure Kiedlerne ved samme Aae. Men man maa soge Berget ud; thi deri falde gjerne Eitler, eller smaa smæltede Steene; hvilket viiser, at det er tildeels etslags Breccia. b) Siemøen paa Bestmannø bestaaer ligeledes, paa mange Steder, af Sandsteen, hvilken er et Eitleberg. c) Mohalsen, en liden Siælbvei paa Sønder-Næssene, bestaaer, for den største Deel, af en grov Breccia eller Eitleberg; Grundværnet deri er især en mørkebrun jordblandet Sandsteen, opfyldt med smættet Smaasteen og vandstidte Strandsteene derimellem. d) Dryckiarhals, som ligger noget længere borte fra Grindeviigs Havn, end næstbemældte Biargryg, har

har en Mængde Moberg, nu med fine, og nu grovere Foran-
 dringer; men deriblandt er en Art Brynesteen (lapis cotarius,
 particulis æqualibus mollissimis) den beste. Den er en meget
 fin og jævn Ellipsesteen, brunn-gulagtig af Farve. Denne Hals
 er ellers mærkbarlig for sit Navns Skyld, der har sin Oprindelse
 af et Kar, som her findes oppe paa Bjærget, tæt ved Beien, ud-
 hugget i en Sandsteen-Klippe til de Reisendes Nytte. Klippen kal-
 des Dryckiarsteinn, eller Drickesteenen, fordi her stod i forrige
 Tider Drik til Næde for reisende Folk. Egnen er tør og uden
 Vand; og derfor var her en Oppasser, som skulde samle Regnvand,
 eller ogsaa hente Vand længer fra, naar det var tørt Veir, og hol-
 de Karret sterkt fuldt af Vand, blandet med Syre, som han bragte
 fra Bygden, og fik maaskee Betaling derfor. e) Grønaberg.
 Raudafell, et lidet særskilt Bjerg i Desfælds Bygdelaug, giver et
 Lag af grønagtig feed og fast Steen, som godt lader sig arbej-
 de, alene at den haver haarde, rundagtige smaa Eitler inden i.
 Denne Art blev for nogle Aar siden udgivet for Kalksteen; men
 den holdt ikke Prove i Jlden. f) Hele Desfældet, langs med
 Sønderhavet og over Bygden, bestaaer for den største Deel af lyse
 brunagtig Sandsteen, som neder til har haarde Klipper, og desuden
 inden i hist og her fremmede Arter af Smaaastene. Den ommaltes
 Desfælds-Fosel (§. 772.) hviler herpaa. g) En sort jaspieret
 Steen falder i Martensstunge, liggende paa Rangaavalle, østen
 for Bæster-Rangaa; Gulvet i Kirken sammesteds er belagt med
 Glimmer af denne Steen. Vi saae ligeledes Gulv-Glimmer deraf i
 Odde-Kirke, hvilke vare at see til som eenfarvet sort Marmor.
 Det mærkbarligste er, at Glimmerne ere naturlige 4, 5 til 7 kante-
 de; folgelig maae dette være en Basalt-Art. Vi have ikke set her

seet dette Sted, ei heller prøvet Steenen, og tør derfor ikke give den ud for Marmor, skiont *Plinii* og andres Vasalter ere det virkelig. Denne har og meere Ansæelse af Jaspis.

Materier, frembragte ved Jordbrand.

§. 866.

Hraunstræ-
ninger.

Vi have nævnt ved adskillige Leiligheder om Sønderlandet, at samme viiser Prover af den smæltede Steenart eller Jordfin-
ner, i langt større Mængde, og meget meer tydelig, end andre Læn-
ders Fierdunger (§. 830). Især have vi allerede nævnt (§. 772.)
Hraunet og Jordbranden paa Thorsmark, een af de østligste Egne
i Rangaavalle-Eyssel; ligesom og Reisen til Heklefjærd, og dets
Beskrivelse (§. 834-836), viiser det samme. Vestmannoe (§. 832)
tillige med dens underliggende Der og Klipper, er ikke alene for-
brændt i Grunden, men denne De har desuden Hraunhuuser eller
Smæltegade fra Jordbrandens Tid, som have opkastet Jordfin-
ner efter Dens Beboelse, og ødelagt en Deel af den. Oppe paa
Fjældene, især ved Skoldbreed (§. 833.), er Grunden fuld af den-
ne Klippe-Art. Aarnæs-Eyssel viiser sammeslags Strækninger
langs med Hvidaaen, i Ølves og Grimsnæs, over Bygden, og
oven paa Jorden, men dog allermest i Thingvalle-Eyssel (§. 830 etc.),
som ei alene oven paa, men og i Bund og Grund, bestaaer af
usædvanlig tykke Klippe-Lage af Jordfinner. Samme komme meest
til Syne i de fæle Sprækker og Kløfter; og siden den ganske Egn
er hult og aaben, og man mærker dybt Vand, paa en vis Høide
overalt, neder i disse Sprækker, slutes med temmelig Visshed, at
her maae være Vand overalt i Afsgrunden. Denne Vand-Art er
meget kold, sæt og velsmagende at drikke om Sommeren, og de,
som

som søge Althinget, maae regne dette for een af Stedets største Her-
 lighed. Hvor Sprækkerne ere saa dybe og mørke, at man ikke
 kan see Vandet, mærker man dog og horer til det, hvis en Sten
 kastes ned. De tvende Sprækker eller Klostet, Almagnaglaa og
 Srafnaglaa, ere de allerførste, den første vesten og den ander-
 Osten for Althinget. De ligge begge høit, og jævnsides, endskönt
 der ere faldkomne 2 Mille imellem dem, og dette Mellemrom, som
 er lavest i Midten, er fuldt af andre mindre, store og smaa Spræk-
 ker, der ligeledes ligge jævnsides hos hinanden. De begynde alle
 norden fra Fjældene, hvor Skoldbreden og mange andre bekiendte
 Bjerge staae, omgivne med samme Slags Klippe-Årter. De
 allerførste og dybeste Sprækker eller Klostet ere ligge for Althinget,
 og de middelste gaae ned i Thingvallavatn. Ravneglaa især gjør
 de Reisende Hinder, i det de kunne ikke, uden paa saa Steder,
 komme over eller igiennem den. Almagnaglaa er derimod mærk-
 værdig deri, at den er i Bunden opfyldt med Jord, og bevoxen
 med Græs og Urter, saa at den tiener til Beedemark for Heste.
 Klipperne staae paa begge Sider 10, 20 til 30 Fæne høie ligge op
 og ned; smukke Urter og smaa Birke-Træer vore ud af Rifterne.
 Den flatte Mark i Almagnaglaa er videst ligge for Althinget, og
 derfor er den fuld med Tæller og Roder for Althings Folkene.
 Operaa flyttes ned i og igiennem Klostet, fort herfra, og den
 alfare Bøl, ned i den, er en farlig Stie, med mange Stenetræp-
 per, hvor de Reisende maae klavre til Fods og lade Hestene springe
 op og ned. At her maae eensgang være gaaet for sig en forfærel-
 lig Jordbrand, det vilse Klipperne, og de Klostet og Rister, som
 nylig ere befreene, tilligemed Vandet neder i Grunden. Egnens
 Lavhed i Midten beviiser især, at den vist nok er nedstunken ved

stærke Jordffælde. Men uagtet Aarnæs-Spyssel viiser saa mange og store Graun eller Jordsinner-Strækninger, saa har dog Guld-brynge-Spyssel endnu meget flere, thi det er overalt suldt deraf. Hellsheide, og den heele Række af Fjælde, fra Thingvallevatn ud til Reykenæs, ere ikke alene omtumlede og tildeels opkomne ved Jordbrand, men de have ogsaa faa Graune, hvorefter nogle ere ofter end eengang komne i Smeltning. Der overste af bemældte Heide, nær ved Landeveien og Reykenæsset, viiser dette især, i det Klipperne sammesteds ere saa meget udkaagte og sorte. Paa Havets Bund, nogle Milde ud fra Reykenæs, og de Der, som ligge der, bestaae ganske af Jordsinner. Strækningerne paa Landet, som bestaae af samme, betegnes især med følgende Navne: Øgmunds-Graun, kort fra Kriseviig, som er en nye opkommen søl Egn. Diupedals-Graun, paa hin Side af Selvogsheide. Herdisar-viigs-Graun, paa bemældte Heide. Skola-Graun, en meget gammel Strækning, som gaaer til B. S. V. fra det spidse særffilte Bierg Keiler, og ned til Stranden, hvor det kaldes Thraain-Fjolds-Graun. Paa begge Sider af Havnesfjord ligge ligesaa faa Strækninger, nemlig, norden for den, Garde-Graun, og Vatolesys-Graun sønden for.

§. 867.

Besonderlige
Prøver af
Jordsinner.

Bespynderlige Prøver af Jordsinner ere især følgende:
a) Billeder af alle slags, som dog ere opkomne blot ved en Hændelse, og ifflun de fineste Sorter af Graune. Hoved-Aarsagen hertil er Lusen, som har udrykket disse Billeder paa Jordsinneret, medens det endnu var i Smeltning. Derfor ere Skikkelser af Bølger de almindeligste, og dernæst nogle andre, lignende et vidt Lovværk og Blomster, som Billedhuggernes. Man ser maadige Billeder,

Billeder, naar man gaar op paa Selvogshøide often fra, men især, frem for andre, fort fra Veien, i en fast, smaltet Klippe, en gammel Mand, ligesom den var udhuggen, med langt Skæg, og i en siid Henpe eller Kappe, samt et breedt Gehæng eller Bælte, som er spændet der uden over; Tegningen eller Billedet er 3 Fod høit. b) Lageviis smaltet Sandsteen er een af de smukkeste Prover, som Sønderlandets Jordbrand har levet os. Den vi funde ved Hverens Eine (§. 848.), er noget besynderligt. Men i Krievits-Egnen opdagede vi en Graun-Hælde, der havde, midt inden i, et Lag af graa-brunagtig Sandsteen, hvilken var siin og jævn, og ikke haard. Dette, samt flere smaa Prover, som vi have truffet paa andre Steder i Landet, tiener til Beviis paa, at Jordbrand ikke smelter alleslags Steenarter, som og, at Smæltningen paa deslige Steder maae gaar meget stille og ordentlig for sig, og Jiden alene gløve sin Virkning ved at ligge og ulme. c) En tildeels hærdet og angreben af Jld, deels ogsaa smaltet Sandsteen. Vi have mærket nogle Gange, at Strandklipperne paa de fleste Steder i Island vare smæltede, og at der kom mangstedes til Synne et fast og ordentligt Lag af Graun, under Landet samt dets Klipper og Fjælde: begge Slags Klipper ere undertiden smæltede saa siint og jævnt, som den Rhinlandske Bergart, af hvilken Møllesteene gøres; men de have siden faaet Tillæg formedelst Havets idelige Overfyllelse, saa at de i Almindelighed ikke agtes for Graun. En Bugt mellem Besset og Garde-Præstegaard er især rlig paa en Steenart, som i den Tid, vi vare i Landet, skulde bruges til at opmuure Amtmandens Huus paa Besset; den blev faldet Sandsteen, men man klagede over, at den var saa usædvanlig haard; ellers er den meget siin og varagtig til Bygninger.

Da vi besøgte Stedet, befunde vi at Steenarten, som var graa, og den haardere Forandring deraf noget meer mørkagrig, var deels Lægeviis, deels Strøkeviis, kneer og mindre angreben af en jævn Jordbrand, i det den paa nogle Steder var ickun gjennemtaget, men paa andre meget fiint og jævnt hullet, som den beste Rhinlandske Steen, og denne var bleven mørk i Farven. Man presser endnu een Sort, midt imellem begge, som endnu beholder den graa Farve, endssiont Materien, naar man seer noie til, har sine Huller. Den stærfte Forandring heraf er sort, udvendig med store Huller, som de groveste Hraune, og de ommældte Strandklipper oven paa. Garde-Hraun (S. 866.) er her tæt ved. d) Møgugils-Jellir er en Huule i Rangaavalle-Syssel, som saavidt os er bekiendt, ikke har sin Liige i Jöland, enten i Hensigt til Veligheden, eller den Materies Dannelse, som den bestaar af. Dens Abning er i Roden af det Bierg Thoralfsfjell, i Fjorshüüd, hvor en Gaard har staaet i forrige Tiider. Klippen, som Abningen er i, er Jaspis-artet, eller en mørkeblaa Petrofalex, og Abningen 2 Alne høit fra Jorden, meget smal og steil inden for, saa at man kun besværlig kan komme derind. Der er 5 Fod høit ned til Gulvet, hvilket er glat, som Iis, og holder ned ad. Indvendig er Huulen rommelig, og overtrukken allevegne med en fin blaa-graa Lakering; Hvalvingen oven til er fuld af Drypsteene, af samme Farve som Gulvet; den er glat, og holder meer og meer ned ad. Vi kroge frem nogle Favn, saa længe vi kunde see Skinnen af Udgangen; men siden vi hverken havde Lys eller Linie ved Haanden, (thi vi havde ei hørt noget om denne Huule, forend vi af en Hændelse reisede den forbi), torde vi ikke vove os dybt ind. Smaa runde Steene, som vi kastede længer ind, og lode trille ned, gavede os tilkiende

hvor

hvor meget Grunden hældede; de trillede jævnt og uden Ophold, til Lyden og Gienlyden af deres Fald tog af, og tilsidst forsvandt for Hørelsen. Ingen kan nægte, at jo denne Huule har været en Jordbrands-Gang, endskjønt her sees intet uden for den, paa Viar- get eller Marken, af Graun eller andre forbrændte Ting. Den er altsaa vist nok en Levning af den almindelige Jord-Fld, og kommer meest overeens med nogle af dem, som Jordbeskriverne have fundet og beskrevet i andre Lande. e) Den Steenart, som vi opdagede nær ved Hefiesfældet (§. 835.), og formodede at have været petrificeret, og derpaa halv-smæltet Træ, kommer Mogugils-Huulens Bergart nærmest, og hører til de Materier, som ere blevne anførte paa dette Sted.

§. 868.

Af andre Slags Steenarter ville vi kun nævne a) Glas-Agater, Glas-Agater, Skur-
steene og Tophi. og da 1) den sorte, eller den bekjendte Islandske, som kaldes Ravatinna; den er meget rar paa Sønderlandet: dog giver Thorsmarken nogle Stykker deraf, som falde temmelig gode, endskjønt de ere smaa. 2) Hvid Glas-Agat. Man tager sig den Frihed at kalde denne Materie Agat, ligesom den sorte, skjønt den ikke er Agat i sig selv. Den er meget rar, og findes som en særdeles Besynderlighed i de smaa Huller i Graunene paa Vestmanns-De. Vi tænkte af Forsningen, at disse hvide Stykker vare Kry- staller, siden disse ofte treffes, tilvoxe i de gamle Graune; men Materiens uordentlige Skikkelse, Steenen den falder i, og endelig andre Prover viise, at den er Glas. Paa det Eide, som gaar ud til Stor-Hofden sammesteds, findes Stykker af dette Slags, ned- faldne eller udfyldte af Klipperne; de ere klare, giennemsigtige, og saa store, at de kunde tiene til Knapper i Kintoi, men her er in-

gen Mængde af dem. 3 Hitar dal paa Vesterlandet, ført oven for Præstegaarden, findes samme Sort, som denne, alene at den er noget brunnagtig. b) Stuursteen, rød, sort, og hvid, er nævnt om i Beskrivelsen over Reisen til Hekla. c) Tophus eller Hveresteen, af adskillig Slags, er ogsaa beskrevet, i Anledning af Geysir, Olves o. s. f.

Mineralier xc.

§. 869.

Kobbergren,
Jern, Svov-
vel, Salt,
m. v.

a) Strand-Klipperne ved Kriseviig, og ligeledes Klipperne i Leyren, som kaldes under eet Holmabiarg, bringe en hoi-grøn Materie, der seer ud som Spanfgrøn: den gives her og ud for saadant noget, og at den fører Tegn hos sig til Kobber, men vi kunne ikke sige noget tilforladeligt derom. Saa meget er alene vist, at Blandet, som her kommer ud af de smaa Rister, bringer denne grønne Farve med sig, og sætter den efter sig paa de smeltede Klipper: men vi have ikke fundet overkomme nogen Smuule, mindre noget Lag, af denne Materie. b) Jern. Derom er ikke andet at nævne, end at det findes overalt sønder paa, baade i Jord og Steene, men bruges ikke til Nytte. Den sorte Jarver-Jord er her almindelig. Leir-Piipur, efter Ordet Leer-Piiber, kaldes nogle smaa Cylindre af jærnrustagtig Materie, som findes i et Holt, ført fra Reykholts-Hver (§. 842). De ere et Incrustatum eller Tophus Martis af Birkestille, og haver samme Oprindelse, som Tegningen i Steenen paa Mikkela (§. 719). c) Svovel, Vitriol og Aluun, ved Geysir, Olves, Kriseviig og Hveren Eine, have vi talt om, i Anledning af disse Steder (§. 845 til 849). d) Saltarter. At endog Hekla-fjeldet haver frembragt Rioffens Salt,

Salt, er viist i dets Beskrivelse (§. 834). Bestmannøes Sandsteen-Berg paa Hiemgen, førsteds hvor det vender inod Solen, giver og noget tidet af Salt, i det Steenen trækker Seevandets Dampe ind, og Solens Varne bringer dem ud igien, da Saltet sidder tilbage paa Klipperne. Dog er der ikke saa meget af dette Salt, at Indbyggerne kunne samle det til Brug. Derimod kunde man faa Salt til Huusholdnings Brug af Havvand. Dette er blevet forsøgt, i disse sidste Aar, i Repkeviig og paa Bidøe, med dertil bestilte Saltpande; dog bruges det ikke nu, maafee fordi der gaaer for megen Iidebrand med: men deraf kunde spares noget anseeligt, ved at lade Havvandet fryse, og tage Iisen bort efterhaanden. Man faaer ellers, paa denne Maade, ikke altid slige meget Salt: det kommer an paa Fresten, paa Omgangen med Iiden, samt Rindens Skabning, som der faages i. I Henseende til Maalet har man hidindtil faaet af ufruffent Seevand, den 12te, 11te og meest 10de Deel Salt.

§. 870.

Angaaende Fosfiliernes, er her alene følgende at lægge til: Fosfiliær.

a) Den Strand-Torv, som opgraves paa Alpenæs, er ganske tiellig til Iidebrand, og bødre end den, der falder paa Kialarnæs (§. 19). Den graves op af Stranden om Ebben. Men det kan blive Spørgsmaal, hvor denne Torv er kommen fra; thi efter den almindelige Meening, at Havet formindskes, skulde den Grund, hvor denne Torv falder, have staaet dybt under Vand for mange 100de Aar siden. At der bliver Torv af Havplanter, er os ikke bekiendt; ikke heller tales om Havets Formindskelse paa denne Kant, endskjønt vi nu strax faaer at see et Exempel, som efter nogle Lærdes Meening synes at bekræfte den. Derimod er viist, at Alpenæsset er,

i de

i de sidste 100 Aar, mangfoldig ødelagt af Havet, og den forrige Jordsoer ved Stranden meer og meer bleven bortskyllet; ja man seer endog temmelig store Bugter, der ere, paa denne Maade, opkomne i Mands Minde, og her falder just dette Slags Torv; ellers falder den ogsaa oppe paa Næsset. b) Conchylier, inden i haarede Klipper eller Steenarter, have vi hidindtil ikke truffet, ikke heller hoit oppe i Landet, undtagen hvad der snaffes om Sælingsdals-Heide (§. 577). Det er derfor des mærkværdigere, at Alnæs-Spyssel paa 3 eller 4 Steder, 4 til 6 Miile oppe i Landet, glemmer Skaller af bemældte Hvaldyr i Jorden og Klipperne. En Bæk, kort fra det Viærg-Hestfjall, siges aarlig at fylle ud af en Vasse noget af Conchylier; af hvad Slags de ere, derom have vi ikke faaet Efterretning. En hoi Ryg i Grimsnæs, kaldet Skeliabakke, er fuld af Conchylier. Men følgende to Steder, som vi selv have besøgt, ere dog de mærkværdigste. Næmlig, først en hoi Vasse østen til ved Soget, af hvilken denne Elv river noget bort efterhaanden. Vassen bestaar af en blaagraa meget blød Bergart, som af Oprindelsen synes at være Blaaalder; og heri findes fornemmelig 2de Slags Conchylier: en *Bucardia* (§. 98. og 689. 1), og en liden *Tellina*, stor som en Eiskilling, med en meget fin og tynd hvid Skal. Det andet Sted, kort herfra, er en meget fast og haard Steenart, af de almindeligste Fjeldklipper, i Nenden af en Bæk. Oven paa dette Lag er en Graunstrækning af gammelt Jordfinner, som er kommen her ned over Eggen fra den oven over liggende Heide. Inden i disse haarde Klipper findes ogsaa Conchylier, fornemmelig *Zarpediske*, eller de Norske *Zarpestiæl* (see Pontopp. Naturl. Hist.), en *Pecten auritus* (§. 239). Men man kan kun sjælden faae en heel eller ubrækket; thi man kan ikke faae dem løse,

uden

inden med stor Meie, og med Brækestænger. Imidlertid seer man dog dette Slags Skæl inden i Klipperne, ganske uforandrede, med deres naturlige Furer og purpurrede Farve; ja man træffer dem ogsaa med Grøndur-Skaller (*Balanus littoralis*) siddende paa Skallen, ligesom de almindeligst pleie at sætte sig paa dem i Havet; medens Dyret endnu lever. Siden nu disse Steder ligge oppe til Hælde, ikke alene langt fra Havet ligesom, men og høit over Havet, og en vidtloftig Bygd neden for, som Landnama-Saga beskriver, saa er ingen Tvil om, at jo bemældte Conchylier ere komne herhvid; mange 100 Aar for Landets Beboelse; men derhos bliver dette et stort Spørgsmaal, om Havet har naturligviis staaet saa høit den Gang, og er, siden den Tid, blevet saa meget lavere? eller, om disse Skaller ere bragte herhen alene ved en Omvulning? Det første har store Vanskeligheder; thi havde Havet staaet her oppe til faen, maatte man finde overalt, ikke alene Skaller, men og flere Levninger deraf. Men dette seer man ikke; Havet har ikke heller taget synderlig af i saa mange 100 Aar, som Landet har været beboet; thi de Gaarde, der nævnes ved den første Beboelses Tid, staae endnu nær ved Havet. Den sidste Meening derimod har det paa sin Side, at ingen kan nægte, at her jo er skeet en meget stor Omvulning; thi det er klart af Thingvalls-Bygdens og Grænsstrækningens Beskrivelse sammesteds. Her maae og have været en meget stærk Jordbrand, efterat bemældte Omvulning er skeet, siden en Strækning af smæltede Klipper ligger her oven paa.

Frugtbarheden.

§. 871.

Sonderlandet overhoved kan kaldes frugtbart, uagtet de Stræk- ² Afslutning-
ninger af Jordslunner, der findes paa saa mange Steder; thi disse ^{ligged.}

Ecceccc

ere

ere ogsaa frugtbar, og tienslige, endskjønt ikke til Høstæt, eller Græsning for Røer eller Heste, saa dog for Faarene, som endog trives allerbest paa saadanne Steder; thi de smaa Piile-Urter, Beetelyng (*Erica vulgaris*), andre Lyng-Urter, Krat og Fjæld-Nape, samt adskillige gode Urter, der vore deels op af Hrauns Mossen selv, deels i de smaa Døveler, imellem Klipperne, give disse Kreature Vinter og Sommer den allerbeste Underholdning. Fjældene ere og frugtbar paa Græs og allehaande Urter; ja de haarde Klipper selv tiene Indbyggerne til deres Føde, formedelst de Lichenes, som vore derpaa; thi disse bruges i Stedet for Brød, og ere ligesaa sunde, nærsomme og behagelige, som Kornvarer, ja i disse Maader sundere og tiensligere (§. 248 o. f., og §. 590), naar de behandles og tillaves paa den rette Maade. Sonderlandets Syffeler ere ellers forskiellige i Hensigt til Grunden. Det beste Græs til Vinterfoder falder i Rangaarvalle-Syffel, omendskjønt Flyvesandet fra Hekla baade hindrer Græsvæksten og gjør Høstætten besværlig. Alnæs-Syffel har ogsaa en Mængde af Kvæg, og Græs derefter, især af Stor og Myrgræs (*Carices & Junci*). Men Stæderne i Guldbring-Syffel ere meget ufrugtbare. Paa Sønder-Næssene er det ret besværligt, at faae Foder til Kreaturene, thi Grunden er tør og forbrændt, og intet Høe at faae uden paa Tuunene, som til den Ende ere indhegnede. Græsgangene paa Udmærkerne ere ligeledes meget indhegnede og flette. Men Tuunene i det mindste kunde uden Tvil meger forbedres og gøres større, siden Sockanten giver der saa mange Middeler til Gjødsel og Jordens Forøgelse, især den store Mængde af Hav-Vækster, som drive op paa Strandbredden, samt Fiske-Sloe, Indvolde, Ben og deslige. Paa Ind-Næssene derimod falde mange græsrigte Steder og gode

gode Græsmarke, for Gaar og Stude, langs med Fjældene. Exempler paa Græsgange høit oppe paa de vilde Fjælde, endog nær ved Zisbiærgene (§. 803.), sees her i Thorsmarken og Godeland nær ved Desfjælds-Fokelen (§. 773.), samt Egnen omkring Hvitaarvatn tæt ved Bald-Fokel (§. 837.), hvilken sidste neppe har sin Liige, i Hensigt til det, at den ligger saa høit oppe. Gaar og Lam gaar tidt paa slige vilde Fjælde Vinteren over, og blive meget feede og store, saa at et Gaar paa 1 Aar kan ofte være ligesaa godt og stort, som ellers et 2 Aar gammelt. Det er og mærkværdigt, at dette Stags Kreature saae her Tænder, langt før end i Bygden; Horene vore og usædvanlig tiidlig, og stemme deri overeens med Kreaturets øvrige Bægt, ligesom og begge Deele saa meget tydeliger viise dets Alder. Om Fodringen i Kiofs-Syffel er talt i det forste Stykke (§. 29). Overalt drives Høestættene meest i de 2de østligste Syffeler, og især passes vel paa, at Høet torres tilstrækkelig, og forvares i Høestættene; der bruges ogsaa Lader til Høet paa nogle Steder.

§. 872.

Det som er nævnt om Urter i Kiofs-Syffels Beskrivelse Urter især. (§. 32.), kan for en stor Deel ogsaa passe sig her. Efterfølgende Urter ere ellers de mærkværdigste sonder paa. Stusa længst imod Østen (§. 804). Zvønn, Angelica (maxima), oppe til Fjælds paa Bredderne af Hvidaæn og Hvidaavatn; de, som boe næst omkring, reise her op, for at hente den, fornemmelig Rødderne. Ellers begynde Indvaanerne nu igien, fornemmelig nogle i Rangaarvalls-Syffel, at saae Hvannen hienime hos dem selv, og have til den Ende en liden Have (Hvangaard) nær ved deres Huuse, hvilket er en Skik fra de ældre Tiider, da hver Bønde gjerne hav-

de saadan en Hvinggaard (see Lovene). *Azalea* (procumbens); en Hving-Art, findes, dog ikkun meget rart, til Gælds. *Primula* (farinosa) flore rubro (Fl. Lapp. 70.), i Guldbrynge-Eyssel, er ogsaa rar. *Blaaflucka*, *Campanula patula* (§ 804.), vover i den østligste Deel af Rangaarvalls-Eyssel. *Rumin* (*Carum*) vover i stor Mængde paa Hlidarenda, og er uden Tvil kommet hertil fra til Kålvæsiæld paa Siden og flere Steder nær ved Hlidarenda, hvor det først blev indført af Gisle Magnusen, ommældt i Worms Breve. *Veitelyng*, *Erica vulgaris*; en Forandring deraf, med røde Blomster, falder paa Gædsene vesten for Grindeviig. *Sisgras* lausa-Smaare, *Herba Paris*, er særdeles rar i Jesland, og er det mærkværdigt, at den har undertiden 12 Stamina. *Miaad-Urt* (*Spiræa ulmaria*) vover paa Dreback, men i størst Mængde i Gliots-hlid, hvor den i Blomstertiden opfylder Luften med behagelig Lugt. *Jardarber*, eller *Jordbær* (*Fragaria*), vove i Garde-Hraun og Landmanna-Repp; det er blevet forsøgt at sætte dem i Haver, hvor de ere blevene større. *Tormentilla* (erecta) træffes, dog kun sjældent, paa Sønderlandet. *Lusejurt*, *Pedicularis*, vover, dog rar, i Guldbrynge-Eyssel. *Polygala* (vulgaris), Fl. Sv. 586., samles des. *Lotus* (*Anthyllis vulneraria*), Fl. Sv. 594., ligesledes. *Musar-Lyra*, et *Hieracium* (auricula muris). *Lusa-Iyng*, *Empetrum* (nigrum), vover uden Frugt under Gældet over Grædale; en særdeles Bantrivning deraf findes paa Dorfa-Jokel. *Ziner*, *Juniperus*, vover i temmelig Mængde i Brinkene ved Sandvatn i N.B. fra Althinget. Men paa Midmark, østen for Markarflot, vover endnu langt meere deraf, saa at de, som hie nærmerst, drage derhen hver Sommer, for at samle Eineber, da de kunne bringe saa meget tilbage, som en Hest kan bære. Deraf kommer

Kommer det, at denne Frugt er i saa ringe Priis i Rangaarvalle-Syffel, thi den skal sælges der efter Vægt, ligesom Torsk. Solt spise og i dette Syffel Eenebær med banket Gist og Smør til. De befinde dem meget vel ved denne Mad, hvilket er ganske rimeligt. Nogle af Bønderne her, og paa andre Steder, sætte ellers Eenebær paa Brændeviin, og tage noget ind deraf fastende, for Brystsyge. Andre kaage Eenebær med heedt Vand, og drikke det som Thee, og dette er befundet at være et ypperligt Middel mod Brystsyge og Svindsot.

§. 873.

Foruden de anførte, findes paa Sønderlandet endnu andre Urter og Urte-Pladse: Saaledes ere Rangaavallene riige paa flionne Urter. Beiteyng voper der meget, og Fjærene blive fæe de deraf. Etflage Torn-Urt, som vi dog ikke have seet, skal være paa Skiatland. Melur, eller det vilde Korn, voper her ligeledes, fliont ei i saa stor Mængde, som i Skafesells-Syffel, hvorfor den ei hell. r bliver meget benyttet; dog giver den her ofte riigere Kiærne, end der. Den voper endog høiest oppe paa Fjældene, paa Pladvalle ved Skjoldbreed. Nogle berette ellers om denne Plante, at det skulde paa nogle Steder oster paa koste 1 Batt at afmeie 15 til 20 Hestes Byrde, hvoraf man kunde faae 1 til 2 Tønder. Men vi kunne ei troe dette, med mindre det skulde være at forstaae om de forrige Tiders Ugerlande sonder og oster paa. Siiallagræs samles fra Rangaarvalle-Syffel paa Fjældene. Et Mennecke, sædvanlig et Gruentimmer, skal almindeligst samle 4 Tønder, eller 1 Hestes Byrde, om Ugen, og dette er for Bønden drøgere til hans Huusholdning, end 1 Tønde Meel. Sol, Alga Saccharifera *Borrichii*, er den Hav-Urt, som afholdes saa meget, og spises saa gjerne

Andre Urter og Urte-Pladse.

i Jsland. En af os, nemlig Bjarne Povelsen, haver ladet trykke en Afhandling paa Latin om dens Brug, og Dyder m. v. Den er ingenlunde *Fucus Saccharinus Linnæi* (Fl. Lapp. 460. og Sp. Plant. 1161. 21.), endstaaende han deri beraaber sig paa *Borrichium*; thi naar man kun efterseer Figuren hos *Borch*, saa falder det strax tydelig i Øinene, at *Linnæi* Plante er noget andet, og vel 100de Gange større; den bliver maaaskee Jslandernes *Stor-Thare* eller *Belcis-Thare* (*Fucus balteiformis*). Den rette gamle Alga saccharifera er *Fucus foliaceus acaulis latifolius, folio, multifido membranaceo plano, foliolis lanceolatis bifidis, summitatum laciniis subcrispis*. Den vøxer paa Ørbact i allerførste Mængde, og dette Steds Beboere samle den heele Sommeren, hver Storstrøm, eller ved Nye- og Guld-Maane, og siden tørre og indpasse den. Deres største Næring bestaaer alene heri, thi Sol begiæres meget af alle baade nær og fjer, især fra Skafesfælds- Maaenavaller og Narnæs-Syffeler; og de Sælgende kunne faae derfor de allerbeste Varer, nemlig Riib, Smør, Kvæg, Uld m. v., hvorefter paa de have Mangel. En Bætt, eller 80 Pund af tørrede Solfoste her 70 Fiske, eller 40 f. Spec. Her faaede ellers fornemmelig 2 Forandringer af denne nyttige Hav-Bætt, nemlig den foranførte røde og guulagtige, som er tynd, fin, og bliver sukkerrig naar den indpaffes; og en anden, som vel har den selvsamme Skabning og Smag, men Bladene ere mørkerøde samt store og tykke: denne fhyder ikke Sukker, som den anden, og vøxer længer ud i Stranden. Jæregræs, ogsaa kaldte Gvøndargræs, er den anden Hav-Bætt, som meest spiiises i Jsland, næst efter Sol, dog drives ingensteds Handel dermed, uden paa Ørbact. Denne Art ligner den paa Fjældene vøxende ædelige Plante Kloungur (en Lichen

chen foliaceus § 254. a), og er *Fucus foliaceus ramosus*, foliis angustioribus crassius & crispis, facie Lichenis coralloidis, Klunge. Den tørres ogsaa og indpakkes, men flyder ikke Sukker. Den sælges i Tønder, en Tierding til 5 Fiske eller 10 fl. Spec. Sol spises tørre, ligesom de komme fra Dreback, med banket Gist og Smør til, eller ogsaa med Gloyter eller Graademælk, om Binteren. Men af Fiaregræsset laves en tyk limagtig Gød, og det deels af den første Urte, deels af den tørrede, da den lægges i Blod iglen, i sødt Vand, haffes derpaa og kaages af Gattige med Vand og Balde og lidet Meel, hvis det er for Haanden; men af de Bels havende tillaves den med Mælk og Meel eller Byggryn, og Glode derover, naar det bæres frem. Denne Plante voper og paa Vistmannøens Strandklipper. Vi have og der spist sidstbemældte Ret, som smagede os vel. Grann-Ret, eller Angelik-Røden, giemmes i Muls til Binteren, og spises da først oven paa Torsik, med Mælk, Gloyter eller Smør til. Gist-Rætur, eller Lovetandes Rodder, opgraves i Rangaarvalle-Syffel om Foraaret, steges paa Gløder og spises saaledes varme, med lidet Smør til.

§. 874.

Indbyggerne meene, at de kraftigste Urter, som de kalde Nar, Moale Urter, turugræs, vope i Graun og især i Fiædbrynger, som vende ind i Moale Urtes Plads. Selen. Dog navngives her nogle Urte-Pladse i Særdesleshed, og deriblandt Thingvalle-Graun. Her vope og virkelig mange rare og gode Urter, ja drives til en meget anseelig Væxt, ligesom i Bude-Graun (§. 488.). Visk-foov voper her ogsaa temmelig til; men alle disse Urter, Sirelsø-Smaaren (§. 872.) undtagen, findes ogsaa paa andre Steder. *Veronica* (*serpyllifolia*) flore terminatrici, caule repente, voper i Mannegiaa. Denne smukke lille

lille Urt er den samme, som vøxer i Sødlogsdal paa Vesterlandet. Vi have hidindtil taget den for en Forandring og især en Vantrivning af Treenpriisen, men den er ganske noget andet; een af os fandt og den rette Official Urt (Fl. Sv. 8.) 1764 i Botneshøj, et Stykke Land, som hører til Sødlogsdals Præstegaard. Vor nærværende Urt bliver altsaa *Veronica serpyllifolia* Auctorum, omendskjønt den viser af i det, at flores ikke ere sparske: den har noget af *Flor. Lapp. Sp. 6.*, og atter noget af *Fl. Lapp. 7.*, og denne sidste Urt (*Veronica spicata* §. 590.) vøxer ogsaa i Sødlogsdal, høiest oppe paa Sjældet, endskjønt den ogsaa viger lidet fra den Linneiske Beskrivelse. Man kan ellers see af hans Anmærkning (*Fl. Lapp. 8.*), at han har staaet i Tvil, om *Veronica serpyllifolia omnium minima*, hvilken Clusius anfører, var den selvsamme Urt, som den bemældte *Fl. Lapp. 7.*; men denne Clusii bliver vist vores, endskjønt den er langt mindre end hans. Paa den, som *Linneus* har beskrevet og aftegnet (*Fl. Lapp. Tab. 9.*), staaer *caulis* opreist i Jsland, og Blomsteret er mørkeblaat, Bladene og Stilken, især neden til, ere lodne. *Veronica serpyllifolia* vøxer her aldrig høit oppe, men i og nær ved Bygden, imellem den vilde *Thimian*, som paa Jslandst kaldes *Blodberg*, fra hvilken den ei lät kan skilles, naar Blomsteret er affaldet, baade fordi den altid kryber med Jorden, og fordi dens Blades Dannelsse og Størrelse ligner meget *Blodbergens*; men naar man faaer Urtens op, seer man strax Forskialken, baade af Iroehuusene, som sidde paa om Vinteren, og især af de nederste Blade, som ere langt større end hine oven for. Blomsteret er fiendeligst deraf, at *petalum* er meget aabent og dets Afdeellinger breede og runde: Farven er hvidlysblaa, og ungvist hvid. Denne Blomster-Kopp falder strax af, det mindste man vøxer

ved

ved den, og ellers er Blomstertiden meget kort, især hvis der falder hæftig Væst. Noden er ikke fibrosa, som paa den anden; den har aleene nederst nogle væge Trævler. Fjæld-Urten bliver altsaa *Veronica floribus corymbosis terminatricibus calycibus hispida* &c. (Fl. Sv. 13.): men Dale-Urten *Veronica caule serpente floribus (patulis caducis) terminato (simplici glabro), foliis (serpilli) ovato-oblongis (glabris) rare serratis*. Denne er den skønneste blandt de Jølandske Urter, til at drikke Thee af. Kortolfsstade, en Bondegaard midt i Mosfells-Sveit, har nogle her til Lands rare Urter; *Lotus*, *Anthyllis* og flere af de nyssopregnede voxe der i Egnen. Nupshlid, en ubeboet Plads kort fra Krisvåg, er udraabt for dens mange skønne Urter. Vi komme til dette Sted sidst i Maji-Maaned, da mange Urter endnu ikke havde begyndt at blomstre. Her voxe ellers meest *Geranium* (*sylvaticum*), *Alchimilla* (*utraqve*), *Serpillum*, og endee *Gramina*. De rarere Urter vare her en *Orchis* (*testiculata*) med purpurrodt Blomster: denne Art kaldes egentligst i Jøland *Zionagras*, og sonder paa Grad-Rot. *Primula* (*veris*) og *Tormentilla* (*erecta*) fandtes her ogsaa. Af Jordbær voxe noget i Nupshlid, samt den Sort af Elting (*Eqvisetum*), som paa Danst kaldes Skavgræs. Birk og Krættis voxe i Grauner der nær ved.

§. 875.

Den heede Grund nær ved de kaagende Springvande, brin: Høvere Urter. ger visse Urter til en stor Væxt, siden de ikke aleene nyde den underjordiske Varme, men overgives ogsaa daglig af det opsprudende Vand og Damp. Geyser (§. 841. og 843.) frembringer ingen Urter, thi dens Klipper ere bare, fordi det kaagende Vand overfylder dem daglig; dog voxe Blodbergen (§. 874) her op af Riss-

ddd ddd

terne,

terne, og agter ikke Heeden; ja den kommer ingensteds i Jsland til saa stærk Væxt, som her. Olves-Hverene (§. 846.) bringe en-
 deel Urter frem, iblandt hvilke det kom os meest underligt for, at
Brunella vorede der, i den heede Grund, nær ved den brændende
 Hver Badstosa, og havde en overmaade Størrelse. Ligeledes blom-
 strede *Jacobæsisill*, en *Senecio* (*Jacobæa minor* Fl. Sv. 689.,
 som vi ei have fundet paa noget andet Sted), ved Akrahver, paa
 den med Gruus overhylede Klippe, hvor ingen anden Væxt-Urt
 kommer til Syne. *Senecio* (*vulgaris* ib. 688.) findes her vel son-
 der paa, men ikke nær ved de varme Bænde. I den heede Grund
 paa Kriseviig blomstre *Murar* (*Argentina*), *Soløgen* (*Ranun-
 culus acris*) og forhemældte *Tomentilla erecta*; og disse faae alle
 sammen dobbelte Blomsterblade. De varme Bæde paa Laugarnæs
 (§. 850.) frembringe især disse Urter: *Mura* (Gaase-Urt), hvilken
 ellers allermest og oftest vøjer hos og nærmest ved Bædene. *Græs-
 desura*, *Plantago* (*officin.*) *latifolia*, er ligeledes almindelig hos
 de Jslandske Bæde; dog faaer den her, formedelst den alt for stærke
 Heede, rynkede Blade. *Nasturtium aquaticum* (Linn. *Sisym-
 brium* Fl. Sv. 552.), *Kattar-Balsaam*, staaer i det varme Vand,
 ud af Bækkens Slider paa Laugarnæs, og breeder sine Rodblade
 mangfoldig ud. Denne Urt findes ellers paa de Steder i Landet,
 hvor ikke ere Hverer; dog ikkun i Bække af Kildevand, som ikke
 fryse lættelig til, saasom i Borgarfjorden og vester paa (§. 590).

Om Ager- og Have-Dyrkningen.

§. 876.

Indledning. Kong Friderich den Femte vilde i denne Post, som i alle
 andre, der manglede noget, ophielpe sine Undersaatte i Jsland.
 Man

Man kunde ikke see noget derimod, at jo Korn skulde ligesaa vel kunne vore her, da Jorden ellers er baade seed og frugtbar, og kan frembringe mangeslags fremmede Have-Værter, som paa andre Steder, under den samme, ja endog en nordligere og koldere Himmel-Egn, i andre Verdens Parter. Hans Majestæt fikkede derfor 15 Bønder-Familier, deels fra Norge, og deels fra Jylland, over til Island, for at boe der paa nogen Tiid, og forsøge Agerdyrkningen. De bleve, paa Hans Majestæts Bekostning, underholdte og forsynede med Vogne, Plove, og allehaande nødvendige Redskab, samt deelte omkring i Landet, vel ogsaa tildeels nord og vester paa, men Sønderlandet beholdte dog de fleeste. Nogle af de best formuende Indbyggere begyndte desuden, paa samme Tiid, at giøre Forsøge hos dem selv; de lode disse Bønder pleie og saae hos sig, og forsømmede intet, med Villie, som de agtede tiensligt til Værkets Fremgang. Vi have paa vor Reise seet og betragtet alle de Steder, hvor disse Forsøge bleve giorte, og ville altfaa, ligesom i Nordlandets Beskrivelse (§. 729.), nælde om samme, dog, for at undgaae Vidtlostighed, alene paa de 4 Steder, som vare de fornemste.

§. 877.

Det første iblandt disse var Glidarende i Gliotshlid, om hvis Forsøget paa Glidarende. det Sted man havde et stort Haab; thi denne Gaard har heele Tiiden været holden i god Stand af fornemme og formuende Folk. Det troeværdige gamle Skrift Gliotshlidings-Saga nælde uden udtryffeligg om Agerdyrkning, som paa andre Steder paa Sønderlandet, saa især paa dette, og deriblandt at Gunner Hamundsen, en meget berømt Mand, som levede sidst i det 10 Hundrede-Aar, drev ei alene Agerdyrkning her, men blev endog saa

indtagen, ved at see sig tilbage til de blege eller modne Agre, da han alt var paa Veien, for at gaae i Landflygtighed, at han heller vilde sætte sit Liv i Fare, end forlade saa frugtbart et Sted, og vendte derfor hjem igien. Og endskiont denne Næringsmaade var ligesaa vel her, som paa andre Steder i Jesland, bleven aldeels nedlagt i det 15 Hundrede-Aar; saa var den dog, omtrent for 100 Aar siden, bleven fornyet igien, ved Gisle Magnusen (§. 872). Thi da han var kommen hjem fra hans udenlandske Reiser, og havde faaet Hlidarende i Besiddelse, forsøgte han sammesteds baade Agers og Haves-Dyrkning, og alle vidste endnu at fortælle, at han havde aartlig baade saaret og høstet Korn. Vi besaae dette Sted den 25 Aug. 1756. Gisle Magnusens Dotter-Søn, ved Navn Brynjolf Thorlacius, levede her endda og eiede Gaarden, og hans Sviger-Søn, Landthings-Skriver Sivertsen, stod for Huusholdningen. Denne Mand havde taget op et godt Stykke i Tuumet for 3 Aar siden: Jorden var der gammel-giødet, feed og sort, uden Sand og Steene. Det første Aar, som var 1754, havde han og saaret, af en Fierdendeel Bondes Udsæd, en halv Tonde modent Korn med en haard og riig Kiærne; paa det øvrige var vel Kiærnen bleven fuldvoren og temmelig stor, men ikke haard, hvorfor det blev brugt til at fodre Køer og Heste. Aaret efter faldt Sommeren ikke saa varm, eller tienslig, i Modnings-Tiiden; Udsæden var som Aaret før; men nu blev neppe saa meget modent, at forstaae, med en haard Kiærne, hvilken ei heller, over alt, var saa riig som før. I Aaret 1756 var her intet saaret, thi her fattedes Sædekorn: den fremmede Bonde havde alt tabt Modet, og spaaede derfor ikkun slet om Forsøgets videre Fremgang. Os blev ellers viist det Sted, hvor Gisle Magnusen havde anlagt sin Ager:

Det

der ligger norden og oven for Gaarden, og Grunden hælder imod Solen. Der er nu ikkun meget lidet tilbage af en maver og forblæst Jord, som hverken duger til Høeslæt eller Græsgang, thi her ere bare Steene over alt, og Jorden imellem dem bevoxen med Ryelsø (Dryas). Man ser intet Tegn til, at her har været Korn-Ager, undtagen en Levning af Glædet, dog kan man ikke see, hvor stor Pladsen har været. Nærmest er dog, at Stedet har havt Jord nok, den Tiid denne Mand tog det op, og hvad det ikke haver havt, det kan han have skaffet ved Gødningen. Jorden kunde og læt, i saa mange Aar, siden han levede, blæse op og udpisfes, især paa saadan en hårdende Grund, allerhelst om den har været, i den Tiid, saa gruusagtig og steenet, som den er nu. Forbemaeldte Hr. Thorlacius, som var nu 70 Aar gammel, og kunde ganske godt erindre sin Bestefader, fortaalte, at han aldrig havde faaet indhøstet meere end 1 Tonde Korn, men hvor stor hans Udsæd havde været, eller hvad Redskaber og Omgang han havde brugt ved denne Sæd, erindrede han ikke. Gunner Hamundsens, eller de ældgamle Agre, ligge paa Sletten neden og sønden for Gaarden, hvor man endnu kan see nogle Tegn til Agerfurverne; Jorden her var blød og frugtbar, samt blandet med Leer, og syntes endnu bekvemmere til Kornvæxt, end hin oppe i Tuunet, hvile den maafee har været alt for god, da den blev desuden, i begge Aarene, giødet stærkt med Koemøg. Kaal-Haven paa Hlidarende var i god Stand.

§. 878.

Et andet Forsøg var gjort paa Moedarbhol af Stedets ^{Forsøget paa} Eier, Eyffelmannd Thorsten Magnusen, hos hvilkens een af Bon- ^{Moedarbhol,} derne havde pleiet og besaaet et Stykke af Tuunet, som var middel-

Ddd ddd 3

maadig

maadig seedt, og syntes ret bekvemt. Forsøget var her gjort 3 Aar i Rad, og Spisselmanden tilstod, at Sæden var alle 3 Gange voren hastig op, og havde staaet meget godt med temmelig Riærne, som dog, saa Stængler undtagne, ikke bleve ret modne, og altsaa ikke brugte til andet, end Foder for Creaturene. 1756, om Sommeren, da vi vare her, var intet saaget i Agrene, fordi hverken Eierne eller Bonden havde Haab om bedre Fremvæxt. De Sæde-Arter, som bleve forsøgte, saavel her som paa Hvidarende, vare Byg, samt Vinter- og Vaar-Rug. Her var ellers en Have med Raal og endel andre almindelige Riøffen-Arter, hvilke stode ret godt. Her og Hamp var her og bleven saaget, og begge Deele vorede, især kom den sidste Væxt til nogen Modenhed. Paa Odde-Præstegaard, kort herfra, var ogsaa en Raal-Have, men ikkun meget lidet opkommen deri.

§. 879.

Forsøget paa
Hialmholt.

Vi komme til Hialmholt den 21 Aug. 1756. Eierne af denne Gaard, Spisselmand Brynjolf Eibertsen, har gjort sig megen Umage for at rogte Jorden, og sætte Gaarden smukt i Stand, baade i Bygning og andet. Stedet ligger i Floen, en meget lav og myresuld, folgelig overalt kold og fugtig Egn, dog er Tuunet og Grunden, som Huusene staae paa, noget lidet hoiere. Her var anlagt en temmelig stor Raal-Have, hvor Riøffen-Arter, især grøn og hvid Raal, stode godt, ja meget bedre, end paa andre Steder, som vi have seet eller spurgt til i dette Aar. Jorden var her sort, fugtig og vel giødet. Men med den her anlagte Alger var det ikke saa; thi nu først begyndte de spæde Blade at krybe op af Jorden; og til denne sildige Væxt vare tvende Aarsager, nemlig Jorden og Gødningen: Grunden var lav og vaad, folgelig kold, og tog ikke
syn

synderlig imod Solens Varme. Den hældede imod Osten, saa at ikkun en Strimmel af Ageren havde nogenledes tør Bund, men Resten var heel fugtig, og Giodningen den havde faaet, skiont den ei var bleven sparet, kunde ikke hjælpe; thi den bestod af Roemog, som er alt for koldt. Endnu een Forhindring for Væxten havde og nogen Sammenhæng med Giodningen, skiont den ikke bor regnes til den i og for sig selv, nemlig, at her var overalt opvoxen en stor Mængde Arve, og dette Ukrud tog al Næring fra de spæde Planter, saa at de kunde ikke voxe. Vi sagde, at denne Forhindring har Sammenhæng med Giodselen, thi det er just Roemog som Arven meest voxer efter, fordi Roerne kunne ikke fordoie Groet, naar de æde det, men det kommer heel igjen i Moget, og derved i Jorden. For begge disse Aarsagers Skyld havde det altsaa været bedre, at bruge den Giodsel, som Saarene gibe, thi den er heed og frugtbargjørende, og den slumme Arve forplantes ikke ved den. Man maae ellers ikke indvende herimod, at Arve ikke just avles af Roemog, fordi denne Giodsel bruges allermest til Tuunene i Jesland, og dog sees der ingen Arve. Thi dette er læt at begribe: Arven kan hverken komme ned, eller træffe tilstrækkelig Jord, i den faste Grund, som er bunden med Græs-Rodder; men i Haver og Agerlande, hvor Jorden er ploiet eller opstueken, folgelig løs og aaben, der kan Arvesroet strax finde Sted, og voxe uden Hinder. Udenlandsk Korn og Groe, som kastes i saadan en Jord, bag efter Giodningen, kan ikke saa læt fatte sig i en fremmed Jordart, som en indfødt Plante; tilmed er Arvesroet alt begyndt at briste og spiire i Jorden, naar man saar Kornet; og omendskiont Jorden omværes ved den Leilighed, tilligemed Giodningen, og Arvesroets Stilting bliver derved forrykket, da vil det dog intet sige. Dette Ukrud

taaler

taaler denne Uroelighed, og søger eller vender sig idelig op ad hvor Luftsens Varme kommer fra. Endelig maa det mældes, om de Holte og Høie, der ligge i Myre eller Sumpe, at endskönt de ere uendelig beklædte med Jord og Græs, blive de ikke derfor bekvemme til Kornvæxt, fordi de ere inden i enten huule, eller dog svampsagtige, af Steene og Gruus; derfor trække de altiid Fugtigheden af Grunden, og selgelig Kulden med, op i Jordskorpen, som bliver løs og aaben ved Dimpløining, Harven o. s. v. Dette kommer ei alene overeens med Erfarenheden i Jsland, som tildeels er lagt for Dagen, i Anledning af de Forsøge til Agerdyrkning, som ere giorte paa Nordlandet; men andre Landes Erfarenhed bekræfter og det samme.

§. 880.

Forsøget paa
Vedse og i
Neykeviig.

Forsøgene paa Vedse og i Neykeviig ville vi tage under eet, siden de bleve førte saa godt som under samme Opsigt, og Stederne laae saa nær ved hinanden, at man snart hver Dag fik Bud her imellem. Det var det nye privilegerede Jslandske Interessentskab, som Hans Majestæt, foruden mangfoldige andre Naadesbeviisninger, og Kongelige Gaver til Jslands Opkomst, havde tillagt en vis Summa Penge, for at underholde de ovennævnte Bønderfamilier. Amtmanden og Landfogeden, med nogle af de fornemste Spsselmænd, havde Opsigt over alle disse Ting, og hvor de ikke naaede til, skulde de andre Kongelige Beriente see til, og soie Anstaker, at Værket kunde drives, og Bønderne faae Jorde, Handlangere og Kost. Neykeviig var det fornemste Sted for Selskabets Indretninger, hvor man og holdt en Bogholder for at bestyre Arbeidet. Her blev da nedsat en Bønde. Paa Vedse boede Landfogeden, som ligeledes tog een af Bønderne til sig, og drev paa,
af

af al Magt, at disse Forsøge maatte faae en lyffelig Fremgang. Jorde til Korn-Agre bleve altsaa optagne paa begge disse Steder, allerede om Sommeren 1752, og især, paa Bedøe, vidtloftige Stykker. En stor Have, til Mad-Arter, blev der ogsaa indrettet. Men vi ville nu først ikkun tale om Korn-Agrene. Dette Aar blev til Prove saaret Vinter-Rug paa Bedøe. Jorden var vel i Forveien ikke synderlig roget, endskjønt den udgiorde et Stykke af Tuunet; dog syntes den ei ubekvem, thi den bestod af sort Mad-jord, blandet paa nogle Steder med foromtalte røde Muld (S. 858.), samt Sand og smaa Steene. Stedet hældede noget imod V. og S.V. Men ingen af de optagne Agre var i Skul for Nordenvind den; dog det vilde ikke sige saa meget, paa et lavt Deland, hvor Grunden ellers var god og fast, og Nordenvinden ikke en Landvind, men snarere en Havvind, hvorfor der ikkun sielden falder stærk Blæst eller Kulde af denne Kant. Vinteren var meget stærk, med ubestændigt, vindigt og koldt Væir. Sæden blev dog vel forvaret i Jorden. Først i April 1753, fra den 4de til 15de, var godt og mildt Væir den meste Tiid; Vinter-Rugen voxede da op og tegnede sig vel. Men derpaa kom haardt Væir, med østlige Vinde, da en stor Deel gik ud igjen. Aarsagen var ikke saa meget Fresten, der tog paa de unge Planter, som denne, at Rødderne komme op og bleve bare, ved det tørre Væir forblæste og bortførte Jorden, som ikke havde megen Fædme eller Gødning i sig. Maaskee Sæden havde begaaet sig, hvis den var kommen lidet dybere ned, eller var ikke kommen alt for tiidlig op. Nogle sagde ellers, at den var saaret for sildig, og at det var Aarsag til, at den gik ud, hvilket vi ikke begribe. De Sæde-Arter, som siden bleve prøvede paa Bedøe og Rønkeviig, vare Vinter- og Daar-

Rug, Byg, Havre, og Blandnings-Korn. Den sidstbemældte Art slog allermindst Feil; Byg voksede og jævnlighst alle de Aar, som Forsøgene bleve fortsatte. Iblandt Rugen og Havren var der tidt god Kiærne; men disse tvende Sæde-Arter voksede dog ujævne re end de andre. I Reykeviiig var Sæde-Jorden inavrere end paa Bedøe; den havde heller ikke saa dyb Grund, thi her ere Holte og Steenbakker under den ganske Egn, og tæt ved Huusene er Jordens sværen reent forblæst, optorret og bortført af Vindene. Alligevel fik man der alle de 4 Sommer god Kiærne i en Deel af Sæden. Et Aar kom een Art, et andet, de andye, til størst Guldkommenhed; dog blev aldrig noget af dette Korn aftarstet, fordi Kiærnen var blød for den største Deel, folgelig blev det ikkun brugt, som andet Høe, til Foder, hvilket ikke næe betalede Umagen og Bekostningen. Paa Bedøe kom vel Sædefornet til større Guldkommenhed, med flere Ayr og riigere Kiærne, end paa Reykeviiig; der var ogsaa optaget langt større Agerland, og samme blev tillige meget bæder passet: alligevel var den Deel af Kornet, som fik en haard Kiærne, saa liden, at man holdt det ikke Umagen værdt, at søge den ud for at lade den aftarste, eller kun for Syns eller Proves Skyld, at lave Brød deraf. De Heste, som bleve brugte til Pløven, og til at føre Steen hjem til den nye Bygning paa Bedøe, node det beste af denne Agerdyrkning. Den Jydsk Vonde, som var her, passede dem op, og fødrede dem med Agrenes Afgrøde, hvorved de unge Plagge voksede usædvanlig til, og bleve overmaade stærke og feede. Det var ellers i 5 Aar, at disse Forsøge med Agerdyrkningen bleve fortsatte paa Bedøe.

Hvad Kaal og de almindeligste Mad-Urter angaaer, da blev deres Dyrefning paa mange Steder sonder paa dreben temmelig godt, især i Forstningen. Vi have nævnt nogle Steder (§. 876 til 879.), og hertil kunne endnu flere lægges. Paa Skalholt har man lagt sig efter Kaal i det mindste i 70 Aar, naar man undtager nogle saa, som kunne være indfaldne imellem; den blev og endnu saaet der i denne Tiid. Nogle Bønder hist og her anlagde og Kaal-Haver, især een i Grimsnæs, og en anden often for Havnes fiorden, hvilke bragte det saa vidt, at det blev dem til Rytte. Men Haverne paa Reykeviiig og Bedoe, og især paa det sidste Sted, vare dog de fornemste og største. Alleslags Kaal-Urter voxede godt paa begge disse Steder; især gjorde den grønne Kaal, som ogsaa blev indsat til Winter-Forraad paa Bedoe, en betydelig Rytte i Huusholdningen. Vi saae endog Blomkaal i Reykeviiig, Aar 1762, men Hovedet var ikke blevet nær saa stort, som eengang i Sødlogsdal (§. 592). Hvidkaalen voxede i store og tykke Blade, men kom ikke til Hoveder; saa at vi ikke erindre at have seet uden et eeneste Kaalhoved, paa Bedoe, som dog havde luffet sig blot af en Hændelse. Hvide-Roer, Røddiker, Rodiser, Karse, Thymian, Meyran og flere Kryder-Urter, voxede her godt. Urter bleve forsøgte paa adskillige Steder, og til dem optagen en Alger paa Bedoe, men de vilde aldrig slaae an. Hamp og Hor bleve saaede paa Bedoe og i Reykeviiig, og voxede saaledes, at man eengang fik samlete temmelige Prover deraf. Patæter (§. 593.) eller de rødhindede Jordeppler, bleve forsøgte mangesteds sonder paa; i Særlighed opmuntrede Stiftamtmand Greve Rangkau de Kongelige Veliente dertil, ved at skikke dem Aar efter andet noget af

denne Jordfrugt, for at giøre Prové; dog kom den ikke til betydelig Fremvegt eller Fordeel, uden hos Probst Thorgerfen paa Garde ved Havnesfiord; men som han gjorde sig en særdeles Umage, for at rogte Pataterne, saa var han og lykkelig, i at faae dem meget store, end man fik dem paa andre Steder i Landet; men derimod fik han ikkun saa i Tallet; de største hos ham bleve paa 6 til 8 Lod; han overlod ogsaa, til nogle af hans Naboer, noget af disse Patater, til at giøre Forsøg med, hvortil den røde Jord paa Sønderlandet er meget bekvem. Træ-Plantningen blev heller ikke glemt eller uforsøgt; dog maae vi reent ud sige, at disse Forsøge bleve hverken foretagne med den fornødne Viidenskab, eller udførte med nogen Drivt. I Besseteds Have bleve, i Aaret 1752, nedsatte nogle unge Pile, som spirede ud med nye Blade, men ginge dog ud samme Sommer. Et Vedoe og Dreyevlig bleve og førte nogle af samme Slags Træer, samt Hylde-Gran, og flere Arter, men de vare alle ude i det andet Aar. Vinterens Strænghed fik for- nemmelig Skyld derfor, var det og tildeels. Granfrøe (de Røgne Bær og Gran bruges her i Slæng og sammenblandes §. 640. 1 og 2) blev saaat vilde paa adskillige Steder paa Vidoe, især i Strands Klipperne, men alt saadant gik reent ud i det 3die Aar.

§. 882.

Andre Steders Forsøge.

Fra Sønderlandet gjorde man Anstalter til at forplante Ager- og Have-Dyrkningen til adskillige andre Steder. To Familier af de fremmede Bønder bleve derfor skikkede til Borgerfiorden, og een til Dale-Syssel; man skaffede dem de beste Jorde til at giøre Forsøg med: men Slutningen blev her den samme, som paa alle de foransførte Steder, at der blev intet af med Kornsaeden. Derimod, hvor disse Bønder, eller ogsaa Indbyggerne selv, gjorde Prover

Prover med Madurter, havde de bedste Lykke. En Præst i Dales Syffel, navnlig Jon Biarnesen, anlagde en stor Kjøkken-Have, og fik alleslags Madurter frem. Men det underligste var, at alle disse Folk lode det kun blive ved at gjøre Proverne, og holdt efter nogle Aar ganske op dermed. Hvas skulde man slutte (de ommældte saa Steder (§. 881.) undtagne), at man aldrig er kommen ret skaffens i med, at anvende dette Slags Arbeide til Næring og Nytte i Huusholdningen; da det dog var det væsentlige, hvilket haade Dyrigheden, og enhver især burde have seet paa.

§. 883.

Easerne mærke vel af vore Beretninger, saavel om Nordland Betænkning om Agerdyr- ningen. det (§. 729.), som især om Sønderlandet, og nærliggende Egne, at alting blev forgiæves, og Forsøgene uden Frugt. Hvoledes Fremmede ville denne herom, kunne vi ikke viide, men ville alene fremsætte vore Tanker. Alt der kan vore Korn i Jøland, endog i disse Tider, er klart af disse Forsøge, thi det har saaret sammesteds fuld Bægt og riig Kiærne. Men derhos sees og, at dette Korn kan ikke blive, i Almindelighed, saa fuldkommelig modent, at Kiærnen bliver haard. Dog kan det skee tildeels, thi de fleste Gange ere dog fundne nogle Stængler med haarde, tørre, og blege Af; ja man har, paa Hlidarende, saaret en Stump ganske moden. Spørger man nu om Aarsagen, da svares sædvanlig, at denne er Mangel paa Varme. Men det kunne vi ikke troe saa liige frem, men heller, at den ligger i den fugtige og ustadige Luft, ved den Tid af Aaret, som Kornet skal modnes, da der kun sjælden falder saa langvarigt Torreveir, at det kan blive haardt i Kiærnen. Spørger man videre: hvorfor da Kornet ikke kan ligesaa vel modnes nu, som i de gamle Tider? da vilde vi svare, at det vist nok

endnu modnes ligesaa fuldt; i det mindste kan der aldrig beviises, at det har faaet haardere Kiærne i forrige Tider, end nu. Og dette synes da at blive heele Knuden. Man har meent overalt, at det Jslandske Korn duede ikke, fordi de fremmede Vonder fra Jysland og Sønderdeelen af Norge, forstode dem ikke derpaa, da de kun vare vantte til en haard Kiærne i deres egne Lande. Men vi have Erfarenhed, og den noksom tilforladelig, at den bløde Kiærne kan blive ligesaa tienlig og god, deels ved at tørres ude paa Agseren, efterat Sæden er afmeiet, som man endnu gjør tidt og paa mange Steder i Norge; deels ved at bages over Jlden, som man gjør ved det vilde Korn paa Østerlandet, hvis Kiærne heller aldrig bliver haard (§. 813). Det er endog forunderligt, hvor blind man har været i denne Post. Thi omendstiont det ikke var bekiendt om Østlænderne, at de maatte bage deres Korn, for denne Aarsags Skyld, men alene, som Sorrebow (Tilf. Esterr. §. 86.) mælder, fordi deres Kiærne vare saa flatte: saa er dog bekiendt, om Indbyggernes paa Færoe, at Kiærnen i deres Byg bliver aldrig haard, og at de derfor maae bage den (see *Lucas Debes* p. 237). Ja man har og, paa endel Steder, og paa visse Tider, i Norge, maattet gribe til samme Middel; Russerne maae ogsaa bage deres umodne Rug (see v. Savens Russ. Reise Part. 1. Cap. 4.). Vi ere altsaa visse paa, at om man havde ladet komme til Jsland nogle Vonder fra Færoe, skulde man have faaet derfra ganske andre Tidender, nemlig at Sæden voxede der godt, og kom saaledes til Fuldkommenhed aarlig, at man havde faaet, der og der, saa og saa mange Vonder til Underholdning. Men det var ei engang ganske fornødent, at gjøre saadan Bekostning alene for denne Aarsags Skyld, da Færoingerne Agerdyrkningsmaade er ellers meget molsom.

fommelig og lidet fordeelagtig. Naar ikkun Øvrigheden havde besigtet nogle Karle fra Østerlandet, for at see paa Klærnen, skulde den samme Sandhed have kommet for Lyset. Desuden kaldt der i Jøland saa godt Veir, i de ommæltede Aaringer, at Kornet kunde de tidt blevet tørret ude paa Marken, hvis man havde vidst det, og brugt den Norske Omgang dermed (see Sødm. Bøff. 1 D. pag. 347.), hvilket saa meget heller burde været forsøgt, som eet Sted i Historien viiser, at de gamle Jølandere have og brugt selsamme Maade, ligesom den ventelig er gammel i Norge. Nu maatte vel nogen spørge: hvorfor dette da ikke blev sagt, enten til Bønderne, eller til dem, som lode giøre Forsøgene? Jo, det blev sagt allevegne, men det var at tale for de Døde. Forudsatte de Meeninger have meget at sige hos Mennesker; og Bønderne især vilde ikke forlade deres Forsædres Maade, og kunde ikke heller finde dem i den; de Norske vare desuden fra Sockanten, og havde ikke havt ret meget at bestille med Agerdyrkning. Endelig syntes Øvrigheden og Jord-Eierne, at denne Maade var alt for slet til at fore i Brug, ligesom den Jølandske Himmel-Egn var ikke tienlig nok til at frembringe Korn, uden saadant Gufferie. Med eet Ord at sige: man vilde at dette Land skulde agtes for bedre, end det var, og formeelst denne patriotiske Tænkemaade blev det anset for slettere, end det virkelig er. Nogle af de fremmede Bønder havde og deres Fordeel herunder. De bleve holdte for godt, man gav dem fremmed Meel og allehaande Levnetsmidler, endogsaa Tobak, Brændevin, og Specerier, og det for slet intet. Havde man kun sparet paa Meelet, tilholdt dem at skaffe dem det selv af Jorden, og viist dem derhos den Maade, at emgaaes Kornet paa, som de selv ikke vidste, da havde Sagen faaet et ganske andet Udfald. Men

det

det gif disse Vonder, som det gaaer mange andre: de bleve kiæde af de gode Dage, vilde og ikke lade sig befale; Indbyggerne bleve ogsaa kiæde af at holde paa dem, uden al Nytte. Altsaa drog nogle af dem bort 1756, og Resten Aaret efter; og dette blev da Enden paa disse Lidders Forsøge med den Jslandske Agerdyrkning. Men man havde gjerne kunnet holde ved at forsøge endnu flere Aaringer, skiont disse Vonder vare borte, thi der vare mange i Landet, som havde lært af dem den heele Omgang; men Lykken var borte, og gid den ikkun havde været ledsaget med noget større Bilsdenskab, Taalmodighed og Nidkiærlighed for det Almindelige! Inidertid have vi dog Erfarenheden i Hænderne: vi have selv taget Af af dette Korn, tørret dem paa en Kaffelovn, og bragt derved til Veie en skiont hvid og haard Kiærne. Vi haabe ellers ikke, at nogen skal kunne tvise om vore Beretningers Rigtighed; og om de Slutninger, som vi have gjort deraf, kunne de Skionsomme lettes sig domme.

Indbaanerne.

§. 884.

Legems Beskaffenhed og Eggdomme.

Indbaanernes Legems Beskaffenhed paa Sønderlandet er meget forskiællig, meest fordi her er en Blanding af alleslags Folk, besynderlig ved Sockanten, hvorhen mange søge fra andre Steder, fornehmelig fra Nordlandet og Borgerfiorden, blandt hvilke nogle gifte dem her, og blive her siden. Nogle fra fremmede Lande, især Danske og Tydske, have og sat sig her ned, meest siden de nye Indretninger begyndte. Sønderlandets egentlige Indfødte ere ogsaa indbyrdes forskiællige i denne Post. Om dem, som boe paa Øylandet, giælder det som før er sagt om Risør-Øyffels Indbaanere

nerer (§. 33). De derimod, som ere opdragne i Fiskeleierne, see, overhovedet at tale, ikke saa godt ud, eller ere saa vel skabte, som hine; dog bor de undtages, som ere af bødre Slægt, end den gemeene Mand, og have nydt god Opdragelse. Angaaende Sygdommene gjælder her det samme, som i Kiögar-Syffel (§. 34.), undtaget at den der opitalte Börne-Sygdom (loc. cit. c) er ikke almindelig uden for Guldbrynge-Syffel. *Rhachitis*, eller den Engelske Syge, har, efter Biarne Hovelsens Beretning, sættet Rodder paa Bestmaand, og er uden Tvil indkommen fra Kiöbenhavn; thi Danske Familier have i lang Tid opholdt sig der, for Handelens Skyld, og een efter anden er støttet did. Det er endog at frygte, at denne Sygdom ogsaa vil komme til det faste Land. Den saa kaldte Spedalskhed er her meget giængs, og fornemme Folk ikke engang fritagne deraf. Hospitaler for dette Slags Syge, i denne Hierdung, har været paa Klostherholte i Grimsnæs; men for nogle Aar siden er det blevet forflyttet til det Kirkested Raldadernæs i Floen, kort fra Dreback's Havn, hvor dette Næs løber ud i Øresund. Paa Gufunæs er et andet Hospital, støttet derhen fra Vidoe, for nogle Aar siden, hvor Kongen underholder gamle og sygelige Bønder og Bønderkoner, af sit eget Gods paa denne Kant. Med de fremmede Folk, som have sat sig ned, eller opholdt sig her, er een og anden nye Sygdom kommen ind i Landet, fornemmelig sander paa. Tandpiine, Feberer o. s., kan man tilskrive Levemaadens Forandring. Den veneriske Syge begyndte i Aaret 1753 at ytre sig i Guldbrynge-Syffel. De uvildende Indvaanere, især de ganske uskyldige, vare i Forstningen alt for meget uagtsomme derved; dog gjorde denne Sygdom ikke nær saa megen Skade, eller greb saa hæftig om sig, som man skulde have tænkt. Det er ellers

i denne Henseende en usfatterlig Begierning, at Hans Kongelige Majestæt har nu nyelig fornyet Landet en almindelig Læge, som aartlig bliver forsynet med Lægemiddeler udenlands fra, hvoraf han skal, for Intet, forsyne de Fattige og Dødsdøende. Han skal ogsaa antage bekvemme lærvillige unge Folk, til at lære Lægekunsten, i Særdeleshed Anatomie og Chirurgie, samt øve dem i Praxi.

§. 885.

Sindets Be-
kaffenhed.

I Hensigt til Sindets Beskaffenhed ere Sønderlandets Indbyggere temmelig ulige. De Indfødte i Guldbrynge-Egssæl ere som de i Kløse-Egssæl (§. 35.), uden Tabid de Folk, som komme fra Nordlandet, eller fra andre Steder, gjøre nogen Forandring deri. Alpenæsingerne, eller de, som boe nær ved Besset, holdes for flette Folk; dog gælder det ikke om alle. Bønderne i Eggen omkring Skalholt regnes iblandt de fletteste; dog ere de ikke saa vanartige, som ugle og ubehovlede. Der er ellers almindeligt paa Sønderlandet, ligesom i de andre Fierdunger, at de Folk, der boe nær ved de Havne, som besøges af fremmede Skibe, holdes for de vanartigste og udeligste; og Naesagen er, at de lære af de Handlende langt meere ondt end godt; de Gammles Levemaade er uordentlig og tildeels umaadelig; og Ungdommens Opdragelse bliver derefter, dog herved ikke nægtet, at der jo ogsaa findes stilleslige Folk baade iblandt disse Steders Beboere selv, og iblandt de Handlende. Prebakkens Indvaanere have ellers, af denne Naesag, Ord for at være vanartige og ureensfærdige. Her boe og, paa en liden Plads, mangfoldige Menneffer tilsammen i en Sted, der udgjør et stort Kirke-Sogn. Der tælles 19 store Gaarde, som gjerne have flere end een, ja 3 til 4 Familier, og henved 90 smaa Bøndergaarde, Hjaaleier eller Huusmænds Pladse iberegne.

Hand-

Handlingsstedet her er et af de største, i Hensigt til den Mængde, som søger hertil, fra Sønder- og Øster-Landet. Altermest handles her med Kvæg, hvilket bliver slagtet, nedsaltet i Sønder, og udført til Kiøbenhavn; og til dette Slagterier leie de Handlende Folkene fra Dreback, giærne een fra hver af de nærliggende Gaarde. Hver af disse Slagtere haver igien Handlangere af sine egne Folk, især Born og Fruentimmer; og dette Slags Arbeide er eet af de ureenligste, som Indbyggerne forrette; især have de Unge kun siden Fordel derved, i Hensigt til Søderne og Opførselen, da her sædvanlig gives alt for megen Anledning til at lære en og anden Grovhed, Vedragerier, Skældsord, Vandens, og Druffelskab. Ovenfor Drebacken ligger det Landskab Gloen, hvis Indbyggere udraabes for taabelige, og kaldes derfor skæmtewiis Gloasiff. Men dem giores heri ligesaa meget Uret, som Østlænderne (§. 808.), og dette Ord maa være opkommen ved en særdeles Vilsighed; thi naar man taler med dem, kan man ikke mærke, at dem seiler Fornuft, meer end deres Naboer. Næmeligt kan ellers foranførte Beskyldning have sin Grund deri, at de ere ligesvem i deres Opførsel; de komme og kun siælden uden for Bygden, da de ei giærne reise uden til Kirke, thi deres Bygdelaav giver af sig alt hvad de behove til Livets Ophold, paa det lidet nær, som bliver dem tilført, deels af deres Naboer, og deels af de Handlende. Endelig kan og det have hjulpet hertil, som Indbyggerne i Gloen have tilsælles med dem i Skæfteskiælds-Syffel, nemlig at de bruge en Deel Ord og Talemaader, som ikke bruges andensteds, af hvilke de fleste dog ere baade gamle og gode; men for dette fortiene de saa meget større Roes, som der er intet Bygdelaav, nær ved Havnene i Jøland, der have beholdt Sproget saa reent og usforandret, som dette. Indbyggerne i Rangaar-

valle-Syssel kunne regnes iblandt de stikkeligste Folk i det heele Land: de ere sparsomme, slittrige, gode Landmænd, og derhos tjenstvillige og artige i Omgængelse. Det Stykke af Narnæs-Syssel, som kaldes Grepperne, linellem Thiorsaa og Hvidaa, har ligeledes stikkelige Folk og gode Huusholdere.

§. 886.

Sproget. Sproget er ingensteds saa meget, som her, blevet forandret og opfyldt med fremmede Ord, fornemmelig Latinske, samt nogle af Tydsk og Fransk Oprindelse. Dertil ere i Særdeleshed følgende 4 Aarsager. Først de Tydskes Handel noget for og ved Reformationen. Dernæst de fremmede Folk, som deels have sat dem her ned paa mange Steder, deels havt her Forlæninger og offentlige Embeder; hvortil ogsaa komne de mange Havne og Handelspladse for Fremmede, som ere blevne anlagte paa denne Kant, just paa de Steder, hvor Fiskeriet er best, og hvor de fleste boe. Det tredje, som og hjælper noget hertil, er Althinget. Alleslags Folk søge dertil, og meest fra Sønderlandet, baade Bønder og Lavrersmænd. Nu er bekiendt, at Nættergangens Sprog er, i de sidstafvigte 30 Aar, blevet meget forandret, og blandet med allehaande fremmede Ord og Talemaader, af hvilke Almuen ikke forstaaer uden den mindste Deel; men den gjør sig dog Vre af, især unge Menneker, at bruge disse Ord, skönt de som oftest blive heel forfierre i deres Mund. Den sidste Aarsag er den Latinske Skole paa Skalholt, hvorfra en stor Mængde Talemaader og Ord er udkommen i Sproget: ikke alene Præstene have søgt at pynte deres Prædikener med dette Slags Skionheder, men Bønderne have og lært, og lære endnu en Deel, naar de, som jævnlig steer, komme til Skalholt, thi de ere nysgjerrige efter lærde Sager; dog vil dette nuomstunder
ikke

ikke siges saa meget, da det agtes for Vedanterie at bruge Latinske Talemaader, hvortilmod de Tydske og Franske ere meer nyemodige. Ellers lader det artig for Fremmede, naar Vonder, og andre, som ikke have lært Latin, hilse i dette Sprog, sigende: Salve Domine, Bonus Dies, Bonus Vesper, Gratias, Proficiat, Dominus tecum, Vale, o. s. v. Imellem Præster og studerte Folk bruges disse og deslige Talemaader daglig, ei alene sonder paa, men ogsaa overalt.

§. 887.

Det som er sagt om Bygninger, Huuse og Gaarde i Kiofer Bygninger, Syffel, kan overhovedet gælde om heele Sonderlandet. De fleeste ^{Huuse og} Gaarde ved Soefanten ere flattere end middelmaadige, og især have Bestmannoe, Drebacken og Sonder-Næssenes Fiskeleier de flattede og ureentligste i denne Fierding, og omrent af samme Slags, som Bester-Josefens Fiskebyer (§. 496 ic.). Derimod have Grepperne og Rangaarvalle-Syffel de beste og reentligste. Dette er at forstaae om de almindelige Gaarde og Vonder-Huuse. Derimod ere her anseelige Gaarde og Bygninger i større Antal, end paa andre Steder i Landet. Især har Hans Kongelige Majestæt, i disse sidste Tider, ladet opføre og befestet paa denne Kant 3de grundmuurede Huuse: det ene paa Bidoe, for Landfogeden; det andet paa Besset, for Amtmanden, og det tredie paa Seltiornæs, for Landlægen. Disse ere af Brudsteene, som falde der i Landet, og Bindueskarnene af huggen Sandsteen, men Muursteen til Skorsteenene, og Kalken, er bragt did fra Kiøbenhavn. I Næstved er et Huus, bygget af Muursteen, med Bindingsværk, og Tagene af Tømmer. Herforuden findes paa Sonderlandet endel Kirker og andre Bygninger af Tømmer, s. Ex. Besset, Næstved,

Altthinget, Bispestolen o. s. f. Sysselmændenes og andre store Gaarde ere ogsaa smukt byggede efter Landets Maade og Leilighed. Herved maae vi erindre, at den Beskrivelse, som Anderson har givet over Gaardene i Jsland, er ganske usandskædig, og at den ikke engang passer sig paa de fletteste ved Søekanten; deri er ogsaa en haandgribelig Modsigelse, i Hensigt til Huusenes Høide. Hvad der berettes om Folskenes Leie, Sengelæder, med videre, er opdigtet uden ringeste Grund. Derimod er den Beskrivelse, som Zorrebom giver (Ulsforl. Esterr. p. 311. til 317.), ganske rigtig og nøie, og passer sig paa de fleste Bøndergaarde i Landet. Den Hinde, som ligger omkring Mæven i Kreatturene, især i Hornkvæget, hvilken kaldes Skæne, bruges vel ogsaa til Binduer, dog ikke almindelig, eller i de daglige Bærelser, thi den giver ikke god Lysning, skönt den er stærk og varagtig, hvorfor den meest bruges i andre Kammere, i Køestalde o. d. Den brugeligste derimod kaldes Liskærbelgur, bestaaende i den dobbelte Hinde, der omgiver Fosteret i Kreatturenes Liv (Morion & Amnium); den inderste og fineste (Amnium) kaldes især Vatsbelgur; og disse Hinder tages meest fra Køer, og iblandt fra Faarene, da de ere saa klare og reene, at man noget borte kan ikke see, at der er andet end Lufsten (§. 74).

§. 888.

Almuens
Spiise og
Diæt.

Hvad Almuen angaaer, kan den Artikel om Riosar-Syssels Indbyggernes Spiisning og Diæt (§. 39 til 49.) gielde her heel og holden. Den fornemste Spiise, især paa Søekanten, er Fisk, deels fersk, deels tørret, dog meest Torsk og Helleflyndre, med suurt Smør (§. 43-45.) til. Riød bruges her ogsaa, som Riøbes af Oplands Folkene, deels slagtet, deels og Kvæget levende, meest Faar og Beder.

Om:

Omgangen med dette Kiød er her beshynderlig: det roges ikke, som paa andre Steder i Landet, men hænges op og spørges lidet i Vindhuuse, siden kaages Suppe derpaa, og paa denne Maade spises det efterhaanden. Maden saaledes tillavet, smager ikke behagelig for dem, som ikke ere vant dertil, især naar Kiødet er for lidet salt: men fattige Folk finde alligevel deres Regning derved; thi naar Kiødet kaages paa denne Maade, giver det langt mere Tælle af sig, end ellers, og denne Feedme bruge de til at spare paa Smøret, som salder dem heel kostbart at kobe, helst i disse sidste Tiider, da Madoarerne ere, formodest de nye Indretninger, stegne til høiere Pris, end tilforn; thi hvad Smøret angaaer, har det aldrig kostet mere tilforn end 1 Tierdung, d. e. 10 Pund, 16 Fiske eller 2 Mk. Specie, som de Handlende give for stikkelig Smør; imod det steg i de sidste Aaringer, sender paa ved Søekantene, til 3 Mk. Specie, og 1 Eldr. iblandt. Ellers er den ommæltede Omgang med Kiødet, at lade det blive harist og noget lugtende, ikke just de nyere Tidders Vaasund; thi man seer det samme paa Færoe, og *L. Dohes* (p. 243.), som beretter det, anmærker tillige, at denne Maade er bleven ved fra de allerældste Tiider; saa mange 100de Aars Erfarenhed bekræfter det og tilstrækkelig, at Maden, som paa denne Maade bliver meget fordoelig, er ogsaa nærsom og sund for dem, der idelig arbeide og bestille noget: derimod for øresløse og svækkede Mennesker, bliver baade denne og mangan en sund og god Spiise, usund og urjentlig. Ingen retsindig eller fornuftig tænkende vil laste enten disse Folk i Island, eller dem i Norge, paa Færoe, eller paa andre Steder i Verden, for dette Slags Ting; men langt heller rose dem, at de have endnu holdt ved deres Forsædres eenfoldige, sparsomme og uskyldige Levemaade, uagtet disse

disse Eliders fordervende Overdaadighed strider der toertimod, og visse usornuftige eller kræse Menneſter, som ikke have smagt andet end Bøllhyſternes Kiølenſkab, have meget at ſige derpaa. Brændſelet er her Torv, og ved Søekanten, Thang og Thare, Torſte-Rygge og andet (§. 502).

§. 889.

De Fornem-
mets Leve-
maade.

Hos de Fornemmere, iſær paa Sønderlandet, er ſteet en fienselig Forandring i de ſeener Eider, omtrent paa 20, men allermest paa 10 Aars Tiid, ſaavel i Madens Tillavning, ſom fremmed Drif og Spiiſe, ja Diaten overhovedet. Beſtmagende og koſtbare Mad og Drifke-Varer, ſamt Specerier, indføres nu i langt ſtørre Tal og Mængde end tilforn, ja nogle deriblandt, ſom man for et halvt Hundrede Aar ſiden ikke eengang vidſte at nævne. Dette er en deſto ſtørre Ulykke for Landet, ſom Fattigdom har ligesaa ſtærkt tiltaget; da man toertimod ſkulde ſlutte, ſom mangel en Uſornuftig indbilder ſig nuomſtunder, at denne lækkre Levemaade var et Tegn til Indbyggernes tiltagende Beſtand. At bruge Oll, og Mad-Vter, og iſær at opelſke Have-Vter til Kryderie paa Maden, kunde være Indbyggerne nyttigt, ja endog fornødent; Forfædrene have og gjort dette tildeels. Man vil heller ikke tale ſaa meget om, endſkiont det virkelig er Skade for Landet, at der aarlig indkøibes og fortæres ſaa ſtor Mængde af adſkillige Slags Korn-varer, fremfor tilforn; thi ſaa længe den nu brugelige Huuſholdningsmaade, endog hos Almuen, ikke forandres, da behøve de det, og denne Spiiſe er i ſig ſelv baade ſund og god. Men den ſtore Mængde af Specerier og Biine, Brændeviinen uberegnet, ſom aarlig føres ind og bruges der i Landet, udarmer ei aleene Nationen, og gjør den kiælen og ſygelig, men forderver og Sæderne,

og




En fornem Kone .





En fornem Tomsfrue.






En Fomsfrue i Bryllups Dragt.

TAB.V.






En Islandsk Bonde
i gameldags Dräkt.





*En Islandsk Bonde Kone.
i skikkeleg Dragt.*



og omstøber dem meget uhædlig. Thee og Sukker ere nu bleone
saa almindelige, at snart hver en skikkelig Bønde har tillagt sig
Thee-Toi. Kaffee er ogsaa kommen i Brug, endskiont ikke endnu
hos Bønder, eller endel Præster, men derimod ere der andre, som
fortære daglig desto meere deraf. Maden smager ikke uden Kryde-
rie fra andre Verdens Parter, og til den skal man endelig have
røde og hvide Franke Viine, ja endog nogle kostbarere iblandt;
i Stedet for at rød Vin var ubekendt i Island for 20 Aar siden,
og den gemeene hvide blev ikke engang brugt, uden til de største Hø-
ltilde, og det kun af de Fornemmeste. Paa Althinget salder Leve-
maadens Forandring allermeest i Vinene. For 20 Aars Tid siden
noiedes alle Dyrigheds-Personer, uindtagne 2 eller 3, med koldt
Kioffen; Smør og Brød, med roget og saltet Kød, var deres
fornemste Spiise. Foreller og Mælk kiøbte de iblandt hos Bøn-
derne, havde og noget Oll til Maden. Men nuomstunder føre de
fleeste Koffe og Kioffen-Toi med dem, og bruge saa og saa mange
Retter til hvert Maaltid, især naar de gjøre Gæstebud. Sukker
og Specerier ere noget almindeligt; Røde og hvide Viine bruges
ogsaa daglig. Dette maae være nok sagt om denne Post. Man-
ge rose denne Levemaade; især holde de Fremmede meget af Folk,
der vilde saaledes at leve. Det heeder, at Handelen blomstrer der-
ved, at Indbyggerne behøvetes og blive omgængelige, med meget
andet. Men den sandede Patriot tænker ventelig anderledes.

§. 890.

Angaaende Klædedragten er især at mærke, at Bønderne
over heele Landet gaar i sorte Badmels-Klæder, saa at man skalde
tænke at de forgede idelig. I gamle Dage derimod have de ikke
gaaet sorte, men brune, graa og hvide, og til Helligedage havde

Klædebrag-
ten.

Ggg ggg

mange

mange af dem blåa og røde Badmels-Kiorteler. Nuomstunder bruge de korte Trøier, og naar de reise, sorte Rapper eller Hemper af samme Toi, Hat eller Kabuds paa Hovedet, og paa Fodderne tynde Skoe af uberebet Læder, og af samme Slags, som tilforn bleve brugte overalt i Norden. Blidere bruge de knyttede Undertrøier og Strømper, men Underbuxer og Skjorter af ulden Censklædt, erlags tyndt og hvidt hiemmegiort Toi, vævet som Mulsuum. De Geistlige gaae ogsaa, for den største Deel, klædte i sort Badmel, hvoraf ogsaa Præstekioler og Underkioler sædvanligst ere giorte. De Verdslige gaae meest i affarvede Klæder af fremmed Toi, tilforn ikkun af Uld, men nuomstunder er Silke og Fioiel blevet almindeligt, især Silkestrømper, samt Silke og Fioiels Bæster. Præsterne især støde sig herover, fordi Kirkens Prydelse er saa meget slet næsten overalt. Messe-Haglerne ere paa de fleste Steder ikkun af ringe uldent Toi, og Næsten af de Prydelser, som bruges til Gudstienesten, er derefter, thi de fleste Kirker ere fattige, og kunne ikke bekoste dem bedre.

§. 891.

Almindeligt
Arbejde.

Det, som er mædt om Indvaanernes almindelige Arbejde i Kiofar-Syssel (§. 50 til 53.), passer sig overhovedet paa Sønderlandet, og især hvad Land-Arbeidet angaaer, det som er sagt om Borgeffords-Syssel (§. 281-284.). I Guldbrynge-Syssel har man fornemmelig at bestille med Jiskeriet, baade Vinter og Sommer; men derimod, i de 2 østligere Sysseler, med at rogte Jordden, slaae og indhøste Høet, og passe Kreaturene. I Thingvalle-Syssel tager Forellesfangsten temmelig Tiid bort; og de, som boe nær ved Althinget, vinde ved at sælge denne Fisk daglig sammes feds. Løsemænd (§. 505.) ere her alt for mange, og Arbeids-

Looven

Vonnen (§. 54-56.) alt for høi, baade hos dem og andre; thi 10 Fiske om Dagen er det mindste en Arbejder faaer for slet og ret Arbeide. Ingensteds er dog Arbeids-Vonnen høier end i Guldbrynge-Eyffel, hvor den især er anseelig steegen i de sidste 10 Aar. Men at denne Forandring er meget skadelig for Landet, og passer sig ikke til dets flette Omstændigheder, det seer vel enhver Fornuftig, endog ved første Biekast.

§. 892.

Det største og jævnligste Arbeide paa Sønderlandet falder ved Fiskefangsten, hvis Hovedposter og Regler, som vi have beskrevet i det 3die Stykke (§. 508 til 516.), ogsaa tagtages her. Vi ville altsaa fornemmelig nævne om Fiskeleierne. Fra Vefsiølds-Stranden drives Fiskefangsten heele Tiden, dog meest, fra tiidlig om For-aaret indtil St. Hans Dag, med store Vaade, meest Nattæring (d. e. til 8 Aarer), med 10 til 11 Mand paa, og Teinæring, til 12 eller 14 Mand, ligesom paa Vestmannøe. Man fanger her meest stor Torsk; men Stranden er farlig at lande til, for medelst de jævnlige Brændinger, hvorfor mangen en Fiske sætter her Livet til. Det samme er at sige om Landøerne. Her søge Indvaanerne Søen med langt større Besværligheder, end paa noget andet Sted i Landet, fordi Veien til den er fra Flotstid 3 til 4 Milie. De maae derfor gaae og ride hjemmen fra tiidlig om Morgen, medens det endnu er mørkt, for at naae betiids til Stranden, og imidlertid forandrer Bærligst sig ofte, saa at al deres Gang og Moie bliver forgæves. Neden for Rangaavalle, ved Rangaænes Udlob (§. 831.), har været et Fiskevær i forrige Tiaader, og nu begynde Naboerne at søge det igien. Fra Ørebækken drives Fiskeriet meest med smaa Vaade hist og her; dog ikkun af

Om Fiskeleierne og Fiskeriet.

Indvaanerne selv; men andre Egnes Beboere søge ikke derhen. Thorlafs Havn, vesten for Øbesøen, er et lidet Fiskeleie; men her begynde egentlig de Fiskepladse, hvoraf Kysten i Guldbrynges Syssel er saa meget bekiendt. Paa Selvaag, hvor Selvaagsøes Kirke staaer, falder meget gode Fiskeie, som drives med Sæveringer og Nattænger. Selatange, for Kriseviigen, er lidet Sted, er beleiitigt for Fiskeie, men det har en klipperig Strand, og besværlige Landesteder formedelst Brændingerne. Grindeviig, en Handelshavn og et Kirkested, har det største og fornemste Fiskeleie, hvor man bruger store og stærke Vaade, til 10, 12 og 14 Mand, ligesom paa Vestmannøe, fra Kyndelmisse til Kaarsmisse; men, for de andre Tiider af Aaret, mindre Vaade. Grunden horer deels Kongen, deels Bispestolen til. Her ere 5 Hovedgaarde, og til hver af dem mange Hjaaleier eller Huusmands-Pladse, som have et litz det Stykke Jord til at fodre en Røe. En Deel Fremmede søge hertil for at fiske; men Jaugsten slaaer dog undertiiden seil, for de idelige Brændingers Skyld. Til at kunne komme igennem dem, og iagttage Søestyrtningernes Tæt, samt Af- og Tiltagelse, behøves baade Hurtighed og Erfarenhed. I Grindeviig, og der i Eggen, holdes henvend 60 Vaade, fra 6 til 10 Aarer. Fornemmelig fiskes der stor Torsk, men derhos ogsaa ofte store Helleflyndre, ligesom i de omliggende Fiskeleier paa begge Siider. Til Vaadenes Bygning faae Indbyggerne nogen Hjælp af Drivetømmer, som falder i Grindeviig, dog paa Reykenæs, kort herfra, i størst Mængde. Hafnir kaldes nogle Gaarde paa den Sandstrækning, som er vesten for Reykenæs, og imellem samme og Vaadsands-Havn. Her drives Fiskeie; men Landjorden fordærvs og ødelægges aartlig af Glyvesand. Rirkevaag, imellem Hafnir og Vaadsand, har

været

været en Havn i gamle Dage: men nu er det vanskeligt at slippe derind, for de Skiers Skyd, som ligge uden for; ellers er Havn selv temmelig sikker. Stasnas er det fornemste og største Fiskerleie, nær ved Baadsand. Denne Gaard, med Haaletier og Fiskerhytter, hører Kongen til, tillige med nogle store Baade, som aarlig fiskes hid og befordres af Landfogeden. Her gaae overalt, paa den sandige Strand, meget stærke Brændinger, der giore Landingen usikker. Bøen, eller Landstedet, belægges her med store Bialter, hvor Baadene trækkes paa, op af Vandet, og Sommeret dertil tages aarlig paa Nyeleas eller andre nærliggende Drivetonmærs Plads, som tilhøre Kongen. Værtiden for de store Baade, hvilke ere af samme Beskaffenhed, som de i Grindviig, varet fra Kyndelmisse til Raarsmisse. Til denne, og andre Fiskerleier her norden for, søge mange Folk fra langt bortliggende Egne, som fra Narnæs og Borgefiords Syffeler, og især fra Nordlandet. Ellers besættes alle Kongens Baade med Echlændinger, af Hans Majestæts eget Gods; hvis de blive ude, maae de skaffe en Mand for sig, som de maae betale i Rdir.: men mange af dem giore glæde denne Udgift, for at kunne selv fore deres egne Baade; af hvilke de altid, især de Behavende, ei 1, 2 eller flere. Svalseas er en temmelig Fiskerplads og et Kirkested, kort fra Stasnas, imod Vesten. Gardur er der norden for, temmelig stor; og derpaa Skagen, er længe Næs som løber i Nord ud i Søen vesten for Kiebleviigs Havn. Alle disse Steder besøges meest, iskuu for en Tid, nemlig mellem foränsforte Høgendage, af Fremmede, som fiske der. I de andre Fiskerleier her norden for drives Fiskeriet mest, Næst omkring, med mindre Baade, og færre paa hver Baad. Alle de Fiskere, der ere imellem Skagen og Grindviig, søge til den

ovennævnte Mæstrom, Røfkenæs-Røst, naar det er muligt, thi det slaar dem sjælden feil, at de jo træffe Fiske her; men de maae ikke vove dem ud i Mæstrommen, uden i stille Væir, og det kun i den Tid, som Ebben stager paa. Leyre er et lidet Fiskested imellem Skagen og Klebleviigs Fiskehavn, og often for samme er et andet, kaldet Niardviiger. Her, og paa Vandløse-Strand, en Fiskeplads længer imod vesten, bruges til Fangsten Liner eller Ledliner, hvilket Redskab beskrives baade i Hr. Strøms og Pontoppidans Værker (se N. N. H. T. II. p. 251.). Her til Lands er en Krog eller Angel paa hver tredje Søllandst Alen, og man faaer derved i Fång baade Torske, Kollier og Røkker paa eengang. Vogastape kaldes en hoi, udgaaende Strandklippe imellem nævnte Strand og Niardviigerne. Den er særdeles bekjendt iblant Fiskerne, fordi der er, tæt uden for den, et stort Dyb, og et Mid, hvor Torsken gjerne opholder sig, og fanges tidt i stor Mængde. Det er ellers et almindeligt Sagn, at det store Næs, som udgjør det meste af Guldbringe-Eyssel, har Nabninger i Grunden, og især en viid Kanal fra Grindeviig til Waagestapen, hvor Fiske gaar igiennem. Det er ogsaa vist nok, at naar Fiske kommer til Sønderlandet østen fra, da Indbyggerne vlide hvor hastig den rykker frem imellem Fiskeleierne, saa er den ikke saa snart kommen til Grindeviig, at den jo ogsaa strax mærkes ved Waagestapen, endskjønt Veien hertil, omkring Røfkenæs, er 13 Mille, og ingen Fisk endda kan fornemmes i noget af de opregnede mellemtiliggende Fiskeleier. Den anførte Sagn er og i sig selv aldeles ikke urimelig; thi man seer og veed, at Grunden er her over og under omrømt ved Jordbrand, og aaben (§. 838. c og 847.); der maae og være Vandfalde, som have fri Gang ud til Røfkenæsens Mæstrom.

Vand,

Vandløse-Strand er en liden Strækning af Kysten, med nogle Gaarde, hvor Fiskeriet drives stærkt med smaa Baade. I Havnesfiord drives det ligeledes, og her bruger man Seilads paa Eemandsfar, ligesom udenlands; i Stedet for Roer bruges en Nare; ellers ere disse Baade svage, og alt for smalle til at føre Seil paa denne Maade. Det er noget besynderligt, at Fisken i Efterhøsten løber længst ind i Havnesfiord, lige til Strandklipperne, og fanges der paa 1 og 2 Havnes Dyb; dog meest om Natten, naar det er mørkt; thi om Dagen er den ikke saa dristig; men tager Flugten, naar den kun seer Skyggen af Baaden. Paa Alptenæs, Seltsigmenæs, og i Skeriefjorden der imellem, ligeledes i Reykevigt, paa Kysten hen til Vidø, paa Langarnæs og Engø drives Fiskeriet heele Aaret igieennem med smaa Baade. I den bedste Fiskertiid bruges ogsaa Fjermandsfar og Særvinger; og til alle disse Steder søge ogsaa Oplands-Folkene, og de fra Nordländer, for at bruge denne Næring. Her fanges, foruden Torsk, Helleflyndre, Røkker, samt Røser eller Rødspetter og almindelige smaa Flyndre, af hvilke sidste her er en stor Mængde indenskiærs; de fanges og paa Meedekroge (S. 97. og 341.); dog giver Flyndre-Harnene paa Vidø og Reykevigt langt riggere Fangst. Videre om Sønderlandets Fiskerie kan læses i Horebøvs Tilfort. Efter Angaaende Besætningen paa de store Baade, bør her tages i Agt, at man, foruden Roerskarlene og Fjormanden, som styrer Baaden, haver 1, 2 eller 3 flere, end Baaden har Narer; de kaldes derfor Hærskipsmænd, og bruges til at afløse de andre og hjælpe til hvad der skal forrettes paa Baaden. Heraf kommer det, at man har 12 til 14 Mand paa en Feinering, eller en Baad med 10 Narer. Saadanne Overtalsmænd antages ofte af blot Medlidenshed,

hed, da de komme fra Oplandet og have ingen Mærking; de faae da ligge Lod med Formanden og Haafatteren. For Baaden tages gjerne dobbelt Lod, som kaldes af nogle Særlutr; det er Linges Lod; fordi Baadens Eiermand skaffer alle de Giffelmer, som behøves til Baaden (§. 514), og desuden saa megen Syre; som behøves til Drifkevand, medens Værtiden varer. Til Bælte eller Madding bruges adskilligt, som et Stykke af Torskens Bug, besmyurt med Blodet; Rugen af Helleflyndre, samt Draaen eller Tunngan af denne Fisk; særlig Sild, som skæres ud af Fiskens Bug, undertiden levende. Ødestiel, eller den store Musklung, som ogsaa er bekendt i Norge under samme Navn, bruges meget paa Jydnesseene, hvor den samles i størst Ebbe.

Adskillige Ting.

§. 893. Adskillige andre Poster, som ere anførte i de forrige Stykker, ville vi ikke igientage paa dette Sted, men alene henviise til dem, f. Ex. a) af Kunst- Arbeide (§. 57, 506, 285, 735 og 814.) giores alle slags paa Sønderlandet, og især oppe i Bygden. Rangaarsvalle- Syssel har nogle, som arbeide godt i Sølvs, Jærn og Messing, samt adskilligt Jisentræk, som Knapper, Døgter, Knive, Knættespinde m. v. Ved Søefanten ere overalt Vaadebaggere, og i Guldbringe- Syssel andre Sommermand, og Snedkere, af hvilke nogle have lært udenlands. b) Tiidsberegningen er her den samme, som i Kiofar- Syssel og paa andre Steder i Jøland (§. 58 til 63). Dog bruger man og Almanaker, som tilføres fra Dannemark; mange giøre endog Udtog af dem, og sælge disse oversatte til Bønderne, da de tillige indføre den gamle og brugelige Tiidsregning. c) Af Lystigheder og Tiidsfordrive bruges her nogle, som Raartspil og Brestspil (§. 71). Gliimer eller Bryden (§. 67 og 518.)

øyes af unge Fiskere ved Søekanten, naar de for Uværs Skyld ikke kunne fiske. Glæder (§. 520.) holdes i nogle af de største Stierpladse om Vinteren, dog meest i Reykevlig. At læse de gamle Historier bruges meest oppe i Landet, og paa Skalholt ove Skoles Disciplerne sig i allelags Legems-Devægsler, Stiimer, Ringbrud, at løbe om Kapp, springe over Grofter, med videre. d) Hererrie og Spøgelsler horer man ingensteds saa lidet til, som paa Sønderlandet.

Om Dyrene.

§. 894.

Angaaende de firefoddede anmærkes ifkun følgende: a) Hæ: De firefodde-
stene ere kun saa i Guldbrynge-Syffel, thi Indbyggerne reise ikke
meget, og det meeste bliver dem tilført af andre. I de andre øst-
lige Syffeler er en stor Mængde, og deriblandt nogle skønne Heste,
thi Bønderne have Høe nok til at fodre dem med. I Grindevlig
og paa Breback æde de Sol og Tharre i Stranden. Paa det første
Sted faae de ofte Sandsot af den Vinpesteen-Sand, som flyver
overalt og sætter sig i Græsset paa disse Steder; dog faae fremmes
de Heste allersnarest denne Syge, med Høste, besværsligt Landes
dræt, ondt i Tænderne m. v. At disse Dyr, i Hungers Tiid, æde
adskilligt, som ellers er modbydeligt for deres Natur, har man er-
faret baade paa Nord- og Sønder-Landet 1696, da de gaade Jord
og Tommer i Staldene, samt Haaret af hinanden, og Ørene af
de døde Heste. b) Stude og Køer ere her i stor Mængde overalt.
Studene bruges til Handling baade med uden- og indenlandiske
Folk; de gaae vilde oppe paa Fjældene om Sommeren. Køerne
æde glærne Tarre ved Søekanten, og passe paa Ebben til den Ende.

Shh hhh

c) Af

c) Af Saar frembringe Rangaarvalle og Arnæs Syffeler en stor Mængde, saa at det er ikke rart, at en Bonde har havt 1 til 200 gamle Saar. De gaae ude paa Lykke og Fromme om Vinteren, og doe derfor tidt i 100 Tall. Til Exempel paa begge Deele findes blandt andet antegnet, at der i Aaret 1526 var neppe nogen Bonde i Grimsnæs, som jo havde 300 Saar og derover; men at den paafølgende haarde Vinter tog alting bort, saa at de Bønder maatte agte sig lykkelige, som beholdte 20 til 30 Stykker. At Saarene søge Tarren, er berettet tilforn: paa Ørebacken især leve de meest af denne Vært; ligeledes i Grindeviig, hvor hvert Saar glærne faaer 2 Lam; de maafe ogsaa overflodig, saa at de ei alene føde deres 2 Lam, men give deres Eiere desuden en god Deel Mælk. Paa Rangaarvalle have Saarene finere og hvidere Uld end paa andre Steder i Landet, hvilket sædvanlig tilskrives det fine Sand fra Heflesfiæld, hvori de ligge. De trives ogsaa bæder i de store Huuser, som her ere, og i de Færborge (S. 816. c) som her ere indrettede. Det Skæfferie, hvilket Hs. Majest. Kong Frederich den Femte lod anlægge i Guldbrynge Syffel, er allerede bekiendt; og endskiont denne Indretning er siden bleven forhindret, formedelst indfaldende haarde Aringer, og paafølgende Sygdom iblant Saarene, saa er det dog vist og afgjort, at Sagen er muelig og ingenlunde kostbar. Generationerne ere blevene lykkelig opbrevene, og vi have seet af dem paa langt bortliggende Steder, fornemmelig oppe i Borgersfjorden og i Dale Syffel. Hoved Indretningen, med Huuse og andet tilhørende, blev anlagt paa Batn i Guldbrynge Syffel, hvor en stor Deel Saar kunne fodres og græsses, thi der er god Græsgang og sunde Urter. Sygdommen iblandt Saarene er opkommen paa Sønderlandet for nogle Aar siden, og har
saa

saaledes grebet om sig, at den truer med almindelig Dødelæggelse. Intet kan være skadeligere for Indbyggeme, efter deres nu værende Huusholdnings-Maade. De fleste give de fremmede Faar, som bleve indførte til Skæfferiet, Skyld for denne Sygdom; men andre derimod påstaae at kunne bevise, at den først har yttret sig langt borte fra Skæfferiet, og paa de Steder, hvor ingen af de nye Generationer var endda komne hen. Man har ogsaa eengang tilforn havt Sygdom paa dette Slags Creature; dog var samme af en anden Beskaffenhed end denne, som yttret sig med hæslig Udflæt paa heele Kroppen, hvorpaa Ulden faldt af, og Hodet overalt saaer røde Pletter. Dette Slags Uhumskhed kom ellers først til Syne i Naarene (Regione hypogastrica), samt under og omkring Numpen, og oven paa Halsen; med en for Kreaturet ulidelig Kløen og Hidfighed i Kroppen; Huuden blev overmaade tyk og løb sammen i Rynker, hvorpaa Haaret vansmægtede alt meer og meer, og døde tilsidst. Nogle saa, som bleve holdte inde i Huuse, og smurte med Naakalls-Tran, suurt Smør, og deslige Ting, komne sig igien efter meget lang Tiid. Om Vinteren og i Kulden tog dette Døde allermest Overhaand. Land-Physicus Poulsen har med megen Tiid undersøgt denne Sygdom, men ikke fundet indvortes finde noget Tegn, som kunde vise dens Oprindelse. Han er derfor falden paa den rimelige Meening, at den maae have reist sig af noget skadeligt Insect, som har sat sig neder i Huuden ved og omkring Udens Haar-Rodder; thi naar Ulden, med dens Bulbis, blev oprykket, paa det syge Kvæg, seend den faldt af, da var der ved Haarets Bulbus noget, som laae i en Ring eller Cirkel, og ligesom en Hale derpaa. Det var hvidt og gienemsigtigt, og saa lidet, at man ikke kunde see det med blotte Øine.

I Folge af denne Meening, har bemældte Land-Physicus giort beskiendte adskillige Raad, for at forsøges, men der er endnu ingen Efterretning indløben, om disse eller andre Midler have kunnet hjælpe. Naar saadanne besængte Saar bleve betids slagtede, saae Riidet godt og friskt ud; det hverken lugtede eller smagede lidet, og alle de, som spisede deraf, befunde dem vel derved. Men saasom denne Kvæghygge har hverken taget hastig afsted, ei heller været saa overmaade smitsom, saa synes det heel riimeligt, at den kunde have været dæmpet for lang Tid siden, naar alene Øvrigheden havde befaleet, og ladet noie holde over, at intet Kvæg maatte føres fra de angrebne Herreder, over visse Elve eller Fjælde, til andre Bygde. Men man gjorde her tværimod. Saar bleve endda, ligesom tilforn, uden mindste Indskrænkning, drevne fra de besængte Herreder, til de andre, for at sælges, deels til Indbyggerne selv, og deels til de Handlende, ved hvilken Leilighed de friske og anstufne ofte havde Rattleie iblandt hinanden. Saasnart Saarene vare døde i nogen Mængde i een Bygd, købte man Saar paa nye fra den nærmeste Egn, hvilke da bleve strax angrebne af Sygdommen; efterdi den havde endda ikke aldeles udraaset. En og anden Egennytighed har og endnu vildere forblindet Folk i dette Stykke, og sat til Side det almindelige Beste. Saar, som vare enten virkelig hyge, eller dog fra de besængte Steder, bleve ligesaa fuldt, som de friske, drevne til Afrets-Fjældene, hvor adskillige, endog de længst bortliggende Herreders Saar komme iblandt hverandre; ja de, som vilde paastaae at dette burde forbydes, bleve anseete for partiske og misundelige. d) Børne har man nogle Gange seet paa Sønderlandet: de ere komne did med Hav-Jisen, fra Grønland (S. 853). e) Sælhundene af den almindeligste Art, eller Land-Sælene, ere her

her paa mange Steder. De skydes med Flint, indenskiærs ved Røkkeviig, Bido og der imellem. f) Hunde, Ræve, Rætte, Muis, ere her almindelige. 3 Mæret 1731 kom Pest imellem Hunde og Ræve i Island: de bleve sandselose, dog ikke galne, og døde inden kort Tiid. Rævene komme hjem til Gaardene, og lode sig der slaae ihjel.

§. 895.

Niser, andre Delphiner og større Hvalfiske sees tit og ofte uden for Kysterne, som de meest nærme sig til i Guldbrynge-Epiffel. En ung Grønlandsk Hvalfisk drev op paa Seltiornenes Aar 1763. Kroppens Længde, fra Smuden til Bugten i Sporden, var 56 Fod, og Tykkelsen, hvor den var størst, 41 Fod og 8 Tommer. Det nederste eller længste Kindbeen 13 Fod. Hornpladerne eller Bar-
derne i Halsen, (som ellers kaldes Fiskebeen), vare i alt paa den eene Side 368, af hvilke 41 vare de største, hornagtige, og tiemdeligt børstede. Madpiiben, fra Halsen til Mavens, var 8 Fod og 7 Tommer viid. Indvoldenes Længde, fra Mavens nederste Abning til Endetarmens Udgang, var 354 Fod; men Viidhes den 6 Tommer. Nandepiiben til Lungen, hvor den begynder at deele, 3 Fod, og Viidheden, tæt under Lufdækket, 12 Tommer. Rygledene vare i alt 63, og de 14 bageste, samt de 3 øverste Leed i Halsen, havde ingen Huller (Processus dorsalis). Dientofien (Fovea oculi) var 10 Tom. lang og 7½ Tom. breed.

§. 896.

De Sugle, som ere opregnede i det første Stykke (§. 84-89.), samt deres ganske Beskrivelse og naturlige Historie, høre ogsaa til disse Steder, og især til Guldbrynge-Epiffel. Vi ville dog nævne disse følgende:

Hh hh 3

A) 2Der

A) *Æderfuglen* (§. 669.) lægger Æg i stor Mængde paa *Bædoe*, endog tæt ved *Huufene*. Vi have tidt seet den flotte sine spæde Unger ned til Havet, og med det samme, at det er en *Seil*, som *Debes* (p. 127.) og mange andre efter ham berette, at *Æderfuglen* flyver bort af *Reedet* med *Ungerne*; thi de blive ikke engang flyvesærdige forend efter 1 Aar.

B) *De trende Vildgaas-Arter* (§. 667, 817 ic.) findes her, meest om *Foraaret*, og skydes med *Stiinte* til *Spilse*; hvorimod de i gamle Dage bleve fangede med *Garn*, med meget stor *Fordeel*, baade i *Guldbrynges* og *Rangaarvalle-Syffeler*, dog især i *Stiorts* hlid og *Landoerne*: man kunde, naar *Sangsten* gik lykkelig, saae paa denne Maade 1, 2 til 300 Stykker ad Gangen.

C) *Pelecanerne*. De fire Arter findes her, hvoraf de trens de Slags *Skarfer* treffes meest i *Guldbrynges-Syffel*; den største, *Dilaskarfe*, som ellers kaldes *Svidlaaring*, er almindelig indens *Stiørs*, paa *Klipperne* ved *Bidoe*. *Linnaeus* har den ikke, men den findes hos *Strøm* (*Sødm. Bestr. i D. p. 250.*). De gamle *Fugle* ere sorte overalt, undtagen den hvide *Plet* paa *Laaet*. *Sula*, eller den fjerde *Pelecan* (§. 670. b), er her allesteds almindelig. Den yngler paa een af *Vestmannoerne* (§. 832.), og der for seer man her alle de *Forandringer* i *Farverne*, efter *Alderen*, som have forbildet *Skriften*. Vi viide af ingen *Forstiael* i *Farverne* paa *Han* og *Hun*, ikke heller af flere end een Art at sige.


D) *Viærgfugle*, saavel de 4 Arter af *Svartfugl* (§. 673.), som *Teisten* og *Lunden* (§. 671 og 672.), samt de fleste i det fjerde Stykke opregnede *Bandsfugle*, sees paa *Sønderlandet*. *Vestmannoe*, *Krisesviigs-Viærg*, *Holms-Viærg*, og *Skierene* uden for *Reykenæs* ere *Svartfuglens* fornemste *Tilholdsteder*. *Teisten* og *Lunden*

TAB XXXV.

pag.



Alca, Havtirdill.



Linden opholde sig ogsaa paa Bidoe. Siltingen og Rytsen, som
og regnes af nogle blandt Viærgfuglene, fordi de altid boe i stejle
Strandklipper, findes paa Vestmannoe og Reykenæs-Øerne (§. 744).
Maaden at fange Svartfuglen i Kriseviig og paa Vestmannoe, er
den samme som ved Fuglebiærget (§. 673) og Drangoe (§. 742).

E) Geirfuglen eller den Alca, som almindelig kaldes *Peng-
vin* (see Fn. Sv. 119.), er Worms Magellanske Gaas (see Mus.
Worm.). *L. Debes* (Fær. Ref. pag. 130.) beskriver den ogsaa.
Den er rar i Island, og yngler ingensteds uden paa tvende lave
Øier i Havet uden for Sønderlandet; det ene horer til Vest-
mannoerne; det andet, som er det fornemste, ligger uden for Reyke-
næs (§. 831.), hvorfra vi og have faaet baade Fuglen selv, og dens
Æg, at see, ved det nogle Aaade fra Sønder-Næssene vovede sig
derud, i de Aar, vi vare paa Bidoe. Den er en af de besynderlig-
ste Fugle, thi endskjønt den er stor, som en Gaas, ere dog dens Vin-
ger ikkun ganske smaa, og neppe saa store som Teistens. Vi have
derfor kaldet den Alca alis minimis, hvilket noksom adskiller dens
ne Art fra alle andre; det Linnæiske Navn Impennis kan des-
imod ikke, endskjønt det er kortere, passe sig paa den, thi den har
fuldkomne Penne og Fædre, saavel paa Vingerne, som over heele
Kroppen. Men Vingerne tiene den kun til at roe med under Ban-
det. Den kan ellers ikkun med Besværighed staae over Ende eller
gaae. Adskillige Geirfugle have Næbe og Æg tilfælles; egentlig
at tale, bygge de dog intet Næbe, men Æggene ligge i deres Skarn
tæt sammen paa Klipperne. De ere hvide, grønagtige, særdeles
smukt tegnede, med brune og sorte Striiber, Pletter og fine Pri-
kker; og disse Tegninger forestille Charter, Landskabe og adskillige
Figurer, som Indbildningen kan hitte paa. Fuglen selv er feed

og mor i Riødet, og giver en god Spiise. Sæstredill (Syst. N. Ref. 63 - 1.) sees her iblandt, men er dog rar og sægger her ingensteds Eg, saavidt vi vide (see Søndm. Beskr. p. 256.).

F) Om Hægren eller Heiren (Fn. Sv. 123.) er maeldt i det tredie Stykke (§. 527). Den sees ofter sønder paa end ved Bester-Jøfelen, og Fiskerne siqe, at det betyder godt Aar, det er, god Fangst i Soen, naar de see denne Fugl, som gierne kommer i Stokkes Fald til Sønderlandet.

G) Tadrefkan findes ingen andensteds i Jsland. Den er en Numenius, som i mange Ting kommer overeens med Fn. Sv. 144, men viiger dog derfra. *Linnei* Beskrivelse mangler og nogle betydelige Kiendemerker, som vores Fugl haver. Dens Størrelse er som en Dues, men Skabningen kommer Spoven nærmest: Hoved, Hals og Bryst ere gultrødagtige; ligeledes Ryggen, samt Vingernes Dækfjædre og Bugen foran, alene at de have ogsaa sorte firkantede Pletter. Rhachis paa Korfjædrene er hvid; og de første 2 ganske hvide paa den inderste Siide, men den 3die hvidpletlet paa begge Siider. Alle de andre have i Midten en hvid Tværlinie, som er breed og kiendelig, og alle Dækfjædrene, de 2 første undtagne, have hvide Spidse. Derimod er Roden af dem, samt Korfjædrenes Spidse, og Vingernes forreste Rand, sort afsefarvet. Fuglens Vinger neden under paa Stidterne, det nederste af Bugen og Stjærten ere hvide. Urrhopygium er hvidt, og Styrefjædrene sorte, men hvide ved Enden eller ovenil. Stjærten synes derfor sortagtig i Midten, og dens yderste Spidse graahvidagtige. Nebbet er 3 Tommer og 2 Linier langt; den halve Deel rødgul, fra Roden af, og Resten sort, samt Spidsen lidet tyk igien, men Under-Nebbet lidet kortere end det øverste. Tungen



Scolopax lardreka.



Tungen er meget smal og spids, med smaa Tænder neder ved Svælg-
get. Næseborrene ere kort fra Næbbets Rod, og aabne, saa at
man kan see igjennem dem begge paa eengang. De halv-nøgne
Laar, og Beenene, ere meget lange; dog disse lidet kortere, og, til-
lige med Fodderne, blyefarvede. Tærne ere 4, og adskilte: den
i Midten er 1 Tom. 8 Lin. lang, hvortilmod Læggen er 2 Tom. 8 Lin.
og Laaret 3 Tom. 5 Lin. Vi have beskrevet Tadrefen saa noie,
fordi nogle i Danmark, som have seet den aftegnet, have ei vil-
det kjende sig ved den. Den kommer om Foraaret til Aarnæs- og
Rangaarvalle-Syffeler, og opholder sig meest paa Myrer eller sug-
tige Steder, hvor den bygger Rede og lægger 4 Æg.


H) Raudbrysting; *Tringa, pectore alarumque basi rufis*,
er lidet større end en Skov-Trost (*Turdus viscivorus*). Dens
sorte Næb er lidet nedboiet, og længere end Tærnernes. Næseborre-
ne ere meget aabne, og, ligesom Tadrefens, giennemsigtige. De
halve Laar ere bare, og Beenene sorte; de 3 Fortæer ere adskilte,
og Bagtaalen fri, men meget liden. Stiarten er ganske kort og
liige, med sorte og graa Tverstriber oven paa, men neden under,
ligesom Bingerne, hvid, med nogle sorte Prikker. I øvrigt er
Tuglen oven paa Bingerne askefarvet og sortspraglet; især ere Hal-
sen og Ryggen oven paa tegnede med aflange rodagtige, sorte og
askefarvede Striiber. Rødbrystingen kommer om Foraaret, og
opholder sig meest paa Strandbredden; dog gaaer den ogsaa om
Sommeren op i det Grønne. Den er feed, og Kiødet meget vel-
smagende, hvorfor den skydes og sælges til Fremmede paa Sou-
derlandet.

I) *Lakiadudra* er endnu een, for Fremmede ubekjendt, *Trin-*
ga, tota supra fusca, maculis albis. Den er her meget rar at


see, fordi den opholder sig meest ved Bække, i Myrer og paa fugtige Steder, i Grøfter og Huuler, og nærer sig af smaa Insecter og Maddiker. Man meener, den bliver her om Vinteren. Vi have eengang seet Levningerne af denne Fugl, som kommer noget overeens med Fn. Sv. 151. Størrelsen er som Hørse-Giogens (§. 677. b), eller lidet forere. Næbbet er sort, smalt og lige. Læerne lidet længere end Næbbet, blyfarvede, med Lapper (lobi) ved, og oventil ikke adskilte. Fuglen er ovenpaa brunrødagtig, med hvide og sorte aflange Striiber, og under Bugen og Kroppen hvidgraa, med affarvede mørkagtige Streeger.

K) Sef-Vind. Vi anfore til Slutning denne i Jøland meget rare Fugl, hvis Tegning og Beskrivelse er kommen nogle Fuglekiendere nye og fremmed for. Endskiont den kaldes And, af Jyds Kyggerne, og regnes hen til Duf-Venderne, eller Mergos, synes os at den kommer ligesaa nær til Vorne-Stægten; endskiont vi tilforn have kaldet den Anas live Colymbus, crista gemina flava, pectore ferrugineo. Størrelsen er som Teistens. Næbbet er spidst, sort, og lidet blyfarvet, ligesom Veenene. De 3de Fortærer have breede og tykke Lapper, med smaa Ringe tværs over. Bagtaaen er liden, med en breed Lapp, uden Kloe. Farven paa Halsen er vel sortere end paa Ryggen, men vi erindre ikke at den er blaasig. Halsen foran er guulrød langt op, og denne Farve er ogsaa synlig omkring Vinene; Laarene ere ogsaa rødagtige, og Næseborrene giennemsligtige. I øvrigt kommer denne Fugl, af hvilken vi kun have faaet eet eneste udstoppet Exemplar, meget overeens med Fn. Sv. 123., fornemmelig Hannen. Den sees i særste Soer i Guldbrynge-Skuffel, og staaer opreist, thi Veenene ere langt bag ud, og Stiærten meget kort og liden. Den bygger sit Næde iblandt det

høie



Raja Indabickia foemina cum ovario





Raja Indabickia Mas cum penis testiculis etc.

hoie Størgræs (Carices), paa Vandet, og lægger 2 til 4 Æg. De Strandfugle, som før ere beskrevne (§. 674, 76.), gaaes her forbi, endskjont de allesammen træffes paa disse sydlige Kyster; ligesledes de fleste Sommer- og Land-Fugle (§. 677, 78.), som Sønderlandet haver tilsælles med de andre Fierdinger, da her ikke sandsynligvis der noget nyt at mælde om dem.

§. 897.

De Fiske, som ere nævnte i Vest-Jökulens Beskrivelse, fangtes og paa Sønderlandet; endskjont nogle af dem ere rare. Vi ville først tale om nogle af de brykfinne, som *Linnaeus* nu i hans sidste Udgave af Syst. Nat. kalder Amphibia; dernæst de andre Fiske, og endelig de ubekjendte.

A) Skata, Raja (vulgaris & major) (§. 528. 16), fanges her meget med Anget paa leeragtig Bund. Hannen er kjendelig af de 2de ved Halsen nedhængende Aflings-Lemmer. Hunnen faaer Æg, og foder sine Unger levende om Efterhøsten.

B) Tindabickia (loc. c. 17) er den i Danmark bekjendte Røffe (Raja clavata). Dens udvortes Beskrivelse findes hos *Artedum* (Gen. 71. Syn. 99. Sp. 103.) og mange flere. Vi ville alene tale om dens mindre bekjendte indvortes Skabning, fornemmelig om Forstaaelsen paa begge Kion. Paa Hannen sees 2 Aflings-Lemmer, ligesom paa den store Røffe, og desuden har den 2de andre Appendices, hvilke ere Svømme-Reedskaber. Den har kun een Tarm, som er liige, undtaget at den gaaer under Mavens Aabning (Pyloro) i en Bugt, og kan tilsluttes med 7 Følge eller Dørre. De 2de Aflings-Lemmer, hvert paa sin Side af Halsen, have yderst et snegleformet Been, hvortil der gaaer en Processus vermicularis af Been, og der oven for paa begge Sider ved Anum ligge

Testiculi bilobi, meget store. Ductus seminalis gaar fra dem i en bryffagtig Furre; men endskjønt Hannen har saadan en Vædse i Testiculis, som ligner Sæd, haver den dog tillige Mælk, som andre Hansfiske. Hunnen har nogle meget store, men kun saa Æg. De Vaand, der holde Moderen op, ere meget tykke og stærke. Den fodrer ogsaa om Efterhøsten. *Peturs-Buddur* og *Peters Skib* kaldes de bekjendte Ova Rajæ eller Pulvinar Marinum. Vi have gjort os megen Umage for at finde dem i disse Dyr, for at viide, baade om det var sandt, at de hørde dem til, og tillige, hvor de da laae i dem. Vi maatte bestille mange, inden vi kunde finde dem; men vi have og fundet dem, i nogle kun halvvoorne, og i andre fuldkomne. De ere to, og ligge i Underlivet, eet paa hver Siide ved Rygleedene, i det forbemældte Ligamento suspensorio uteri, hvorfra de siden komme ned til Moderen, og fodes; og dette er, i disse Dyrs Skabning, ret noget foruidentligt. De synes ikke at være Æg, thi Dyret har Æggene, foruden dem, i den egentlige Æggestof. Dog staae vi endnu i Tvil herom; meest fordi vi have ladet faaage nogle fuldvoorne Petersbuddur, da vi saae at de indeholdte en Materie, som fuldkommelig lignede en Æggeblomme, baade i Smag og Ansæelse, aleene at Smagen var noget tranet, som den pleier at være ved Haarnes Æg.

C) *Ryner*, almindelig kaldet *Bein-Haakall*, for at skille den fra den rette Haakall, fordi dens Been ere ikke saa boietge eller bryffagtige. Den er *Squalus (maximus) Artedi* (Gen. 44. Sp. 14. Synon. 98.), og *Lamia Auctorum*. Uden al Tvil er den ogsaa de Norffes Brygde, hvilken Hr. Strøm beskriver og ytttrer samme Tanker om (Sødm. Beskr. i D. p. 273.). Den søges ikke i Jesland, uden paa Sønderlandet, især i Havnesfiord, Skeries

Ekeriefjord, og indsejlers ved Keykeilig, hvor den løber lige op til Strandbredden, og følger efter Baadene, uden at gjøre dem Skade. Naar Bydbyggerne ville fange den, gaae de ud 9 til 10 Mand paa en Mattæring, og skyde en Harpun i den, saa dybt som de kunne, havende en stærk Line fastet til Jærnet. Jiffen søger da strax til Bunden, løber frem og tilbage, og flæber Baaden efter sig, indtil den bliver træt, da man begynder at roe ind til Landet; til Slutning trækker man den op, og giver den sit Bane-Saar. Tidt river den sig selv løs, og tidt, naar den tager Beien lige ud til Havet, og Været ikke er gunstigt, maane man kappe Tøvet og stille sig af med den; ellers er denne Fangst særdeles fordelagtig, for Leverens og den store Mængde Traus Skyld. Den almindeligste Haakall gaaer vel til Sonderlandet, men fanges der ikke, er og ikke heller i synderlig Mængde.

D) *Haafur*, *Squalus pinna ani nulla*, corpore subrotundo (§. 528. 18), er *Artedi* Gen. 44. Sp. 3. Syn. 94., og fanges undertiiden i stor Mængde paa Sonderlandet. *Artedus* har beskrevet Hannen. Hunnen have vi tidt saget og anmærket eet og andet, angaaende dens Yngel. Vagina uteri er kort, men meget stor og udviidelig. Moderen er dobbelt, liggende paa begge Sider af Endetarmen, og de 2de uteri oval-aflange og ganske adskilte, uden hvor de støde til Skeeden. En small Gang gaaer fra Moderens Bund op til ovarium, som er temmelig stort og ligger imellem Brystfinnerne, uordentlig rundagtigt, indeholdende mangfoldige Æg, hvoraf de fleste ere smaa, som en Vært, eller mindre, nogle som en Kastanie, og eet, meest to, som et Høns-Æg. Fra Æggestoffene gaae tvende Seener til Endetarmen og Moderens nederste Aabning. Vi have fundet 3 Æg paa eengang i den eenen Moder,

og 4 i den anden. De unge Haaer klæffes ud af Eggene i Moderens Liv, da Egget strax trækker sig sammen eller tilluffes igien omkring Navlesträngen: det beholder Moderkagen, og hvides op med en hvidagtig tyk Materie, som meget ligner Kalvedans, og er derhos olisagtig. Herved næres da de unge Fiske, som faa mangfoldige andre Skabninger i Dyre-Riget, igiennem Navlesträngen; og naar de ere store nok, fødes de, først af den eene, siden af den anden Moder, og svømme siden omkring Moderen, med Egget endnu hæftet til dem ved Navlesträngen. Det forunderligste er, som alle Fiskere eenstemmig forsikre, at disse spæde Fiske krybe tidt ind i Moderen igien, enten for at hvile og vederqværge dem, eller for at undgaae en paakommende Fare; dog have vi altid tvilet om dette, indtil vi finge denne Fisk og dens indvortes Skabning af see. Fiskerne sige ydermere, at naar de trække en Hun op, og slaae den thiel, krybe Ungerne ud i Baaden; hvilket er naturligt: men at de ogsaa krybe ind i den døde Moder, og tildeels blive der med alle, deels komme strax ud igien og doe, derom tvile vi noget, have heller ikke endnu tilstrækkelig Visshed om denne Veretning. Jo meer den lille Haa voxer til, jo meer svinder Egget ind, til det endelig skilles fra, og Navlesträngen gaaer i Stykker; Fisken har da alt nogen Tid i Forveien begyndt at tage Foden med Munden, og er nu bleven saa voksen og stærk, at den kan forsvare sig; hvarfor den ogsaa ganske forlader Moderen, hvis Tilflugtssted ikke kan tiene den herester, ligesom den ikke heller trænger dertil. At denne Haa-Art føder sine Unger i Junii-Maaned, derom bleve vi fornemmelig forvissede i Aaret 1756, da nogle saadanne tildeels levende Exemplarer bleve bragte til os fra den 10 til 18 Junii. Intet er meer at formode, end at alle de andre brystfinnede Fiske have no-

get

det nær sammeslags besynderlige Natur og Huusholdning i deres Vngel.

E) Saamær, *Squalus glaucus* Auctorum (see *Arted. loc. cit.* No. 13. og tilføi §. 528. 21. 687. b), sees og fanges undertiden paa Sønderlandet.

F) Geirnytt kaldes Saamuusen af nogle paa Sønderlandet. Men om det Navn Geirneft ogsaa horer den til, staae vi i Tvil om, og tilegne det ligesaa gierne en anden Fisk. Geirnytt eller Haamuus, hvilket Navn er det naturligste; er ofte bleven fanget sønder paa, dog ikke i disse Tiider. Den bliver ellers nu meer og meer bekjendt, skjønt den har været nye for *Linnaeus*, hvorom vi have maeldet i det 4de Stykke (§. 528. og 687. c).

§. 898.

Om andre Fiske er her ikkun følgende at mælde: A) Nall, Andre Fiske. *Muræna unicolor*, Auctorum Angvillæ (§. 685. a); er mange steds paa Sønderlandet, dog meest ved det varme Bad paa Lauz garnæs (§. 870.); men den spises hverken her, i Reykevåg, hvor den ogsaa falder, eller paa andre Steder.

B) Steinbitr, *Anarrhicha* (§. 683.), fisses her kunielden og i liden Mængde.

C) Thorstr, *Gadus (maximus)* (§. 528. 1), er overalt omkring Landet den almindeligste Fisk; men dette er besynderligt ved dens Huusholdning paa denne, ligesom paa Østerlandets (§. 818. a) sydlige Kyst, at den gaaer Strandbredden og Brændingen saa nær, at den fortumles og kastes op paa Landet, hvor den sædvanligst findes død, men dog iblandt levende. Ved Desældene og Desands findes den oftest og i den største Mængde, saa og paa Ørebæken, hvor man undertiden kan samle nogle 100 ad Gangen; og

at

af dette ligeledes har været almindeligt i forrige Tider; kan sluttes af Landstoven (Jons-Bog Landl. B. Cap. 7. og Rets-B. Cap. 9.); endskjønt disse Steder mælde om flere Slags Fiske og Hav-Dyr, end Torsken. Dette Slags Torskfangst har endog givet Anledning til Tvistigheder imellem Leilendingerne og deres Jorddrotter, fordi de første have, efter Retsbalkens 2 Cap., tilegnet sig alt hvad saaledes driver op med hver Flod, hvis Tallet overgaaer 5 Strykker ad Gangen. Men naar man ser Lovens Meening nøie efter, vil denne Tvistighed ikke falde ud til Jorddrotternes Fordeel; thi forebemaaltes Sted i Loven taler ikke om Leilendinge, men kun om dem, der have tilkøbt sig af Jorddrotten Rettigheder til Brag paa hans Grund. Nu kan vel ingen nægte, at Jorddrotten er Eier af Græs, Thare, Fugle, Eg og Fiske, eller andre Herligheder, som høre til hans Gaard og Grund; men naar han engang haver forpagtet Gaarden bort, saa følger jo dermed alle de omtalte og andre Herligheder, som Loven nævngiver, saavidt sligt ikke undrages ved særdeles Afstale. Torsken driver meest op om Vinteren, efter Junii, da den nærmer sig og forfølger Silden lige til Vandet, ved den Tild, som Værtiden almindeligst begynder.

D) Skeria-Steinbitur (§ 680. c) er i Guldbringe-Effsel meget almindelig, endog i Fierren, hver Storstroms-Ebbe.

E) Krognkellsir (§. 681.) falde i Guldbringe-Effsel, især paa Væststed og Bldoe, paa hvilken sidste Sted de og fanges i Garn; dog drives denne Fangst ikke nær saa meget som paa Vesterlandet. Graaslippen, eller Hunnen, hæfter sin Navnboe eller den heie Klynge af Ravn, som den gyder, til store faste Steene i Stranden, undertiden saa høit op, at man med største Springs-Ebbe kan, uden at vade, tage den med Hænderne. Dette skeer i Junii

i Junli-Maaned, da Hrognkælsene ellers komme i Martii og tage bort i Julii-Maaned, før eller sidstiger, ligesom Næret er til. Indbyggjerne paa Vesterlandet, som især give Agt paa disse og andre Dyrs Hunshestning; sige i Almindelighed, at Rodmagen, eller Hannen, blæser paa Nænnen jævnt og sagte, for at vedervæge den; omtrent ligesom Fuglene ruge deres Æg. Vi have dog ikke faaet Bished om dette, før end 1755, da een af os traf paa saadan en Nænnboe, og Hannen derhos. Fisken laae stille og ligesom med Horisonten i Bandet, vendende med Hovedet til Nænnen, dog saa, at Munden var i Enne langt fra den: Munden bevægedes jævnt, dog ikkun meget sagte, med at aabnes og sluttet til igien, ligesom Fisken vilde gyde eller spytte noget paa Nænnen; dog kunde det ikke, skönt det var nær ved, og ganske stille. Solfins Bøier, stietes eller sees i Bandet, at noget kom ud af Munden. Denne Rodmagens Adfærd kaldes at pua, det er; at puste meget sagte, og det er slutteligt, at nogetslags nærende Lust eller Bædse maae meddeeles Nænnen derved. Man har ikke mærket, at Hunden kommer hertil. Men angaaende de unge Fiskes Udskæffelse, have vi af en troeværdig agtsom Mand paa Vesterlandet faaet den Efterretning, at han sidst i Julii og først i Augusti-Maaned har fundet ude i Havet, i stille Bøier, noget særst oprebet Tang der vendt for Strømmen; og ved det ham syntes, at han saae nogle smaa Insecter bevæge sig deromkring, sk. han lyst at vilde hvad det var. Han fandt da, at Thanget neden under var fuldt af unge Hrognkæls, som holdte dem fast paa Thanget med deres runde Brystskjold eller Finne (Cyclopterus), og det saag tæt, at de ei havde Rum nok, og fulde derfor af og svømmede omkring, for at søge Leilighed til at sætte dem fast igien. Skabningen var falden

men og ganske fiendelig, endskjont disse Hrognkølske-Unger ikke vare meere end 2, 4 til 6 Linier lange, og enhver af dem havde endnu sine Æg hængende ved Navlesträngen. Det besynderligste var, at hver Fiske havde 3, nogle 2, og ganske faa kun 1 Æg ved sig. Men forbemædte Mand saae ikke efter, hvorledes disse Æg hængte sammen; rimeligst at de, som vare flere, end eet, have hængt ved det Æg, som var Fiskens eget, og at de andre Fiske enten have været borte, eller Æggene ere komne til Skade og bleve uduelige. Disse tvende Opdagelser med Hrognkølsene, kunne maaskee tjene til at oplyse flere af de kolde Fiskes Historie, i Hensigt til Ungelen og den første Fremvæxt ved Ægget.

F) *Styris Fiskur*, *Echeneis cauda bifurca* (see *Catesb.* Carol. fol. 26). Den er *Remora Auctorum*; bekjendt i andre Lande, især iblandt de Lærde. Man haver og Navnet i Jsland, endskjont man ikke veed; om det er gammelt, men i disse Lænder er Fisken ganske ubekjendt sammesteds. Een af de Jslandske Arbejdere-Skrivere anfører, at der i Aaret 1635 blev fanget paa Engøe en Haamar, som havde 4 Fiske hængende paa sig. Disse havde en Skaal eller Skjold foran (og oven) paa Hovedet, hvormed de havde hæftet dem til Haamaren; og da Fiskerne, med stor Meie, havde revet dem løs, løbe de udvendig paa Baaden, og søgte at hæfte dem derpaa, men de døde strax, da de vare komne i Land. Man veed og om Roerfisken, at den glærne hænger paa de store Haaer, og ligeledes, at ingen anden Art har Skaal eller Skjold paa Hovedet til at hænge fast med. Vi vilde derfor ikke om, at de ved Engøe fangede Fiske have været af denne Art; thi omendskjont *Catesby* og *Linnaeus* (see *Syst. N. Ref.*) indskrænke deres Opholdessted ikkun til Indierne og de hvide Lande, saa vidner dog *Hill*
i sin

i sin naturlige Historie (Part. 4. Cl. I.), at de ogsaa findes paa nogle Steder i Europa.

G) Geirnesfur, paa Dansk Hornsiff, Elox rostro utraque maxilla subulato, er Acus og Bellone Auctorum (see *Artedi Gen. Pisc.* 10-2. og *Linnaei Syst. Nat.* 154-7.). Siden vi nu nyelig have faaet Bished om, at denne i Dannemark saa bekjendte Siff findes ogsaa i Zeland, saa give vi den igien det gamle Norske Navn, Geirnesfur, som vi før have troet at tilhøre Haamuusen, fordi det Navn Geirnyt, eller Geirnet, kunde let være opkommet af Geirnesf (§. 687. c). Navnet Geirnesfur tillægges en Siff i de beste Haandskrifter af Edda, og om denne mælde vore Aarsbøger, at den er bleven fanger og spist i Zeland. Vi meene da, at dette er ingen anden Siff, end Hornsiffen: a) fordi denne Art findes virkelig sønder paa; thi i Aaret 1701, da man ei fik Vorsk, men derimod allehaande andre Arter af Siff, som Langer, Steensbider og Haafsiffe, i større Mængde end sædvanlig, fangede man her saa mange Hornsiffe, at 10 eller 12 Stykker kunde komme paa hver Siffers Lod; ligesom og en Hornsiff blev funden ved Bogestæpe (§. 892.) i Aaret 1764. b) Fordi Geirnesfur beskrives lang og smal, firkantet, og lignende en Førelle i Riødet. c) Fordi Navnet selv giver tilkiende Hornsiffens besynderlige Skabning, i det lange og spidsø Næb; thi Geir betyder en Art af smalle Spyde. d) Endelig fordi Hornsiffen kaldes paa Engelsk *Garfish*, og mangfoldige gamle Ord, som betegnes med Geir og Ger i det gamle Danske Sprog, heede Gar i det Engelske. Siffen er ellers beskrevet, og dens Beskrivelse udførlig i Fn. Sv. 305. I Zeland er den nuomfunder rar.

H) Zellesfyndre har man fundet tilforn overmaade store, men derhos mindre, i Udlobet af Olves eller Hvid-Aaen.

I) Rarsen have vi anført tilforn (§. 528. 13), endskönt vi og andre have staaet i Tvil, hvilken den var hos andre Skribenter (see *Sorreb.* p. 221.). Men siden vi nu have staaet en Tegning af den, tænke vi at den vist nok bliver *Sparus totus rubens* (*Ar. tedi* Gen. Pisc. 28-3. Synon. 5.), eller *Erythrinus* og *Rubellio* Auctorum. Tegningen viger vel noget fra, paa Sporden, Brystfinnerne og viderne, men den er gjort efter et udstoppet Exemplar, som var kommet til Skade. Under Aaret 1654 berettes om dette Slags Fiske, at Brændingen paa Drebaeken fæstede en stor Mængde af dem op paa Strandbredden. Det varede kun een Dag, men 1 eller 2 Karle samlede dog 1500 Stykker i en kort Tid. Det er altsaa rimeligst, at Fisken har søgt der smaa Sild, eller Hav-Insecter.

§. 899.

Insecter.

Al Land-Insecter have vi seet paa Gønderlandet alle de Arter, som ere opregnede i det 5te Stykke (§. 746.), undtagne Myt, Zverlunsen og Lodpurken. Det er og rimeligst, at de fleeste Arter, som findes paa Vestfiordene, maa ogsaa være sønder paa, hvor Luften er mildere (§. 688). Men vi havde ikke, da vi opholdte os her, Leilighed til at give Ngt paa, eller samle noget, af dette Slags; thi vi maatte anvende Sommeren til at reise, og være de fleste Gange paa andre Steder, paa denne Tid af Aaret. Endel af de vingeløse, og især Hav-Insecterne, have vi fundet sønder paa, og ville især nævne disse efterfølgende.

A) Margfærla, *Cancer Araneus* (§. 688. VI. E. a), kan faaes i Tharen ved største Spring, medens Ebben staaer paa: den staaer






Fig. 1. 2. *Cancer* Diogenes, Hækong's Kratte. Fig. 3. 4. 5. 6. *Pholax* Bergthue. Fig. 7. *Alga*, Smjörflingur. Fig. 8. *Cardia*, Kustskel. Fig. 9. *Brudur* Kall. Fig. 10. *Scop*, Skel. Fig. 11. *Patella*, Olaboga Skel. Fig. 12. *Kræklingur*. Fig. 13. *Haf*=*Brudur* Kall.







flaæer under Tharen, som et Lomme-Uhr, men grovere og hotere. Vi spiisede disse Insecter nogle Gange paa Bedoe, og de smagede ret vel. Den store hvide Strandmaave fanger dem allermeest.

B) Konga-Krabbe (loc. cit. E. b), Cancer Diogenes, er her meget almindelig i Fjæren, og opholder sig i alleslags Snekker. Det er mærkværdigt, som den eene af os traf paa i April-Maaned 1756, da han gik ned til Stranden, for at søge Insecter, at en liden Bugt i samme syntes ganske rød, som Blod, og da han traadte nær til, og tog noget af Vandet i Haanden, var det tykt, og ligesom Blod, der er smaaalevret, dog meget lysagtigere. Han saae noiere efter, og fandt da at Hav-Vandet paa dette Sted var fuldt af et Slags levende Dyr, der lignede Polyper eller Krabber; og endelig opdagede han, at det var den Cancer Macrourus, chela dextra longiore, som før er beskreven, og pleier at boe i Sneglehuuse i Havet. Dette Kræe var saare blødt og heegt; man mærkede endnu ingen Skæl derpaa, og den ganske Længde var kun 2 til 3 Linier.

C) Sumar nævnes i det gamle Nordiske Sprog, ja endog i den Islandske Edda; dog have vi aldrig fundet den, eller vidst af den at sige her i Landet, forend 1764, da Land-Physicus Poulsen kom over een i Grindeviig. Den er bekjendt nok i Norden, og er Gammarus Auctorum og En. Sv. 1248. Cancer Macrourus, rostro lateribus dentato basi supra dente duplici. Paa Dansk og Svensk kaldes den Summer.

D) Marthvare, paa Dansk Rege (loc. cit. E. c). Dette Islandske Navn er det eneste, som den gives paa Vestfiordene; den ældste Edda nævner og Marthvara, men dette Navn gives i nogle af de nyere Skrifter en i Island ubekjendt Tjiff. Reger sin-

des paa Sønderlandet, meest i Guldbringe-Eyssel, dog ikke nær ved Stranden. Vi fangede dem af og til i Slynde-Garn, men de spijses her ikke.

E) Marflo (loc. cit. E. d) er her allevegne almindelig.

F) Østabiørn, eller Gistebiørnen (loc. cit. E. e), fanges her tidt, men er dog ikke i saa stor Mængde, som vester paa.

G) *Oniscus fuscus*, macula candida in thorace (loc. cit. E. f), opholder sig i Stranden paa Vedoe. De andre sorte, flekkede eller brogede Arter eller Forandringer have vi ikke fundet her.

H) Kampalampe er et besynderligt og rart Insect, som vi eengang have seet paa Sønderlandet; den ene af os, nemlig Eggeri Olaffen, traf det og igien Aar 1763 eetsteds i Vestfiordene. Dets Islandske Navn tillægges ogsaa Regen, i Guldbringe-Eyssel, og er opkommen deraf, at dets Hoved, eller Appendices capitis, holdes for at lyse i Mørket; thi Kampur betyder Knæbesbart. Insectet, som bliver halvanden, til to Tommer langt, og en trediedeel Tomme tykt, eller bredt, ligner meest Krabbe-Slægten; efter Beenenes Tall, som i alt ere 20, skulde det blive een af *Linnaei Oniscis*. Efter min Meening kan det kaldes *Cancer Macrourus* (vel *Oniscus*) thorace aculeato, pedum paribus 10, cauda foliacea. Følgende er det mærkværdigste af dets Beskrivelse: Color e fusco subrubens. Thorax non articulatus nec distinctus a capite, parum carinatus, spinis tribus robustis antrorsum spectantibus, quarta ceu rostro, supra & inter oculos maxima, prominente. Antennæ duæ setaceæ, longitudine tertiæ partis corporis, ad quarum latera palpi duo lingulati ciliatique & supra hos totidem lobi breviores, itidem ciliati. Thoracis lorica valde firma est, duabus undulis inter spinas transcunt-

euntibus, nota. Abdomen cylindraceum, articulis 5, parum carinatum, & totidem spinis, obtusis, depressis & vix conspicuis, in carinæ summitate sitis, antrorsum spectantibus; thorace tenuius in caudam magis magisque desinit. Inter postremum articulum & caudam segmentum est tenuissimum; siue pars caudæ oblongam, non carinatum, sed ossæ longitudinaliter sulcato superne tectum. Cauda consistit lobis 4, foliaceis, subovatis, circumcirca ciliatis, qui supra teguntur ossæ oblongo, sulcato longitudinaliter & valida spinâ postice terminato. Dicti 5 articuli abdominis totidem habent paria pedum, minorum, cillis inferne confitorum. Inferne in thorace totidem pedes sunt majores; Sex-tum par & septimum, quinque illis posterioribus duplo longius, superioribus articulis pilosis. Octavum & nonum par æquali ac 6tum & 7mum longitudine, omnium tenuissimum. Decimum, siue manus, longissimum est crassissimumque; chelis teneris valde aduncis armatum. Palpi antedicti æqualem huic pari habent longitudinem & ad insertionem capitis articulum teretem; pilis brevissimis hirtum. Oculi magni sunt; ut cancorum, non multum elongati. Dette Insect opholder sig ude i Havet, og kommer aldrig op til Strandbredden, saa at vi ikkun have seet de to anførte Exemplarer, af hvilke det ene var fundet i en Kollies, det andet i en Helleflynders Nave. Det forste, fra Sønderlandet, var og beskædiget.

1) Skæle, Scolopendra corpore lato squamoso pedibus utrinque viginti quinque. Om dette Insect er Scolopendra submarina En. Sy. 1259., ere vi ikke vissede om. Det er i Tomme langt, og, tillige med Hodderne, 4 Tomme bredt. Legemet

er fladt, og Hovedet lidet, med 2 korte Antenner; den 3die, som er lidet længere, skal være Trynet, da det gaaer midt ud fra Hovedet foran. Hodderne ere 25 paa hver Side, med Ryser, neden for hvilke de deefte i mange Parter, som ligne Haar. Rumpen er treddelede; og hver Del igjen har 4 sammenfoiede haarlignende Greene. Munden er ikke tydelig. Insectet gaaer temmelig stærkt til, og rækker frem af Munden en sort haarlignende Snabel, hvis Skabning vi umiddeligt kunde see med blotte Øine. Skeren holdes af Gifternes forgiftig. Den lever i Siæren og Sivanden.

Kj. Blødder-Skere, eller Blære-Orm, er en Julus pedibus utringve 160, multifidis. Den opholder sig paa samme Steder, som Skeren; og, skjønt den er langt større, længere og tykkere, hvorvel mindre breed, ligner den dog samme i Hensigt til Beenene og Legemets Skabning. Derfor kaldes den af nogle paa Vesterlandet Blødder-Skere; paa Sønderlandet derimod har den intet Navn, saavidt vi vider. Den bliver en halv Fod lang og en Trediedeel Tomme breed, og Tykkelsen er en Fierdedeel Tomme. De 260 Hodder, som den har paa hver Side, deeles igjen i 40, smaaformede Træder, som baade tiene til at gaae og svømme med; og indar Dyret rører sig, ere de alle paa engang i Bevægelse. Hvis den opværes, skyder den hastig ud af Munden en rund Blære, tykkere end Legemet. Denne Blære er Marsag til dens Navn, og udgjør tilfide dens største Forstik for Skeren; den er blå-violet og glindsende af Farve, men bliver hvidblaatlig, naar Insectet er død. Blærens Abning foran er perpendicular, og besat rundt omkring med sorte korte Haar, hvilke ikke sees paa det døde Dyr. End i denne Blære; og udaf den igjen, spruder den en hvidguulagtig Vædske, i Mængde, hvilken ligger blandes med Vandet, og

Rangaavalle-Naturs og Guldbrynge-Syst. 1001

meenes almindelig at være forgiftig. Blære-Ormen er langt rarere end Skeren; dog have vi nogle Gange truffet den i Siæren paa Vedde, naar det var størst Ebbe. Bester paa sees den ikke en gang saa ofte.

§. 900.

Endel af de Orme, som findes paa Vesterlandet (§. 689.), have her ogsaa hjemme, undtagne a, c, og de 13 og 15 takkede Korsfiste (ibid. i). De besynderligste som vi have fundet her, ere alene følgende.

Ormene.

A) *Madkamoder*, en rar og ubekjendt Orm, som teengang blev bragt til os paa Vidde: den bliver en *Hirudo annulis* 40, sulcis live radiis circa orificium 24. Om den Lap, som befaantes at hængt ned fra Munden, er naturlig, eller saaledes kommen indvendig fra, viide vi ikke; thi Ormen var, den Tid vi finge den, noget beskadtiget. Den har sit Tilhold i Perret i Stranden, og fordi Madding-Ormen (*Lumbricus litoralis*) opholder sig paa samme Grund, saa meener Almuen at denne *Hirudo* er Moder til den; endskiont den er meget mindre, og langt anderledes skabt. *Madkamoderen* bliver 2 Tommer lang.

B) *Svarte-Snigill*, *Limax ater* (Syst. N. 252 - 1. og Fn. Sv. 1276.). Den findes i Mupshlid, og paa flere Steder i Landet, i Lyngbrinke. Den kan blive over 3 Tommer lang.

C) a) *Tethys corpore rotundo, rubro & albo*, *Konul pungur*, er iblandt de største Søe-Orme i Island, og deler, skiont kun sjælden, op til Strandbredden. Den er ganske rund, gierne rød; og hvidpletlet og har en tyk glat Hud; som raat Ores Læder at se paa. Man skal see nøie til, for at finde dens tvende Nabninger. b) *Tethys, corpore ovato, rubro, auriculis duabus*.

Endskione disse Kiødemærker komme overeens med Syst. N. 254-2, bliver dog vor Art forskiellig; derimod bliver den formodentlig den samme Orm, som Hr. Strøm (Sendm. Bestr. p. 206.) anfører. Den sidder gjerne fast paa Thang og Steene, dybt i Stranden. Den største er funden paa Vesterlandet, som en Kastanie. Dens lyserøde, Huid er tynd, men temmelig stærk, og lidet skarp eller knudret, som Skagrin; i de tvende vortelignende Forhoiøiser, som staae pverst, kort fra hinanden, er en Nabning, som giver af sig et salt siimagtig Vand. Denne Tethys kaldes af nogle vester paa Sæ-Buxur, eller Sø-Buxer. c) Sæ-Koppur i Sæ synes ogsaa at være en liden Tethys, corpore ovato, albo & purpureo variegata. Den sætter sig fast paa Thang og Steene i Stranden, hos den næstbemældte, dog er den endnu rarer, og ikke større end en liden Vble-Kiærne, men trind og meget oval aflang. Oven i har den kun een Nabning. Den er ellers hvid og deilig purpur-rød. Begge disse Arter træffes baade sonder og vester paa,

D) *Nereis* (Pelagica) segmentis annularibus (circiter) 30, Dette Exemplar var tørret og bekladiget, og kan maaskee have flere Leed, eller Deele, efter *Linnaei* Beskrivelse (Syst. N. 255-4). Dyret er 3 Tommer langt, og henved 1 Linie tykt, og har ligesaa mange Godder, som Leed, og disse bestaae af nogle haarligtignende Deele, ligesom Skerens (§. 899. H). Munden er besynderlig; thi den har 2de krumme forte Horn eller Sæ, eet til hver Stiide, af Skakning som Fuglekloer. Dyrets Farve er hvid. Det er ei fundet nogensteds, uden aleene i Drognskifens Bave.

E) *Astinia*, corpore ventricoso molli, tentaculis numerosis variis. Man har giemt den til dette Sted, siden den og findes paa Senderlandet; men den er dog almindeligere paa Vestfløe

Dens

dens Kyster. Den har inter Islandsk Navn; men *Hill* har (Hist. Nat. Lib. 2. Ser. 3.) beskrevet den under betændte Græske Navn, og vor Art er hans Sp. 2. Aftegning af den findes baade hos ham og hos *Fonfon* (Aquat. Tab. XVIII.) iblandt *Urticæ* eller Sværdnerve. 3 Island kan den blive 3 Tommer tyk i Kroppen, som spiller, ligesom *Tentacula*, med blaa, røde og gule glindsende Farver. Den er meget blød at føle paa, og har sit Tilhold i Strandskippernes Huller, meest ved Patrixfiord, neder paa Grunden, dog over Vandet, naar det er lavt, ved nye og fuld Maane. En anden *Actinia*, ganske liden og gul-bruunagtig af Farve, som er *Hills* Sp. 3., synes at være den samme Art, og Forfælleren ikkun at bestaae i Farven og Alderen.

F) *Aphrodita Hemisphærico-ovalis glabra, bicornis*. Denne Orm har heller ikke noget Islandsk Navn: den kommer meget overens med *Linnaei* Syst. Nat. 256-1. Den sætter sig paa de nedertige Strandskipper, ligesom *Actinia*, men flytter sig lidt. Den bliver meest 1 Tomme tyk neder ved Roden, og almindeligst lidt over en halv Tomme, da den kan faae 1 Tommes Højde. Den har to Par lange Horn eller *tentacula*, og har sit Tilhold paa Vesterlandet. 1756 saae vi den ved Vedde, af selsomme Skabning, undtaget at Huuden paa den var endnu stivere og tykkere, hvilket maaskee er kommet af Alderen. Men det besynderligste var, at vi funde 3de Exemplarer af den, alle omgivne med en Skalmiden til, hvilken sad fast paa Klippen. Skallen var hvid og rynket, som Balanernes. Enten maae afseaa dette Dyr indtage andre Dyrs Husse, eller selv bygge saadanne, men kun paa de Steder, hvor den vælger en stadig Boepæl. *Lessers* *Amygdala marina* (Testac. Theol. I. 1. c. 2.) kommer noget overens med denne vor *Aphrodita*.

G. *Gigarpusa* (*Volva gigantea*) kaldes i Jsland en *Aphrodita*; corpore cylindrico, superne plano, appendicibus orificii 6. Den er meget fast og sei i Riidet, og omgiver med en seeneagtig Ring eller Giord, som er saa breed, at den tiener til Skul og Bærn for Dyret, naar det trækker sig sammen; med denne hænger det sig ogsaa meget fast til Klipperne. Det ellers især de Strandklipper, som ere udbullede, eller af Oprindelsen smæltede, fordi det kan holde sig der fastest, og af samme Aarsag kaldes denne *Aphrodita* nu almindeligst af Bisterne *Sraunpussa*; dog er det første Navn ældere. Den er ellers hvid i Riidet, og udbendig besat med sorte, langagtige Striiber. Oven til er den ligesom afkvaaren, og har en Abning, ud fra hvilken der løbe 6 korte, en halv Linie tykke Stumper. Dyrets Legeme er 2 til 3 Tommer tykt, men 3 til 4 høit. Bisterne trække det undertiden op fra Hav-Bunden, paa deres Kroe; især er det almindelig bekiendt ved Søekanten paa Nordlandet. Ravnene æde det ikke, om de ere adbragte saa hungrede, hvilket man har prøvet om Vinteren.

H. *Brimbutur*, *Priapus* (*Equinus*) *ovato oblongus*, *multiformis* (Syst. Nat. 258-I.), er iblandt *Hills* *Salacios*, og har adskillige Skikkelser; naar man kommer til og rører Dyret, eller hvis det mærker nogen Uroelighed, faaer det den ovalafsnge Skikkelse. Kroppen er altid rynket, og har en meget tyk Huud, som blødt bereedt Læder. Dens Middel-Længde er 4 til 6 Tom.; men naar Dyret ligger i sin Magelighed, og strækker sig, kunne de største blive 1 Fod lange og 2 Tommer tykke, og synes da uordentlig dannede, nu tykkeste i Midten, nu til Enderne, nu ganske suulle til den ene Ende. Naar *Brimbutur* er ikke bange, rækker den Munden ud, som rundtomkring er besat med mange Qvafter af

Leu

Tentakler, hvilke ere tykke og yderst ligesom besatte med Knapper. Farven er bruun-violet overalt, undtaget at den er lidet lyserødgigt paa den Kant, som Dyret oftest ligger paa. Det har Aabninger til begge Ender, saa og paa Siiden, hvor Indvoldene ofte hænge ud; men om dette kommer af nogen Sygdom eller Tilfælde, er os ikke bekendt. Indvoldene ere meget filne og tynde, rødagtige, hvide og båndfarvede. De siges at være den beste Madding for smaa Torst og flere Fiske, hvilket er blevet forsøgt i Guldbrynge-Syffel. Navnene ville dog ikke æde Brimbuten. Den træffes ellers baade vester og nord paa, men dog meest paa Sønderlandet, og ligger om Ebben paa det tørre.

1) Krosfiskur, Asterias. a) Den almindeligste, Asterias stellatus radiis 5 aculeatis, er allevegne i Jøland. Den findes ogsaa kun med 4 Straaler, men det er tilfældigt, og man træffer undertiden en liden Epidæ af den ste, som er voksen frem igien. b) Asterias stellatus radiis 5 non aculeatis, purpureus. Denne Art er uden Takker, dog lidet skarp paa Huuden: den er purpurrod, og har trinde og smalle Straaler, i Stedet for at den første er giærne flad (see Fn. Sv. 1285). c) Asterias radiis 5 tenuissimis rigidis, in morte dissilientibus. Om den er Scolopendroides eller Ophiuros Auctorum, er ikke vist; ellers findes en temmelig god Tegning af den hos Rumphium (see hans Rariteit-Kamer No. 15. B & c). Af denne Art have vi fundet 2 Exemplarer paa Vedde, dog ikkun een gang, men vi erfarede det samme med dem begge, at de bleve stive, og deres Straaler brækkedes af sig selv, i det de døde. d) Niu Anga Krosfiskur, Asterias stellatus radiis 9. Vi have meldt i Vesterlandets Beskrivelse, at der er bleven funden een med 13, og en anden med 15 Straaler eller

Tentakler. Denne nærværende sandt Land-Physicus Poulsen paa Sønderlandet i Aaret 1764; Aftegning af den sees hos Rumph. (loc. cit. No. 15. F).

K) Gislfætingr. Af Polyper have vi ikke fundet uden dens ene i Island. Den skulde være en Hydra iblandt *Linnei* Zoophyter, og sølgelig den *Polypus tentaculis senis*, som findes i Havet ved Engeland. *Involucrum campanulatum* bleve vi ikke vare. Ved det at Gaarene, som aade Tang i Sjæren, døde hastig paa Bidoe i Aaret 1764, undersøgte vi ofte dette Slags Hav-Vært, og funde tilsidst i den Art *Erethang* (S. 594.), af hvilken Indbyggerne undertiden lave Grød, denne Polype, der sad inden i Læggen. Den var small, som Traad, og henved 4 Linier lang, med 5 Anger eller Tentakler. Saasnart den mærkede Ufred, sprang den og bevægede sig forunderlig hastig, og ligeledes da den kom i *Spirit. Vini*, holdt den langt længer ud, og tog hastiger afsted, end noget andet Insect eller Orm, som vi have tilforn ladet komme deri. Dens Farve var mørkerød, brunnagtig. Den kan lere være skadelig for Gaarene, men at den ogsaa skulde være skadelig for Mennesker, er endnu ikke erfaret. *Erethangen* bliver ogsaa altid baade haffet og kaagt, forend den spiises. Med *Myrikiarnen* og flere slige Hav-Værter, som spiises raae eller tørrede, kunde det være andet, hvis Polyperne boede i dem, hvilket ingen i Island er endnu bleven var.

L) *Rediumadkur*, *Tænia articulata subteres* (Fn. S. 1267). Den er meget rar og iskun funden paa Vesterlandet, imellem de Urter, der vose i den stærke Søe paa Sødlogsdals Præstegaard. Den er henved 3 Tommer lang og 2 til 3 Linier breed, tykkest foran, smallere bag ved, og spids til begge Ender. Den er grønagtig
gians

giennemfigtig, og bestaaer af smaa Rugler. En anden Tænia, næsten saa lang, men meget small, og trind, findes paa samme Sted. Den er kun en halv Linie tyk, eller lidet over. Maaskee den er kun en Forandring af hin: Farven og Anseelsen ere eens, og man ved ikke, at sige af flere, end den een Vermis cucurbitinus Auctorum, nemlig den Tænia, som boer i første Bænde (Syst. Nat. 311-1).

§. 901.

Skælffist kalder man under eet i Island alle Conchylier, *Skælffistene*. hvilke og ere blevne kaldte saaledes i det gamle Nordiske Sprog; hvorimod de egentlige Fiske, hvis Huud er bevæbnet med det Slags hornagtige Lameller, som man ellers kalder Skæl, hede Kæsters fiske, for at skille dem fra Torff eller andre Arter, som ikke have det Slags Skæl. Vi ville ellers erindre, at det Stykke af Natur-Historien, som handler om at kiende fra hinanden, eller retter at sige, at viide de vedtagne Navne paa alle Arter og Forandringer af Conchylier, synes at være det unyttigste, og Bidskaben selv, hvis ikke den herskende Mode havde i visse Henseender gjort den agter, en stor Forsængelighed. Vi have derfor giemt til dette sidste Stykke, at handle om Conchylierne, endskønt de fleste Arter og Forandringer af dem, ere blevne fundne paa Vesterlandet; og af denne Aarsag maae man ikke fortænke, om denne Sag ikke bliver meget vidtløstlig udført. Island har ikke heller mange eller store Arter af anseelige Sneglehuuse eller andre Skaller af dette Slags. Dog har det derimod desto flere af de mindre, især af Snekker, som ikke overgaar Størrelsen af en Vrt, og nogle saa smaa som et Knappenaals-Hoved. Og skulde man nu, efter den vedtagne Maade, anfætte ligesaa mange Arter, som man finder Forandringer i Farven

i Farven og Tegningerne, kunde maaskee et stort Fald bringes til Bæie; men man bør see paa Skabningen, og ei alene paa Farven, naar man vil finde den virkelige Forskiel; det hjælper og kun sjelden at see paa Størrelsen. Ja man kan endog saa let blive forvildet ved Vanfskabninger og tilfældige Forandringer i Skallenes Dannelse; thi intet er almindeligere, end at see vanfskabe Conchylier. Vi ville da opregne de fornemste Arter af de Jslandske, med deres mærkværdigste Forandringer, især i Hensigt til Farven, og da først dem, som høre til Havet og Stranden.

Mangskalle-
de.

I. Mangskallede eller Multivalves.

A) *Cibit* (Punctatus) testa octovalvi lævi carinata (Syst. Nat. Ref. 266 - 4.), kaldes af nogle *Christrendingur*. Dette Dyr findes undertiiden paa Strandflipperne allevegne i Jsland, og holder sig saa fast, at man ikke saa let kan rive det løst derfra. De største blive som en Hasselnod. Legemet inden i er rundagtigt, og fladt neden under: det har een eneste Arm, som bøies noget lidet paa etstet. Skallerne ere mørke og lyserøde, samt meget smukt isprængt med hvidt, og have desuden sine Tegninger.

B) *Lepas*, Grudurkall. Heraf falde endeel Arter, og deris blandt disse estersølgende. a) *Lepas testa cylindrica*, ere saa non sulcata, valvis 12 lævibus. Den er ulig alle de andre, og langt større; man har endog faaet den i Vester-Havet, uden for Jsland, saa stor som en knyttet Næve. b) *Lepas testa ovato-hexagona* utrinque quasi truncata, cellulis circumcirca 24. Er den rareste Art. Man har gravet den op af Jorden i Vardesstrands-Eyssel. Den er og funden paa de opdrevne store Hvale, som ere blevne gamle. Klein (i hans Værk om Skalskiftene Tab. XII. Fig. 98.) har den, men hans Tegning er ikke god. Navnet Balæ-naris

naris sammesteds viiser, at den er bleven funden paa Hval, paa flere Steder end i Island. Nabningen inden i er som en Kalk, og desuden seer man i den dobbelte Skall 24 Mellemrum. Denne Lepas har ellers den smukkeste og ordenligste Skall. c) Er den almindelig bekjendte, paa Strandklipperne; men der findes ogsaa een i Havet, over 1 Tomme høj, som ligner den noget, og har i den dobbelte Skall, henved 80 Celluler. d) Helsingianes, *Lepas, concha anatifera* Auctorum (Fn. Sv. 1350). Man har ogsaa havt den Mæning i Island, at den foranførte Bidsgaase-Art, Helsingen, vorede ud af den. Man finder den meest paa Vesters landets Drivtommer.

II. Tveestiallede Conchylier. Af dem findes henved 20 Ar. Tveestiallede. ter; og de fleste bekjendte.

A) Bergbue, *Pholas testa oblique truncata*, costis tortuosis inferne muricata, er en af de rareste Arter i Island, og findes i et Lag af haard Sandsteen i Stranden paa Vidøe; hvor den har gjort sig mange Boliger, og naaer med sin over 1 Quarter lange Snabel op i Luften, naar der er størst Ebbe (see *Hills* Sp. 1. og *Syst. Nat.* 268-13).

B) *Mya*. Derunder har *Linnaeus* *Tellinas* Auctorum, som kaldes paa Islandsk *Gallokur* eller *Skrælaage*; og da 1) *Smyrslingen*, *Mya testa ovata ad proboscidem truncata* (see *Westgötha-Beskr.*), er omtalt tilførn (§. 99). Den kaldes ogsaa *Sandsmiggur* og *Reddustiel* paa Langenæs; hvor den spises (§. 748.), og findes ellers imangesteds. 2) *Mya testa ovata membranacea candida*, margine ad proboscidem protracto reflexo, er den smukke Skall, som opgraves ved Soget (§. 870. b), og driver ogsaa op af Havet sønder og vester paa (see *Lessers* Testac. No. 106.).

M m m m m m

C) *Ostrea*.

C) *Ostrea*. *Linnaeus* har ogsaa sat *Pectines Auctorum* iblandt Ostfers. 1) Østra eller *Ostrea edulis vulgaris* (Fn. Sv. 1338.), er overalt bekjendt. Den skal findes i Hvalsfjord, men vi have ikke seet den. 2) *Serpudistur*, er de Norstes *Sarpestial* (S. 239.), *Ostrea testa orbiculari aurita*, *circulis purpureis*, radiis 100 (see Fn. Sv. 1344.). Radii ere ulige, og de største eller højeste henved 40. Der findes ganske høide, og iblant gulbakte de Skaller af dette Slags. Undertiden er det ene Dre borte, som ellers altid er mindre end det andet. Dyret i Skallen er rart at faae, og holdes for en behagelig Spiise. 3) *Ostrea testa pectinata irregulari rocosa*, er en liden vanskabt Art. med snart utallige Forandringer. Den findes sonder paa.

D) *Anomia*, *Gluggastiel*. 1) *Anomia orbiculata*, som kaldes af *Linnaeo* *Squamula* (Syst. Nat. 188.). 2) *Hans Retusa* (loc. cit. 191.). 3) *Anomia testa piriformi*, versus *cardines protracta subcompressa*, meget liden (som Høvre-Froe), falder vester paa, dog rar.

E) *Mytulus*. 1) Krællingur, paa Norst Kragestiel, er den bekjendte ædelige Musling, *Mytulus testa oblonga caerulea* (see Fn. Sv. 1333.). Den falder snart allevegne, og spiises meest paa visse Steder paa Vesterlandet. 2) Ida og Ødustiel, er de Norstes Øststiel og Torststiel, *Mytulus testa ovato-oblonga planiuscula*. Den spiises ogsaa, dog bruges den meest til Madning for Sijf. Endes uvisse Banskabninger faide her af disse begge, for Exempel: *Mytulus unguatus* (Syst. Nat. 216.), hviske ikke giøre adskilte Arter, siden de ere ubestandige.

F) *Cardia*, *Hiartastiel*. 1) Baarustiel, *Cardia testa cordata pectinata (non aurita) costis cylindricis 30 ad 40* (see Fn.

Sv.

Sv. 1340). Dyret spises, men er rart at saae. 2) *Rustiel* er de Norske *Rostiel* og *Rundstiel*, *Cardia testa ovata laevi crassa*, *circulis vel striis parvis innumeris* (se Syst. Nat. 76.). Om den er talt i Forbeien (S. 98. og 689. l). Skællen giver den bedste Kalk; Fiske er ogsaa baade sund og velsmagende til Spise, endskønt den falder sei. 3) *Rustastiel*, *Cardia testa ovata tenera laevi*, ligner, i en Hast at see, *Rostiel*en; dog finder man hogen *Forskiel*. Den, som spises, bister paa, kaldes *Krostiskur*, af den lange, spidse og beiede Svabel, som den har indvortes, men rækker ikke ud. 4) *Gimburstiel*, *Cardia testa ovata minus convexa crassa*, bliver ikke større end som en *Septenstilling*, og bruges meest af Børn til at lege med, som *Spillepenge*. Det er blot i Hensigt til *Rostiel*ens Størrelse, at denne kaldes *Gimurstiel*.

III. *Penstiel*ede Orme. Af disse, og især af *Snekkerne*, *Conchifæde*. findes den allerførste Mængde i *Jøland*, dog kun saa smukke, og de færreste af dem, der ere bekendte i andre Lande, eller bruges til *Stue* *Stads*. Det besønderligste er, at her ikke falde over 4 til 6 *Arter* saa store, som en *middelmaadig* *Være*; alle de øvrige ere ganske smaa, og hore for den største Deel til *Turbines* og *Neritas*. Vi havde ikke Leilighed at samle disse Dyr, eller at bringe dem i *Orden*, medens vi rejsede i *Jøland*; men siden, da *Eggert* *Classen* kom til *Vestfiordene*, hvor den største Mængde falder, og opholdt sig der nogle *Uar*, samlede han og beskrev alle de *Arter* af *Conchylies*, som han kunde overkomme, af hvilke de mærkværdigste findes i dette *Værk*. Til denne *Class* hore da

A) *Buccinum*. 1) *Peturs-Rongr* eller *St. Peders Snek*, *Buccinum testa oblonga acuminata laevi spiris 7 ad 8*
M m m m m m 2 rostr

roſtro canaliculato protracto reflexo. Den er meget rar, og findes kun paa Veſterlandet. Sneglehuuſet er hvidt, glat, og glindſende. Efter Tegningen ligner *Fonſtons* (Aqv. Tab. XI.) *Turbo longus* den. 2) *Buccinum teſta oblonga candida, acuminata ſpiris 5 ſulcatis* (Syſt. Nat. 633. og Fn. Sv. 1321.), findes alene opgravet i Thingøe Syſſel. 3) Bobbe kaldes den forommalde adelige Snekke (S. 100). I Jøland ſalde toende Aalter deraf, ſom tages under eet. Den ſtore er *Buccinum* (*Lapillus*) *teſta ovata acuta ſpiris vel anſtractibus 6* (ſee Syſt. Nat. 403.). Den ſalder 3 Tommer lang og 1 1/2 Tomme tyk, og ſpiſtes af Indvaanerne paa Veſterlandets Kyst. Den er hvid af Farve, og jævnet, end den anden og mindre Art, *Buccinum teſta ovata acuta cærulea*, ſpiris 5, ut & ventre undulatis, ſtriis tranſverſis innumeris.

B) *Murex*. Den ſtore *Haſ-Kongur*, *Murex teſta ovata acuta tuberculosa, ſpiris 7, carinatis & corniculatis, columella margine protracto reflexo*. *Fonſtons* *Turbo magnus* ligner den (ſee l. cit. Tab. XI. og Syſt. N. 452.). *Haſ-Kongen* bliver ſaa ſtor ſom en Enghet Næbe.

C) *Dolium*. Man maae betiene ſig af dette generiſke Navn, med hviſet Auctores have betegnet *Cochleas Globosa*, endſignt *Linneus* har det ikke. Det hører iſt de Sneglehuuſe til, ſom ſalde i Jøland, og kaldes under eet *Taa-Kongur* og *Veitukongur*, ſerdt de bruges til Løkkemiad for Fiſk. De have blandt alle Snekker den tykkeſte Skall, et lidet ſtadt Eryne (roſtrum), og ſaa tykke Kringelbugter. Af Farve ſalde de hvide, Rødfarvede, gule, røde, brune og brøgede eller bælſtede med bemaldee Farver. De ſtorſte kunne blive, ſom en Kaſtanie, men almindeliſt, ſom en Haſſel.

Rød.

Nod. Den store bruune kommer oftest for i Siæren, og denne er *Dolium testa ovata crassa, striis transversis confertis & elatis inæquali*. *Linnaeus* har sat den og flere andre blandt *Turbines Neritoides* (see Syft. N. 528.), og denne bliver da hans *Turbo Littoreus*. Han nævner den fornemmelig i hans *Westgötha-Re-sa*, og maaskee andre af bemælte *Doliis* befattes derunder. Det Navn *Rupunge* er blevet bekiendt overalt. Siden Naakongen bruges til Madding paa Vesterlandet, fornemmelig paa Derne, saa have disse Steders Folk fundet paa at fange den med et Stykke Garn, strakt ud over et Tondebaand, hvorpaa man binder ud-blødt Torskefisk, som Naakongen søger efter, og sætter sig derpaa, for at trække Gasten derudaf, saa tæt, til der er ikke meere Rum, da Garnet trækkes op. Det lægges i Stranden om Ebben, og tages op igien om Udsalder, eller naar Vandet begynder at blive lavere. Ved denne Leilighed har man mærket, at de smaa Garn og Tondebaand, som bruges til denne Fangst, blive, af Ormens udgaende Vædsker, farvede blaarøde eller violette, ligesom dens Skall er indvendig. Og mon man ikke kunde bringe en Farve ud af disse Dyr, ligesom der er bleven bragt af Purpur-Snecken i forrige Tider? Naakongen spiises ikke.

D) *Trochus*. En eneste Art af dette Slags træffes paa Vesterlandet, og det endda kun meget sjælden. Nogle kalde den Silfre, af dens Sølv- eller Perlemoder-Farve; dog er det Navn ikke bestemt nok; thi naar den grove Skall trækkes af Høykongen, og flere Sneglehuuse og Skjellsfiste, da kommer denne Farve og saa til Syne hos dem. Nærværende *Trochus* haver en noget fladt kantet rundagtig liden Nabning, paa hollæn Skjellen staaer mesten liige op, og er *Linnaei Trochus erectus columella perforata*,

testa globosa, subacuta spiris tribus. Den er ikke større end en middelmådig Ert, og den eneste hidtil bekendte Art i Island, hvis Støtte er aaben og heel igiennemborret.

E) *Turbo*. Bliver næst efter Meriterne det talrigeste Snegle-Rien i Island, hvis Arter kaldes alle under eet Navn, *Staurus* Kongar, af Indvaanerne. Disse Turbines ere allesammen smaa, de største, som en graa Ert, og de mindste, som et hvidt Senepe-Korn. De synes ikke for at være blebne bekendte, fordi de have hverken fundet tiene til at pryde fornemme Folkes Natur. Samlinger, ikke heller have de givet nogen Nytte i Huusholdningen. Maaskee ogsaa, (omendskönt de ere blebne seete ved de Nordiske Strande, hvor de gierne gaar i frie Luft paa Strandflipperne medens Vandet er lavt), at man har taget dem for unge Snegle af andre større Arter, hvilke og falde der. Giervekongerne have alleslags Farver, dog sædvanlig dunkle; men dette bliver ikke nok til at viise Arternes Forskiel, og derfor bør man og agte paa Strægerne paa Skallen, og Kringelbugternes Fall, uagtet den sidste Post ei heller altid holder Stik. Disse Islandiske Turbines inddeles i 2 Hobe. Til den første høre de runderis strægede, og til den anden de flette. Begge Slags have en kugelformig Bug. Kringelbugterne løbe i en Spids, som udgior i det høieste en Tredeiedel af den ganste Længde. Abningen er rund heelt omkring, og folgelig have de intet Tryne. Man vil nævne især disse Arter. a) 3 den første Hob (*Turbines Linnæi cancellati*) er a) *Turbo testa ochraceo-albida, spiris vel anfractibus 3, striis transversis oblitteratis nigris, spira extrema candida, proxima fusca.* b) *Turbo spiris 4 ex albo virescentibus, ventre fusco rubicundo, cruce alba notato.* Denne Rors-Snekke er een iblandt

de største. c) Turbo testa globoso-gibba vel ventricosa, rubra, spiris tribus, extrema nigra, reliquis e griseo virescentibus. Det forreste Stykke af Randen, samt Bugen midt paa og overst er rødøstet, men Resten mørkebrun, noget grønagtig. 2) Iblandt de flatte (Turbines Neritoideos) møder først a) Turbo testa globoso-acuta glabra, spiris tribus nigris, apice albicante, ventre fasciis longitudinalibus conspicuis, fusco virescente. Denne Art er den allerstørste iblandt Siærefongerne, og tillige een af de almindeligere paa de Jølandske Strandbredder. Bugskællens Følger ere paa ingen af de andre Turbines saa tydelige, som paa denne. Dens brune grønagtige Farve synes sort noget borte. b) En aske-hvid Siærefonge, med sort Spids, stor som et lidet Heberform. c) Turbo ruber, spira virescente longiore, elevata, anfractibus 4 ad 5. Denne rødagtige Spidses Art er een iblandt de største. d) En lidet mindre rundagtig, med 4 Kringelbugter, blodrød overalt. e) Turbo testa globoso-sub-acuta spiris 4, albo-glaucocroceo & fulvo variegatus, er den allersmukkeste i dette Kion, og iblandt de største: Bugen har treende breede hvide, i Midten et mørkerødt, og overst og nederst saftanrede Baaend. Kringelbugterne ere hvide blaalige, med en mørkebrun Spids, og et guult Baaend i Midten. f) En anden siden hvid og sortøstet Turbo er ogsaa smuk: det sorte breede Bælte, som gaar midt ned paa Bugen, er kantet med en safranguul Rand, og Spidsen er blaagraa.

F) *Nerita*, *Myriapatta* eller *Møepatten*, er iblandt de Jølandske Skælffiske det allertalrigeste Kion. Dets runde Skælfelse, Skællens Fiinlid, og Glatheden, skille det fra alle de øvrige. Kringelbugterne løbe ikke ud i en Spids; Aabningen er rundagtig,

og dens Kant rund foran, ligesom paa Siarekongen. Møepatterne ere alle smaa, de fleeste, som guule Erter, og 3 eller 4 Arter, som Kirsebær. De inddeles i 4 Hobe, som blive meer og meer uordentlige. Til den første høre de egenligst saa kaldte store Neriter, hvilke gierne falde hvide, med en Nabning som en Halomaane; og Laag eller Dør af samme haarde Eone, som Sneglehuuset; da alle de øvrige have et hornagtigt Laag og rund Nabning. Til den anden Hob høre de allermeest Kuglebrunde, med Kringelspidser eller Toppen rundhvalvet og lidet dreiet til den høire Siide; disse have gierne Bølter af adskillige Farver. Til den tredje høre de omvredne Møepatter, som meest ligne et kort og tykt Horn: Kringelbugterne staae meer ud, end paa de næst foregaaende, og boies kiendelig til den høire Siide, ligesom Nabningen, saa at der er en Bugt i Midten paa Sneglehuuset, og Bugen staaer allermeest ud paa den venstre Kant. Til den sidste Haab høre de runde, bag til stumpede Møepatter, hvilke ere de færreste i Vallet.

1) Af den første Hob mærkes her: a) *Nerita testa globoso-sub-acuta crassiore spiris 4, sulcis inter spiras profundissimis*. Den er een af de største, hvid og glat. b) *Nerita testa globosa crassiore, spira submucronata anfractibus tribus*. Denne er den største og almindeligste Møepatte i Island. Skiallen er hvid ansigtfarvet: den findes opgravet paa Nordlandet (S. 722. h., og Syst. Nat. 623). c) Den brunnagtige (Fn. Sv. 1320) er ikke almindelig. 2) I den anden Hob ere disse, i Henseende til Farverne, de smukkeste. a) En blodrod Møepatte, med sorte Bølter. b) En grøngul, med bruune Baand. c) En brandgul, med mørkerøde Baand. d) En rødbrun, med hvide Tordenstraalespidser. I Henseende til Tegningen er den besynderligst iblande

de Jølandſke Skælſiſke. 3) I den tredje Hob er mærkvaerdigſt: a) Den bruune grønagtige omdreiede Møepatte, ſom, næſt efter dem i den forſte Hob, er den allerſtorſte, og blandt de almindelige paa Jøland. b) Den bruune, med hvide Dambrets-Tegninger, er rar. 4) I den ſjerde Hob ere diſſe: a) En med en indryffet ganſke lille rund Bagdeel, brandgul, med røde Bølſter. b) En gulgrøn ſtumpet med ſort Kringelbugt, og Bugen høi, kantet overſt. c) En overalt gul, ſtumpet, ſom den var afſkaaren, og viideſt oventil, hvor Bugen har en ſkarp Rand. Denne Møepattes Skabning er ret artig og beſynderlig.

G) *Patella*, Olnbogaſkiel eller Albueſkiel, fordi den paſſer til en Albue, og ligner den udvendig. Af den findes nogle Arter i Jøland. 1) Den rareſte er *Linnæi* *Patella* *Neritoidea*, teſta ovata, apice ſubſpirali obtuſo. Den har megen Anſeelse af Møepatten, og her ſalde nogle Forandringer, om ikke adſkilte Arter, deraf paa Sønderlandet (ſee Syſt. Nat. 655.). 2) *Patella* teſta ovato-conica, apice prope centrum obtuſo, er den ſtorſte, graa-hvidagtig med mørkebruune, afbrækkede ſtraalelignende Tegninger. 3) *Patella* teſta ovata mucrone ſubacuto reflexo, margine leviter denticato. Er den allermindſte.

H) *Dentalium*, Piipuſkel. De Arter, ſom her ſættes efter *Linnæo*, burde med rette ſtaaе iblandt eller bag efter *Lepades*; thi baade er Skallen mangfoldig, ſammensat, og rynket, tilmed et Dyr, ſom boer i den, det ſamme, ſom det, der boer i Strandbreddens almindeligſte Arter. Skællens Form vilger ellers oienſynlig fra. Jeg vil nævne: 1) *Dentalium*, teſta cylindracea, inæqualiter & inordinate ſtriata & torta, apertura inferiore denticulata, ſuperiore ampliore pinnata (ſee Fn. Sv. 1328.).

Den bliver 1 til 2 Tommer lang, og 2 til 3 Linier bred i Midten. De unge Lepades ere løse, og bde sammen i 1000 Tull; Skæl-
 len borer alt meer og meer i Hviden, og naar Dyret doer af Væde,
 falde den Sameller fra hinanden. Spersmaal; om ikke den be-
 kjendte Maas Strand-Lepas bliver eet med denne. Disse Viibes
 Skæller falde ikke andensteds, end vestet paa. 12) Skips-Tennur,
Dentalium testa cylindrica tenuiore, supra angustior, levi-
ter striata, sætter sig paa Skibene i Havet vesten for Island; de
 blive 1 Tomme lange, og sidde tæt sammen i Beeger. De Søe-
 farende holde dem for skadelige Orme; som giennemborre Skibene.
 men det kan endnu iages i Tull, thi de ere noget ganske andet end
 Træmaddefen (S. 689. d), hvis Kiendemærker forestilles langt an-
 dersledes og utydeliger i Fauna Svecica (1329); end i det nye Syst.
 Nat. (251. 2.); hvor denne høist skadelige Orm er bleven kiendelig
 og rigtig lagt for Dagen. 13) *Serpula.* 1) Er en hvid ubekjendt og underlig Art, som
 behøver at undersøges endnu bader, da ikkun 2 Exemplarer af den
 ere bleyne fundne paa Vesterlandets ødelige Bucciner. Den kaldes
 des *Serpula manus complicandas* referens. 2) *Serpula spir-*
orbis (Syst. Nat. 693.) findes paa adskillige Skælffiske, Thang
 og Thale. 3) *Serpula triqvetra* (loci cit. 694.); paa Klipper-
 ne i Stranden og paa de store Muslinger. 4) *Serpula testa*
Aekubæ feret findes paa Havfanger; 1 Tomme lang og 1 Lin-
 nie bred.

Land; og
 Færkvands
 Skælffiske.

Land; og Færkvands; Skælffiskene anføres her til
 Slutning; og for sig selv; efter nogle Læres Maade. Man har
 for nogle Aar siden, neppe vidst at der vare saadanne Dyr til i Is-
 land; thi vi kunde den Gang ikke faae opspurgt uden een eeneste
 Land;

Land-Mee-patte, og et andet Slags Sneglehuus bleve vi vare ved Myvatn, den Tiid vi besøgte dette Sted. Men siden ere paa eet eneste Sted paa Vesterlandet; nemlig Sødlogsdal, bleve opdagede hended 12 Arter, dels paa Marken, dels i Bække, og dels ogsaa i den første Sø, saa at man derfor kan vente, at der ville opdages langt flere med Tiiden paa andre Steder. De fleste af disse Skaller ere ganske smaa, og saa vege, at man ikke kan tage dem uden største Varsomhed, hvis man ikke skal giøre dem Skade. Nogle ere som Knappenåls-Hoveder, andre lidet større. De fornemste ere:

A) *Concha bivalvis*, testa ovata oblonga planiuscula. Den er meget lig Ader (*Mytilus* 2); og kommer overeens med Fn. Sv. 1332.3 men den er fladere, og derhos saare liden; Længden er en halv Tomme, og Skallen giennemsigtig, meget tynd og brækkelig.

B) *Cylindrus*, testa tota spirali ad extremitates obtusa, spiris 6; oris angustissimo, er et besynderligt Sneglehuus, af Cyklops form et Kaalfroe. De tvende Kringelbugter ved Nabhjgen ere blodfarvede; og de andre blaagraa. Paa bemeldte Sted findes endnu flere Arter af dette Kion; men mindre og mindre, og anderledes farvede. De holde dem paa Marken iblandt Græs og Mosses-Arter, paa og nær ved Klipperne.

C) *Dolum*, ovato-planiusculum, spira duobus anfractibus obtusa, testa fusca. Den holder sig paa fugtige Steder, hvor der voxer Græs, under Steene, og er den største i dette Kion, som et middelmaadigt Bygform.

D) *Buccinum*, testa ovato-acuta, spiris 6; membranacea fulva splendens. Er den deiligste Snegle, især formeddelt Glans.

fen af dens rødguule Skæl, hvori den overgaaer alle de opregnede Arter: men den er saare veeg og liden; den opholder sig paa tørre Steder i Marken, blandt Moss paa Steene. Her er ellers i alt 5 Arter af Land-Bucciner.

E) 1) *Turbo globoso-subacutus fuscus*, er den Art, som vi i Aaret 1752 opdagede iblandt de opdrevene Vand-Arter paa Bredden af Myvatn, selgelig maa den opholde sig i bemældte Søe. 2) En anden hyld *Turbo globoso-acutus, spiris tribus, testa crassiore alba*, opholder sig ved en Bæk i Sødøgsdal, og findes nu i Vandet, nu paa det tørre.

F) *Nerita*. Dette Kion er noget fladt eller nedtrykket, som et Rundebrod. 1) *Nerita testa globosa planiuscula, apertura parva, tribus anfractibus*. Dette er den ommældte, tilforn bekiendte Art, som findes i Nupshid, fort fra Krisevig, paa Sønderlandet. Den er som et lidet Kirsebær, og selgelig overgaaer meget, i Storrelsen, alle andre hidtil bekiendte Land-Skæliske paa Island, især Sneglehuusene. Den er mørkeguul, med 5 sorte Baand over Bugen, og ligesaa mange, men smalle, lidet fiendelige bag paa. Den opholder sig paa det tørre, mellem Lyng og Blaabær-Rodder. 2) Den deltige lille Moepatte, *Nerita testa subviridi splendidissima, spira duplici nigricante*, skal slutte de Islandiske Skæliske. Den er ikke større end et Røefroe, saare tynd, veeg og giennemfigtig; dens sørgronne Farve er meget glindsende, og kan derfor sættes jævnfides med det smukke *Buccinum*. Denne gronne Moepatte opholdt sig i Sødøgsdal paa de med Moss overgroede Klipper neder i Bygden.

Her har da Læseren paa eengang de fornemste Arter af de Islandiske Skæliske. At opregne eller fuldkommen at beskrive dem
alle

allesammen, vilde blevet for vidtloftigt, og maaſkee ikke behageligt. Man har allerede fundet i Island over 100 Arter, og hvis man havde anført Banſkabninger og mangfoldige mindre betydelige Forandringer af Farver og Tegninger, vilde Tallet blevet langt ſtorre. Der kunde og lettelig opdages med Tiiden endnu flere Arter, da al Mængden af den Samling, ſom foranførte Beretninger ere grundede paa, er funden kun paa to Steder; hvorimod al den anden Strækning af Landet er endnu ikke underſøgt i denne Henseende.

Mærkværdigheder i Naturen.

§. 902.

Paa Sønderlandet ere ſkeete endel mærkværdige Tildragelser Indledning.
baade i de ældre og nyere Tiider. Af de, ſom angaae Nationen, ere flere at anføre her end paa de andre Steder; thi her har altid været den ſtorſte Folkemængde; fremmede Skibe have forſt og ofteſt ſøgt til denne Kant; her er ogsaa Biſpeſtolen og Althinget, ſom Indbyggjerne have altid ſøgt, og ſøge endnu fra heele Landet. Vi ville dog kun nævne nogle af de almindelige Mærkværdigheder af ſamme Slags, ſom de, der ere blevne anmeldte i de forrige Stykker. Af de naturlige Tildragelser ere de ſeſte allerede opregnede. Følgende alene ville vi lægge til.

§. 903.

Skov har her været paa adſkillige Steder, hvor man nu, Skov.
i Mands Minde, ingen haver havt. Det ſamme er anmærket over det heele Land. Det mærkværdigſte er, hvorledes den, i Særdeleſhed Birken, ſom meſt har vopet her i Landet, er udarter; thi man ſeer nu kun ſmaa Træer af 2 til 3 Tommers Tykkelse,
Nnn nnn 3 hvor

høje Træerne tilførn have været i Qvarter, og derover. Over
 saadan Skovens usformækt tiltagende Vantroining klages ogsaa
 i andre Lande. Men een af de største Narfager hertil i Island, er
 den, at man helst i de senere Tiider, har idelig ophugget de stør-
 ste og beste Træer, og ladet de andre staae og raadne op, hvo-
 imod man veed, at de ældste Indbyggere have brugt den Maade,
 ikke at hugge unge Træer til Ildbrand eller Kull, men kun de gam-
 le; de have endog opgravet aarlig af Jorden, tørret og brugt til
 Brændsel, de raadne og visnede Rødder, i Stedet for at Efter-
 kommerne, især i de senere Tiider, have ikke givet de unge Træer,
 endog dem, der tegnede til stor Væxt, Tid til at vore. Dog findes
 endda, paa nogle Steder i Landet, ung Skov, som tegner sig godt,
 hvis den maatte staae i Fred og vore, for Exempel den i Thing-
 valls-Græni, som er een af de beste, har ogsaa en vidtloftig Stræk-
 ning. Man har ellers 3 eller 4 Steder, som endnu kunne frem-
 vise store Træer af Birk (dog kun eet paa hvert Sted), hvilke Be-
 boerne, een efter den anden, have gjort til en Regel at spære og
 lade urøerte, baade for Væxtens Skyld, og for at kunne fremvise
 saadant et Træ, som en stor Naritet. Disse enkelte Stykker have
 igien ynglet saadanne unge Træer, som have fiendelig overgaaet
 alle de øvrige, og ligeledes tegnet til en overordentlig Væxt. Aar
 1756 saae vi saadant et Birke-træ i Florshtid, paa Eymundsmule,
 en Selveiergaard og et Kirkested. Det staaer tæt ved Gaarden
 paa en haard Klippe ved Naen. Det var 40 Fod høit og 67 Nar
 gammelt, og begyndte nu at visne oven til: men et ungt Træ,
 som var dets Afkomning, tegnede til ligesaa god Fremvæxt; der va-
 re ogsaa 2de andre ganske spæde Afstæggere. Det som gior Træet
 desto mere anseeligt, er, at det staaer aleene, og at her aldrig, saa-
 vidt

vidt man veed; i nogle 100de Nar haver været Skov eller Krat i Nærværelsen. Paa Skalholt har i næstafølgte Hundrede Nar staaet saadant et stort Træ, som var plantet; og ligeledes mange Træer paa Modrevalle i Desfjorden (S. 757.); hvilke Exempler synes at give tilkiende, at det nok kunde lykkes, om man vilde forsøge at plante unge Træer, der vare af god Art, hvortil ei alene Birke, men ogsaa Rømmetræer, skulde vist blive tieltige. Sønderlandets fornemste Skov, som nu er bleven odelagt, har været paa Rangaarvalle, vidt og breedt omkring Hekla, fra hvilken og dens Ode læggelse af Torsningen er kommen, og saa ofte igjennem, ved dette Værgs Jdsprudninger; ligesom og Narbøgers Skriversne us trykkelig nadvigive nogle af de Nar, da et og andet Stykke af dens ne Skov er afbrændt. Om Vedoe veed man ikke, at der nogensinde har været Skov; dog fandt man der heele Stykker af raade uede Birke-Træer i Grunden, da der i disse sidste Nar bleve optagne nye Pladse til Torvestkar. Oppe paa de vidtlostige Fjældene, langs med Eirefs Fjel, har været Birke-Skov indtil for 50 Nar siden.

S. 904.

Hoed der angaaer Jordbrandens Virkninger paa Sønderlandet, er for den største Deel opregnet tilforn. Vi have alene gikket til dette Sted at mælde om den Jordbrand, som siden Landets Beboelse har yttret sig i Røstengjæts Fjælde, fra Hallsheiden, eller den Række, der løber ud til bemældte Pynt og ud i Havet. Den første Opsrudelse skeede her, i Aaret 1000; i Fjældet oven for Bløes, da en Jdaa eller Strøm af smaltet Materie styrtede sig ned igjennem den høie Fjældløste Vatefjæld, til den underliggende Bygd. Man ser der, som Levning af denne første

Virkninger af Jordbrand, især paa Røstengjæts Fjæld.

Jord

Jordbrand, en stor Strækning af Jordsinner, som endnu kaldes Thueraar-Hraun, rimeligst fordi de brændende Steen- eller Smelte-Gloder, hvilke nu kaldes Steen-Aaer, ere af de Gamle blevne kaldte Torre-Aaer, fordi de ere tørre i højste Grad, naar de signes med Vandet, som de reite Elve føre. Trølladyngiur, eller Trolddynger, kaldes et Sted af sammenstaaende Bjerge, norden til paa ovennævnte Strækning, især i den Række af Bjerge, som kaldes Underhliðar. Nogle af Middelalderens Aarbogers Skrivere have forbyttet dette Sted med de ildsprudende Bjerge paa Østerlandet, som have samme Navn (§. 766). Det er og vist, at Sønderlandets Trolddynger have ogsaa sprudet en forfækkelig Tid, men det er ikke blevet fuldkommenlig bekiendt, uden Tvivl af den Årsag, at de, som skreve Aarbøgerne, have været langt borte, vester og nord paa Landet. Vi have besøgt baade disse Trolddynger, og de nyere Hraune, og fundet Stedet overalt omgaaet, og især Bjergene, endskjønt smaa, dog opkastede og bestaaende af adskillige Slags Jordsinner og Steene, som ere angrebne af Ild. Biskop Gisle Oddsens Antegnelser (§. 110.) ere det eneste Skrift, som mælder, at Trølladyngia haver raset 1340, og ført sine Ildsprudninger lige ned til Havet paa det Sted selv. Men det er rimeligst, at flere saadanne Gloder af smeltet Steen ere nedstyrtede fra dette samme Sted paa andre Tidder og Steder. Det synes ogsaa, at man har udstrakt dette Navn til flere Bjerge her i Nærheden. I det mindste er vist, at Indbyggerne i og nær ved Kriseviig, vilde at fortælle om en forfækkelig Jordbrand, som er opkommen paa disse Fjælde i gamle Dage, og har skiftet en Ildstrøm ned til Søekanten, og ødelagt nogle Gaarde paa den Strækning, hvor Øgmunds-Hraun nu ligger,

og

og iblandt disse et Kirkested, kaldet Holmastadur, hvor man endnu
seer Stykker af Kirke-Gaarden og Huuse-Østene. Paa Vand-
løse-Strand sees overalt den skrækkeligste Ontumling, med smæl-
tede Klipper, og fæle Sprækker og Nabninger i Jorden; og, saasom
disse Graane ere nye, saa have Froiddyngerne uden Tvil frembragt
den. Reykenæs-Pynten er dog især det Sted, som altid har
havt aaben Gang til Jidbiærgene oven for. Biskop Oddsens beret-
ter, at der har været en forfærdelig Jordsbrand i foromtalte Aar
1340, som har fortæret meere end Halvparten af Næsset; men
dette bør dog kun forstaaes om den yderste Deel af samme. Der-
imod give Verne i Havet her uden for det allerførste Bysis
paa denne Jids Herredomme, ei alene i Grunden af Landet, men
endog fornemmeligst i Havet her uden for; thi her har Jiden havt
sit Sæde fra allerældste Tider, og tidt og ofte brækket løs, op af
Afgrunden og igjennem Havet, hvis Dyb og Bruusen have ikke
kunnet staae imod dens Kraft. Saavel Sturlunga-Saga, som
de gamle Narnæger vidne eenstemmig, at der er opkommen Jid, og
fleere store Opsprudninger, ikke mindre end fem Gange i den 13de
Alder, hvorved de gamle og nye Der, paa denne Kant, have været
forunderlig vekslet om med hinanden, saa at de gamle ere sunkne
ned, og andre nye opkomne i Stedet. Aar 1422 brækkede Jiden
løs igen; men efterat den den Gang havde udraaset, hvilede den til
1583, da den, efter uslebemædte Biskops-Integuelser, blev seet
den sidste Gang langt ude i Havet; af et Skib fra Bremen, som
paa samme Tid seilede her forbi. Den tilforn (S. 772.) fremsatte
Meening, om Narnægen til den utroelige Kraft, som deslige Op-
sprudninger have i Island, faaer her et nyt Bys og Eftertryk, haa-
de i det at Havet ligesaa sulde frembringe Jid og store Opkastninger,

som Fiældene paa det Torre, saag og derved at begge have her havt saa kiendelig Samfund med hinanden.

§. 905.

Dødende
Virkninger
fra Lufften.

Hvis tvende Ilddragelser, som vi nu ville fortælle, ikke vare saa nyelig skeete, og i mange Menneskers Paasyn, vilde de maaskee ikke troes. De Mærde blandt Indvaanerne paa de Steder, hvor de skeede, have og givet onde Aander Skyld derfor; og man kan just ikke saa meget fortæuke dem derfor, siden den Høll. Skrift ikke strider derimod, og deres Indsigt i Naturen kunde ei heller give dem nogen nærmere Oplysning. Den første Ilddragelse var denne. Vi herde først fortælle, at 3 eller 4 Mennesker var døde meget hastig paa Vandløse-Strand, sønden for Havnesfjord, om Vinteren 1753 = 54, deels for, deels efter Juiul, især paa et Sted nær ved en liden Bondegård, kaldet Landekor. Gruuden her er aaben og forbrændt overalt, hvorfor vi tænkte, at samme maatte have givet fra sig noget Slags Damp, som nu var bleven giftigere end ellers, ved det de fleeste Trækhuller vare blevene tilstoppede af Sne og Iis. Vinteren derefter døde der langt flere, og ligeledes den tredie Winter, indtil der vare døde 19 i alt. Indbyggernes i Nær værelsen vare blevene saa forfækkede, at de vilde samtlig have forladt Bygden, hvilken dog paa dette Sted er temmelig folkertig, fordi her falder jævnlig godt Fiskerie. Men da fornævnte Mennesker vare døde ganske friske, i det de ginge paa Marken, ved at de uformodentlig gave et stærkt Skrig fra dem, og bleve saa reent borte i det samme Dieblif, saa troede alle de andre, at dette var en kiendelig Straf, hvilken Gud havde tilladt en ond Aand at udfore. Dog lod de dem endelig overtale til at vie endnu den fjerde Winter, skiont ikke uden yderste Angest og daglig Frygt for en pludselig Død.

Men

Men denne Vinter døde ingen. Der er og ingen, siden den Tid; doet paa denne Maade; ligesom ingen har tilforn vidst af saadant Tilfælde at sige. Vi besaae dette Sted, om Sommeren 1755, og erfarede da, at det var de aabent overalt. Indvaanerne berettede os, at det var de fleste Tiider frit for Sne, som store Graane giærne ere; men at det var det samme, med anførte Tilfælde, enten der laae nogen Sne og Is over Grunden, eller ei. De lagde endnu 2de andre Omstændigheder til, nemlig først, at disse pludselige Dødsfælde skeede altid i de korteste og mørkeste Dage, ved Vinter-Solhvervet, men dog om lys Dag; og dernæst, at de fleste af de saaledes bortrykte vare af een Familie, blandt hvilke 4 Brødre og deres Born udgjorde det største Tall. To af disse Brødre ginge eengang sammen, da den een pludselig døde, og den anden fik dog ikke noget ondt. Alle de, som døde, vare ellers stikkelige Mennesker, og af stille Opsørsel, dog uden at man mærkede hos dem nogen Tungsindighed eller Melancholie.

Den anden Tildragelse er ikke mindre underlig, men dog af anden-Beskaffenhed. Om Sommeren 1754, paa Dreback, en Morgenstund, da der var en liden Blæst og klar Veir, dog Himlen noget skyet, kom en sort Skye, af Nord-Ost fra Siældene, færende paa skraas ned igiennem Luften til Drebacken og Handlingsstedet. Jo mere den nærmede sig, desto mindre blev den, og foer saa hastig frem, som en Falk, der, uden at bevæge Vingerne, skyder sig ned paa en Ryp. Skyen syntes rundagtig, og sloi derhen, hvor en Deel Mennesker, deels Fremmede, deels Indenlandske, stode sammen. Den strog dem forbi, og rerde ved Kindbeet paa en midaldrende Arbeidskarl, hvilken blev i det samme als deets affindig, og løb ud i Stranden. De fleste af de andre bleve

forbåufede; dog løbe nogle strax efter ham, og naåede til ham, forend han drufkede. Kort fagte han blev rasende, reent fra Gøstanden, og brugte allehaande forvænte Ord og Talemaader, faa at de, der vare om ham, maatte anvende alle deres Kræfter, for at holde ham, thi han vilde rive sig løs fra dem. De grebe derfor til, at fæbe ham et Stykke. Doi om Hovedet, lode ham derpaa fægge sig, og holdte faaledes paa ham, hyvred han, efter nogen Tid, begyndte at fagte sig, og efter et Par Dage rafede han ikke meer; dog kom han ikke ganske til sig selv, forend efter 14 Dage. En anden Beretning lægger til, at hverken han, eller de, der stod ham nærmest, faae Skyen, forend den kom, da det hvidfede lide i Luffen: men andre, der vare længer borte, faae og betragtede den i Farten. Den flot ned i Stranden, og forsvandt der. Ovennævnte Mark, fom Skyen traf paa, blev fort eller markeret og blaa paa Rinden, men denne Farve forsvandt efterhaanden, ligesom han kom sig. Enhver maa have fin Meening om disse Eilderægsler. De, der ere bevandrede i Historierne, og fiende Naturrens mangfoldige og adffillige Virkninger, finde ved Eyll Mage til disse; Ellers faa man faumentligne dem med det, fom er ffeet i disse Eilder paa Nordlandet, og anfort tilforn (§. 761. c).

Mærkværdigheder om Indvaanerne.

§. 906.

Den forste
Deboche.

En Deel fornemme Folk, meest Nordmænd, fattede sig af Begyndelsen ned paa Sønderlandet; dog vare to de fornemfte, nemlig Ingolf Ørnefon, Landets forste Indtager, fom fattede den allerforste Islandfke Boepæl i Reykjavik, og Retilbizen den Gamle, fra hvilken de to forste Islandfke Bifkopper, Islev og Giffur, med-

ftam

stammede. Denne Mand var saa riig paa Guld, at han vidste ikke, hvortil han skulde bruge det, og faldt derfor paa, at lade giøre en Toverbælle deraf, i den Afguds Tempel, som hans Søner byggede; han vilde saaledes offere Guderne dette Guld til en bestandig Eiendom. Sønerne, som vilde beholde det selv, satte sig derimod, men uden Nytte; thi den Gamle var paastraaende, og da han ikke maatte give Guderne denne Skat, faldt han paa, efter mange andre Hædningers Raade, at give den igien til Jorden, som de almindelig kaldede, og troede at være, Rikedommens Moder (see Edda). Han lagde altsaa Skatten paa en Stæde, og lod tvende Ørne slæbe den op paa Mosfjæld, et særskilt Biærg, kort fra Bruaræe, ved hvis Rod han havde sin Boepæl, som endnu er en Præstegaard og et Kirkested; her nedgravede han og skjulede den, saa den er ikke siden bleven funden.

§. 907.

Sonderlandet er, i Hensigt til sin Størrelse, og i Forhold ^{Folkemængden.} med Landets andre Fierdinger, det folkeriigste (§. 829). Saaledes havde det, sidst i det 11te Hundrede Aar, 1200 Bønder; hvorved alene meenes de fuldkonige og formuende; alle de andre, hvilke dog udgjorde et anseeligt Tall, bleve ikke regnede. Nu derimod regnes alle Boesiddende, med deres Huusfolk, enten de ere riige eller fattige, for Bønder; og saadanne 500 fandtes for 20 Aar siden, i de 8 Thinglave, som ere i Rangaarvalle-Eyffel, og 800 i de 12 i Larnæs-Eyffel. Naar man nu lægger hertil 700 Familier for Guldbring-Eyffel og Vestmannoe (§. 832.), og for Skofar-Eyffel 117: da faaer man, for den Tid, paa den Maade, som for er brugt (§. 516. og 760.), et efter Islands Omstændig- heder anseeligt Mandtall, nemlig henved 16000 Stæde. Men dette

er mærkelig blevet formindsket i de sidstafølgte 20 Aar, meest i de haarde Aaringer. De ved Heklasfældets Jidsprudninger edelagte Gaarde paa Kangaarvalle, de paa Thorsinark i Thiorsaars-Dal, eller andre deslige, have ikke gjort noget betydeligt til Folkemængdens Formindskelse sønder paa; thi dette Slags Odelæggelse er fuldkommelig erstattet ved de paa Søekanten tiltagende Fiskerleier, skiont det dog meer er skeet med de andre Fierdingers Skade, end formedelst Indvaanernes Formeereelse paa dette Sted (§. 760. d).

§. 908.

De fornemste
Steder.

De fornemste Steder, fra gamle Tider af, ere disse efterfølgende. a) Althinget. Vi have nævnt Næstevig, som den første, og i den Henseende fornemste Gaard paa Landet. Dens Stifter, Ingolf, og nogle af hans nærmeste Efterkommere, foreskøde Rætergangen her, og holdte et Althing eller almindeligt Ting paa Kialarnæs (§. 111.). Men siden er samme blevet fløttet til Thingvalle (§. 860.), hvor det endnu holdes. Øveraa deeler Althinget nuomstunder i to Deele. *Consistorium*, eller det geistlige Landemøde, er paa den østlige Side, og holdes der aartlig i Thingvalle-Kirke, dog ikkun for Skalhøls Stift, thi der for Nordstiftet holdes paa Flugemyre i Skagefiorden. Paa den vestlige Bredde af Aaen staaer Lavretten, nuomstunder opbygget af Tommer, ligesom og det Huus, som Amtmanden bruger, medens Althinget staaer, og hvor Overretten holdes. Lavretten er den meeste Tid bleven holdt under aaben Himmel, indtil 1690, da den blev opbygget paa samme Maade, som Althingets andre Voder, nemlig Tøsten eller Bæggene opførte af kantede Graunsteene, og Taget af Sparreværk, udvendig beklædt med hvidt Badmel. Af Forstningen stod Lavretten østen for Elven, men nu har den i nogle 100 Aar været

varer vesten for den, tilligemed alle de Bøder og Tæste, der hore til den verdslige Ret. Thorleivsholm i Öperaaen er det Sted, hvor Misdaedere rettes, og oppe i Almannegiaa, Norden for den flade Grund, staaer den steile Klippe, hvorfra de, der skulde brændes for Hæderie, bleve i forrige Tiider nedstyrtede i Baalet.

b) Bispstolen paa Skalholt, stiftet af den første Biskop, Islev, henvod 1056. Han var en Son af Gissur den Hvide, hvilken, tilligemed Hjalte Skeggesen, bragte det til Veie, at den christelige Religion blev paabuden ved en Lov, og antagen af Is- lænderne paa Althinget, Aar 1000. Den Noriske Konge, Duf Tryggveson, stiftede tilsidst disse 2 Mand til Landet, da al den store Umage, som han havde i Forveien gjort sig, for at fuldbringe dette Værk, var bleven næsten forgjæves. Men den Jordbrand, der opkom paa samme Tiid, og frembragte Thnraar-Hraun (§. 904), havde nær gjort deres Vrende til intet, just i det de stode og prædikede for deres Landsmand, da der kom et Vind med Tidende om samme; thi Hedningene antog Jordbranden for et Tegn paa Guder- nernes Vrede, over de Taler, som de Christne holdte. Det var altsaa desto større Lykke, at een iblandt dem selv, nemlig den for- ommældte Snorre Gode (§. 540.), som maaffee allerede havde fat- tet gode Tanker om denne nye Troe, fik stillet dem tilfreds med dette, saa korte, som sundriige Svar: paa hvem bleve vel Guder- ne vrede, den Tiid dette Hraun brændte, som vi staae paa? thi de vidste allesammen, at den Jordbrand var skeet for Landets Beboelse. Dette gjorde da, at Christendommen blev antagen, og Gissur Hvides egen Son endelig bestiftet til Biskop, 50 Aar der- efter, da hans Hovedgaard, Skalholt, blev gjort til et Bispesæde for det heele Land. Hans Son og Efterfølger, Biskop Gissur, satte

satte dog dette først fuldkommelig i Stand, fik ogsaa Indbyggerne overtalte til at vedtage hans Tiende-Lov, som haver siden staaet ved Magt lige til vore Tiider, hvorpaa han stienkede bort, fra Skalhøfts Bispestol, heele Nordlandet, for at oprette der et andet Bisppe-Sæde. Nordlandets Indbyggere begjærede dette, og den Hellige Johannes blev deres første Biskop (§. 759).

c) Vidgø har været et berømt Kloster indtil Reformationen, da det blev seculariseret. Det blev stiftet i Aaret 1226 af Biskop Magnus Gissersøn, og hans Broder, Thorvald, Fader til Gissur Jarl; og denne Thorvald blev siden Kanik sammesteds.

d) Bessetød, almindelig kaldet Kongens Gaard, og Amtsmændenes Sæde, har ogsaa været bekendt i forrige Tiider, fornemmelig deraf, at det har været den bekendte Nordiske Historie-Skriver, Snorre Sturlesens, Eiendom og Lystgaard. Kongens Befalingsmænd holdt der Huus i forrige Tiider, men kun om Sommeren, da de komme aarlig til Landet, og drog bort igien, med deres egne Skibe.

§. 909.

Allderdoms-
Levninger.

Alf Allderdoms-Levninger ville vi kun nævne: a) En Høi paa den fornævnte Holm i Ørøraa, tilhørende en af de største hedske Skialde i Norden, navnlig Thorlev JarlaSkald; man har fundet see nogen Levning deraf, indtil for kort Tid siden. Eiden har bortskyllet alt meer og meer deraf, dog har man fundet der nogle, skönt ifkun, lidet betydelige, Stykker af Jærn og Messing. Kong Oluf Tryggvessens Saga handler ellers om denne Mand's Bedrifter og Afgang.

b) Domkirken's Prydelser ere baade smukke og kostbare, især 2de meget gamle Alter-Tavler. Her forvares endnu en Bispestav, oven

oven til af Messing, stærk forgyldt, og en gammel Bispehue af Gyldenstykke. Her sees og endnu den Hellige Thorlafs Skrin. Det er den St. Thorlacus, som findes i Almanakerne; han var fød paa Sønderlandet, blev Biskop 1178 og døde 1193; hans Translation skeede 1198, og man har endnu hans Historie paa Islandst, oplydt med Jærtegn. Skrinet er bygget som et Huus, $\frac{3}{2}$ Is-landst Allen langt, $2\frac{1}{2}$ Al. høit, og $1\frac{1}{2}$ Al. bredt, overtrukket med sort bereedet Læder, og beslaget med emaillet Messing. Inde i Skrinet findes ingen Levninger, undtagne 2de brækkede Stykker, som siges at være af denne Helgens Hovedskall, og kunne paa en vis Maade tiene til Prove paa de forrige Tiders Begreber og Om-gang med Helgenes Levninger. Den Hellige Thorlafs Been vare tildeels fortærede, deels adspredte hist og her. Nogle af Aarbogers ne fortælle altsaa iblandt andet, nemlig til Biskop Wilschins Besømmelse, under Aaret 1406, i hvilket han døde, at han havde ei alene ladet denne Helgens Hoved beslaae med godt Sølvs, men og skaffet Helligdommen selv, at forstaae Hovedskallen, heel og ubru- den til Beie. Man seer og endnu rigtig nok, paa de 2de over-blevne Stykker, baade Sønkhullene, og de Indtrykninger, som Beslaget har gjort. Men hvor kunde nu dette skee, da Hovedet var ikke meere til? Jo! foranførte Levninger giøre Sagen begri-belig; thi de ere ikke andet, end en stor Loco-Motus. Dette Slags Rodder have været rare i Norden i de Tider, og maaſee ubekjendte for de fleeste. Almueen fik og ikke Lov til at undersøge, eller noie betragte Helgenes Levninger.

c) Et Crucifix paa Kaldabarnæs (S. 888.) var ved Refor-mationens Tid meget æret, tilbedet og berømt over heele Landet, for utallige Jærtegn. Det var kostelig klædt, med Skoe af Skjæl,

og behængt overalt med Guld- og Sølv-Stykker og andre Prydelser, som en efter anden havde foræret dertil. Gissur, den første Lutherske Biskop, tog dette Crucifix ned, forbød at tilbede det, og lod rive af Billedet af den Prydelse, der var paa. Almuen var misfornøiet hermed, og fik det saa uformærkt op igjen. Men Biskop Gisle Jonsen, da han fik at høre, at dette Slags Overtroe begyndte paa nye, reiste i Aaret 1587 til Kaldadernæs, tog Billedet ned igjen, og forde det med sig til Skalholt, hvor han lod det hugge i Stykker og opbrænde. Men da han ved samme Tid blev syg, og døde kort derefter, saa troede Almuen, at Billedet havde hævnnet sig paa ham. Af et gammelt Skialdedigt, som er gjort dette Billede til Vre, sees at det er blevet ført udenlands fra, og kjøbt i Einershavn paa Drebacken. Det siges endog at være hibragt fra Rom.

d) Gamle Vaaben. En Øre, eller Hellebard, viises paa Skalholt, og berettes at være Kemmeggia, som den Helt Skarphedin eiede. Nials-Saga taler om ham, og Aarbøgerne tilholde, at han skulde være død 1010; men nogle andre Omstændigheder viise, at det maae være skeet 1004. Øren er meget formindsket og bortrustet; Skafet er af Rodegran, $3\frac{1}{2}$ Alen langt, og beslaaget med Jærn. Paa Hlidarenda viises 2de Sværde og et Spyd. Ved Sværdene er intet besynderligt: de ere begge liige store og eensdannede, Rtingerne meget forrustede, 1 $\frac{1}{2}$ Alen lange og 2 Finger brede. Skafet er henved 1 Fod langt, og Haandfanger paa det eene belagt med Messing, men paa det andet overtrukket med Skind. 3 Stedet for Stikplade have de et fremboiet, 1 Finger tykt, Jærn med runde Knapper paa begge Ender. Spydet er dannet som en Landse; Skafet 2 $\frac{1}{2}$ Alen langt, af Rodegran, og
nedan

neden til beslaget med Jærn og giennemmaglet. Det skal være fundet i Rodefred, ved Roden af et liden Viærg, Dymon, nær ved Markerflod. Her skeede og et Slagsmaal henved Aar 1000, hvorom Nials-Saga mælder. En meget beskædiget Ringebrynie forvares ogsaa paa bemældte Sted: den er todobbelt, det er, bestaaende af to og to flade Jærnringe soiede i hverandre. Omkring Halsen er den eengang saa tyk, og ikke viidere, end at den kan passe en middelmaadig Karl uden over Klæderne.

c) GlutaSkaler eller LodSkale bleve brugte her i Norden, i de hedenste Tider: deri laae smaa Afguds-Billeder, hvoraf Eierne spaaede eller sogte at efterforske tilkommende Ting. Saadant et Par Skale, dog den eene noget beskædiget, bleve fundne ved Knævohole paa Rangaarvalle, fort fra Kiæde-Præstegaard, omtrent for 30 Aar siden, hvilke vi have faaet til Eie. De vare af stærkt forgyldt Messing, og dobbelte, med udpuffet giennemskaaet Arbeide. Paa Todret, som var støbt, sad et kiendeligt Aftryk af siint Været, og neder i Bunden var en breed Ring loddet fast, uden Tvil for at trække et Bænd der igiennem. Forbenævnte gamle Skrift, Nials-Saga (Cap. 57.), mælder, at Gunnar af Hlidarenda blev, henved Aar 990, eller lidt før, overfalden af 30 af hans Fiender, da han med hans tvende Brodre reisede forbi Knævohole. Den eene af disse blev ihjelslagen, og 14 af de andre. Det riimeligste er, at disse sidste ere blevene begravne her paa Stedet, thi det mældes aleene om Gunners Broder, at hans dode Legeblev fort derfra. Stedet, hvor Skalene fandtes, er en Hob af smæltede Smaasteene; der laae og nogle Menneſtebeene, som vare meget fortærede.

§. 910.

Havnene.

De Havne, som bruges nu, ere alle bekiendte, og temmelig sikke, undtagen Ørebacken, hvor Handels-Skibene ofte have forslidt; de have derfor, i de ældste Tider, søbet ind i Øresaaens Øs eller Udlob, men de vare den Gang ikke saa store, stikkede ei heller saa dybt i Vandet, som vore Tiders Skibe. Grunden er ogsaa der ubeständig, formedelst Elvens Strøm, og Brændingerne uden for; dog kunde der blive god Ankergrund, skiont ikke uden store Beføstninger. Thorslaks-Havn, kort herfra, er ogsaa bleven brugt i gamle Dage. Holsaaar-Øs, ved Desfældene, er en gammel Havn, hvor man endnu seer Tøstene af de Handelendes Huuse; men Grunden her er meget foranderlig. Seila kaldes en smuk Bugt og Havn tæt ved Besssted, hvor Besalingemandenes Skibe pleiede at ligge om Sommeren, i den Tid de drog over til Landet med deres egne Fartøier, ladede med alleslags Vare, som de lode sælge, hvilket var en Herlighed, som fulgte deres Bestilling. Bugten bliver næsten tør om Ebber, og giver gode Vintereis for middelmaadige og smaa Skibe.

§. 911.

Handelen,
især i den 15
Alder.

Foranførte, og flere Havne og Ankergrunde, bleve i forrige Tider besøgte af de Handelende, og da først af de Norske, senere Iskanderne selv, medens de eiede Skibe; og siden af de Tydske, og især, paa Sidstningen, af Hamburgerne. Engænderne begyndte at handle paa denne Kænt 1413, dog uden at have Tilladelse dertil; de holdte siden ved i lang Tid, og havde undertiden Frihed dertil, men undertiden tværtimod var Handelen dem reent for-

forbuden, formedelst en og anden Ufred, som de gjorde i Landet. Handelen var altsaa meget uvis ved de Tiider. Biskop Jon Gerricksen, og flere af de Catholske Biskoper, af hvilke nogle vare komne hid med Engelske Skibe, kiøbte Vare op, for at stifke dem indenlands, og dreve derved stærk Handel. En Hyrdstjrer, eller Statholder, ved Navn Vigfus Jversen, forlod sin Bestilling, og drog bort til Engeland med en stor Skat i Vare, Sølvs og andre Kostbarheder. Fiskeriet tog vel til i denne Alder; Landvæsenet derimod tog desto meere af; den store Pest var nyelig forbi, Agerdyrkeningen, og flere hoist nyttige Handteringer, bleve satte til Siide, og alle Ting vare i Uorden. Disse Uordenligheder holdte ved i lang Tiid, og omveledes idelig med andre nye. Hyrdstjerne, eller de øverste Befalingsmand, begyndte for Alvor at handle med deres egne Skibe, henved 1420. Bisperne, jo meere de toge til i Nligdom og Magt, jo verdsligere og modigere blede de. Det Exempel med Biskop Jon Gerricksen er mærkværdigt i den Islandiske Historie. Hans Broder havde, i Aaret 1433, friet sig gaves til en fornemme Jomfrue, hvorfor han først slog hendes Broder ihjel, og siden afbrændte Vaarden Kirkebol, paa Søndernæssene, tilligemed Folkene. Hun var dog saa lykkelig, at slippe ud, igiennem en Abning paa Taget, uden at nogen blev der var, hvorpaa hun gjorde det første, at tage den til Mand, enten han saa var ringe eller fornemme, som hævned hende paa Biskopen, der havde været den første Aarsag til den stærke Ulykke. Thorvard, Lopter den Nilles Son, fra Madrevælle i Desforden, tog sig dette paa. Han drog Aaret efter til Skalholt med bevæbnet Mandskab, og kom derhen, Aftenen for St. Thorlafs Dag, om Sønd-

meren. Den Tiid Messen begyndte, gik han ind i Kirken, tog Biskopen fra Alteret, og lod ham føre ud til Brueraa, binde ham en Steen om Halsen, og sænke ham der ned. Denne Gjerning blev aldrig straffet eller paataalt af nogen. Han lod ogsaa samme Tiid slaae ihjel Bispens Tienere, som vare 30 i Tallet, alle fremmede. De fleste af dem bleve dræbte i Domkirken. Paa sig Uorden søgte de første Oldenborgske Konger at raade Bod, især Kong Christian den 1ste, med den saakaldte Lange Netterbod, hvilken forbyder strengelig al Omstreifen, fiendtligt Overfald, Mandslag og Plyndren. Aar 1477 blev Befalingsmanden, Biørn Thorlefsen, ihjelslagen ved Bester-Jökelen af nogle Engælændere, som handlede der, hvorfor hans Frue, Dlov, lod sine Tienere opsøge Engælænderne hvor de fandt dem paa Landet, og slaae dem ihjel. 1490 foreskrev Befalingsmanden, Didrich Pinning, de Tydske, Engelske og Jslandske Handlende, visse Regler at gaae efter. Den grimme Pest, som 4 Aar derefter kom fra et fremmed Skib til Sønderlandet (§. 731.), anrettede en skrækkelig Odelæggelse. Jslanderne synes ellers hele Tiiden at have været ilde fornøiede med den Engelske Handel. 3 Aaret 1515 gavede de hæstige Klager ind for Kongen; men alt dette uagtede besøgte dog Engælænderne Jsland endnu i lang Tiid derefter. Alt dette begyndte først sønder paa, men Virkningerne deraf komme ogsaa til de læstligst bortliggende Herreder og Gierdinger.

§. 912.

Reformatio-
nen.

Reformationen begyndte først paa Sønderlandet, ligesom den Christelige Troe blev her først indført paa Landstædinger. Vi have nævnt, at Biskop Gissur satte Skalhøfts Bispestol og dens Ind-

Indkomster først i Stand. En anden Biskop Gissur begyndte ogsaa Reformationen paa Skalholt, i Aaret 1540. Han var en gudsfrygtig og lærd Mand, som havde stor Ansæelse; men han levede kun kort, og hans Efterfølger var Morten Einerssen, en sagsmodig Mand, som ogsaa havde gode Fortienester, endskiønt hans Ansæelse blev ikkun liden. Han var de Tiiders bedste Psalme-Skiald, hvilket hans Messe-Sange vidne om. Den bekiendte Biskop, Jon Aresen, tænkte at indlægge sig Ere, ved at modstaae Reformationen; dog turde han ikke yttre sig dermed, førend Biskop Gissur var død. Jon Aresen var ulærd, havde dog gode Gaver, var munter, omgængelig, og en god Poet. I den Uroelighed, som han opvakte, viiste han meer Mod end Forstand, og hans Eresyge og Hidsigthed drev ham til en usforsvarlig Opsætsighed, hvilket dog ikke var hans Hoved-Hensigt. Han tænkte, at Nidkærhed for Troen skulde vinde Seier, og forsvare ham, men begge Deelene sloge ham feil. Bemærkede Biskops Afgang, og andre mærkværdige Tildragelser, angaaende Reformationen i Island, ere alt blevene bekiendte af det Værk, Hans Høiærværdighed Hr. Biskop Zarboe har forfattet om samme. Oluf Hjaltesen blev derv paa Biskop paa Holum, og begyndte Reformationen i Nordens Stiftet. Endeel berømte Mænd hiulpe til at bringe dette gudelige Værk i Stand. Den Kongelige Besalingsmand, Poul Stigsen, var særdeles omhyggelig derfor. Han gav mange nyttige Besalinger ud, dels til den sande Troes Udbreedelse, dels angaaende Skolerne og heele Landets Velstand. Oddur, Biskop Gottskalkes Son fra Holum, en gudsfrygtig og vellærd Mand, hialp ikke lidet til Reformationen ved at oversætte det Nye Testamente, og flere gudelige Bøger, paa godt Islandsk. Af Frygt for Biskop

Dg

Øgmund, med hvilken han var reist til Jsland, tørde han ikke lade see det Nye Testamente, som han havde hos sig, og endnu mindre lade nogen vide, at han vilde oversætte det, undtagen Gissur og Gisle, som siden bleve Biskopper, og begge to vare i Raad med ham. Under andet Paaskud gjorde han sig en siden Indretning i Koestalden paa Skalholt, og der oversatte han Matthæi Evangelium. Biskop Gudbrand gjorde sit Fædreneland den største Tjeneste, i det han indforde og satte i Stand et Bogtrykkerie i Jsland, samt oversatte Bibelen og mange andre aandelige Bøger. Til den Ende arbejdede han heele Tiden. De Billeder og største Bogstaver, der sees i Bibelens første Udgave, gjorde han, og udskar Formerne dertil med egen Haand. Den foromtalte Svenske Præst (§. 761. c) havde dog i Forveien trykt nogle nyttige Bøger. Brynjolf Svendsen, Biskop paa Skalholt, var den som efter Reformationen gjorde sig den største Umage for at indføre Skik og Orden iblandt Geistligheden, baade i Nettergang og andet. Han var en hoilærd viis Mand, og stor Elsker af Fædrenelandet og den almindelige Belskærd. Hans daglige Levemaade var et stort Bevlis derpaa.

§. 913.

De nye Indretninger.

De nye Indretninger i Kjøpeliig fortjene Sted blandt Sonderlandets største Mærkværdigheder (§. 880). Vor allernaadigste Konge har, siden 1752, givet et Selskab af Indvaanerne i Jsland adskillige herlige Privilegier, for at istandsætte sammensteds Klæde- og Tøi-Fabriker, med andre for Landet nyttige Haandværker og Indretninger. Hans Kongelige Majestæt haver ogsaa efterhaanden skænket dette Selskab anseelige Penge-Summer

mær og Materialer, til at opnaae denne ret Kongelige og Høiſtsfaderlige Henſigt, nemlig Folkets Opkomſt, ſom ſea dets forrige Velſtand er meer og meer aftaget, og ſunket ned i Armod og Elendighed. Foruden tvende Fiſker-Hufferter, gav Hans Majestæt ogſaa Gaarden Reſkeviig, til at anlægge derpaa de bemældte Indretninger. Denne Kongelige Gævmildhed er uden Exempel i Iſland. Det er truſſet artig ind, at Vallet ſaldt paa Reſkeviig, uden at nogen tænkte derpaa, da denne er den allerældſte Gaard i Iſland, og den forſte Landname-Mands forſt indtagne Eiendom. Man ſeer her endnu Toſten af hans Skibshuus, ſom kaldes af de Nærboende Ingolfs-Neſt. Til Selskabet horer videre Svovel-Raffinaderiet ved Myvand, og i Krifeviig, ſamt Farver-Huuet og Stampe-Møllen ved Helleaaerne, o. ſ. ſ. At beſkrive diſſe Indretninger videre, kan for denne Gang lidet nytte. Det vilde blive for vidtloſtigt. Sagen er bekendt, og Tingene ere endnu ikke komne til den ventelige Modenhed.

§. 914.

Saaledes er da denne Iſlandſke Reife lykkelig bragt til Ende. Beslutning. Adskillige Udſarter, mangfoldige Omſtændigheder ved Reifeſen, frugtesløſe Foretagender, ſamt endel Forſøge, ſom ikke havde den onſtelige Virkning, ere her med Glid blevne udeladte, og ſolgelig vel Halvparten af de forſte Reifebeſkrivelſer. Men i dets Sted er tillagt ligesaa meget af allehaande nyttige og vigtige Underretninger, nye Aſgpaagivelſer og Anmærkninger, om Landets og Indbyggernes Tilſtand og Beſkaſſenhed, ſaavel i de ældre ſom nyere Tider; om Huusholdningen overhovedet; om Landvæſenet, Fiſkeriet, og meget andet. Man haaber, at dette bliver behageligt

ligt for alle fornuftige, lærde og indseende Læsere / fornemmelig
for vor allernaadigste Konges Undersaatter, som oprigtigen elske
det almindelige Beste, / og især for dem, som enten beboe, eller
have at bestille med dette hidindtil saa lidet, dog mangesteds urig-
tig bekjendte Land.



Register.

A.

Aahver, pag. 112.
 Aal, 595. 839. 900. 991.
 Aav, 595.
 i varme Bæde, 900.
 Aalka, 355. 562.
 Aamu:Madkur, 220. 711.
 Aander, heboe vde Steder, 239. 278.
 479. 834.
 Kirkegaarde, 479.
 Aaredal, Reise bidshen, 87.
 Aaringer, haarde, 644. 701. 800.
 Aarnes:Syffel, 850.
 Aarnes, 856. 874.
 Aas, i Skatedal, 739.
 Aas, 237. 259. 925.
 Aaskov, 689.
 Abies marina, 447.
 Achillaa, 491. 673. 815.
 Acus, en Sæf, 995.
 Actinia, corpore molli, 1002. 1003.
 Aida, en Etikel, 70. 1010. 1019.
 Aidalviif, 514.

Aderfuglen, pag. 63. 222. 355. 548.
 550. 553. 555. 705. 982.
 Ader:Quatt, 550. 553.
 Aeg, 550.
 Ainger, 552. 553.
 Ader:Øer, 222. 377. 482. 523. 873.
 Adev, 378.
 Aeg, deres Samling, 482. 551. 563.
 Behandling, 484.
 AeggeFager, 484.
 Aeggebravle, 484. 597.
 Aeg:Tiiden, 486.
 Aeg, hvormange lagges, 485.
 Aegopodium, en Uet, 430.
 Aender, tamme, 59.
 Aender, vilde, 63. 222.
 Aaafolle:Ønd, 549.
 Gul:Ønd, 550.
 Haavella, 549.
 Hrafn Ønd, 549.
 Oef:Ønd, 550. 986.
 Straum:Ønd, 549.
 Top:Ønd, 550.
 Ørt, 549.

Register.

Uerter, vilde, 496.
 Uerupris, 431.
 Uetefonge, 970.
 Uetefjill, 18.
 Uetehøvn, 158. 320.
 Uetethang, 447. 680.
 Uetefveppur, 674.
 Uerier, 424. 803.
 maritus, 425.
 multiplex, 804.
 Uffalder, et District, 856.
 Ufguds-Tempel, paa Skialarnas, 74.
 paa Høstfad, 260. 364.
 paa Hof i Midfjord, 736.
 paa Hof i Gøddale, 736. v. Hof.
 Ufretto-Hælleder og Hælde, 200. 745.
 Om gang dermed, 201.
 Ugater, 658.
 forte, 84. 92. 135. 136. 291. 314.
 405. 419. 420. 422. 810. 933.
 nagle, 92.
 hvide og røde, 399.
 hvide, 933.
 blaaflige, 399.
 figurette, 403.
 Ugatens forments Egeufaber, 422.
 Agarius, caulescens, pileo albo, 674.
 — — — — — supra plano, 674.
 — — — — — subconvexo, 674.
 Ugerbrug, i Island, 238. 370. 615.
 680. 947.
 nye Fortøje dermed, 947. 681. 956.
 hvorfør disse ei lyffedes, 958. v. Kornfæd.

Ugerfø, 266. 376. 854.
 Ugerfø, paa Øilandet, 750.
 Aira odorifera, 431.
 Ufrar, 235.
 Ufranco, 80. 82.
 Ufrassill, 81. 82. 130.
 Ufrahverar, 891.
 Alauda, 582.
 Alchimilla, 791.
 — — Alpina, 18. 20.
 Uffer, 513. 562. 566.
 Alca, roftro pftacci, fulcis roftri 4, 223.
 355. 559.
 vulgaris, 355.
 fulco roftri unico, 355. 562.
 roftro acuminato, 355. 562.
 roftro breviori, 355. 562.
 roftri fulcis octo, 482. 750.
 roftri fulcis quatuor, 562.
 elis minimis, 855. 983.
 Alderdoms Leevninger, 245. 616. 733.
 i Hitarðals Kirke, 258.
 i Trollatunge Kirke, 492.
 i Veffhordene, 616.
 paa Norðlandet, 734. 735.
 paa Øierlandet, 847.
 paa Sønderlandet, 1032.
 Uffa: Vafir, 98.
 Uffeyda: Skier, 778.
 Alga, vitriaciorum, 441.
 Saceharifera, 444. 858. 941. 942.
 aromatica, 446.
 Almanningar, 505. 514.

Alman

Register.

- Almannestad, 747.
 Almannastiot, 845.
 Almannegiaa, 881. 928.
 Alptanes, 219.
 Alptanes-Epiat, 81. 222.
 Alptastierde, 370.
 Alptastierd paa Øilandet, 747.
 Alpteviiger, 746.
 Alptever, 748. 774.
 Alptenea paa Sønderlandet, 853. 975.
 Alstinger paa Øiland, 1030. v. Landeting.
 Alun, 893. 898. 934.
 Naama, 664. 724.
 i cubiske Crystaller, 724.
 Aluta montana, 658.
 Ammodytis, en Høf, 587.
 Ampelitis, 721. 423. 670. 671.
 Amygdala marina, 1003.
 Anarrichask, 427. 591.
 non maculatus, 594.
 minor maculis nigris, 592.
 Anas, {frosta cylindrico, } Det, 222. 355.
 {plumis mollissimis, }
 collo nigricante, collari albo, 548.
 fera o. Balchas, 549.
 cristata, nigræ, 549.
 coda acuta cuneiformi, o. Anas Is-
 landica, 549.
 minima, macula alarum nigra, 549.
 crista gemina flava, 550. 986.
 Andekpi, 80.
 Andafilsaa, 104.
 Andridose, 2.

- Angelica, Archangelica, 320. 429. 431.
 502. 503. 676. 677.
 Imperatoria, 429.
 maxima, 495. 939.
 Anguilla, 594. 991.
 Anser, vulgaris ferus, 222.
 bassanus, 224.
 griseus ferus, 548.
 griseus, capite colloque nigris, 549.
 bassano congener, 556.
 Anhyllis, vulgerrisq, 940. 190.
 Apavatn, 871.
 Aphrodita, Hemisphærico-ovalis, 1003.
 — — corpore cylindrico, 1004.
 Arbeide, Dagle, for en Karl, 35. 308. 336.
 for en Pige, 35. 336.
 Arbeide, for Mandssolk, 335. 455. 481.
 for Kvindssolk, 335. 481. 482.
 Arbeide, almindelig, 693. 970.
 om Vinteren, 32. 180. 335. 455. 456.
 om Foraaret, 32. 181. 335.
 om Høsten, 35. 183.
 om Sommeren, 183. 335.
 Arbeids-Løn, 35. 36. 37. 183. 336.
 694. 971.
 alt for stor skælsig, 38. 971.
 Arbeidsfolk, Opnuvring for dem, 38.
 hvormeget gode i Værtiden, 329.
 hvormeget ellev, 329.
 selvaadige, 456.
 Mangel derpaa, 693. 694.
 Arbeide i Trøvarer, 500. 833.
 Kunst, 38. 698. 832. 976.
 Arbutus,

Register.

Arbutus, Laccis rubris, 170. 322.

uva Urli, 724.

Ardea, cristæ dependente, 356.

Arenaria, 677.

Argentina, 946.

Argilla, 125. 127.

maris cærulea, 268.

communis Plastica, 392.

apysa, 125.

vulgaris, 125.

Arnarfjord, 374. 378. 385.

Arnarstape, 272.

Arnarstapa-Ombud, 273. 365.

Arnarvatn, 107.

Arnarvatns-Geyde, 80. 81. 220. 621.
631.

Arnardal, 745.

Arnarfjall, 745.

Arnsø, 266.

Arundo, foliorum lateribus convolutis, 236.

681.

o: *Arenaria*, 321. 370. 431. 673.

v. Mesur.

Aste af Albbierge, 309. 842.

Asterias, 612.

ophiura, 715.

stellatus, radiis 5 aculeatis, 1005.

— — — non aculeatis, 1005.

radiis 5 tenuissimis, 1005.

stellatus, radiis 9, 1005.

Augnsfvo, en lrt, 433.

Aur, en Jordart, 682.

Auride, Ørret, 595.

Aurridavatn, 792. v. Ørret.

Azalia, procumbens, 940.

B.

Baade, i Island, p. 66. 274. 339. 508.

698. 971.

Gammelbøge, 67.

Baade, deres Indretning, 67. 343. 509.

deres Optækning paa Land, 973.

deres Svagbed, 342. 500.

Bemanding, 509. 510. 971.

Burdinge, 508. 509.

Batteringer, 971.

Befælinger, 975.

Feinælinger, 971.

Tomandefar, 975.

Fiograsar, 66.

Baadsende, 852. o: Baadesand, 853.

Baardardal, 753.

Baardar-Gællir, 76.

Baardr Enafells-Haas, 76. 258. 367.

Baarustel, 665. 1010.

Baegildinger, 889.

Badstuehver, 640.

Bade, varme, 5. 109. 382. 385. 639.

640. 798. 882. 888. 899.

deres Dytte, 115.

deres Indretning, 116.

indviøde, 385.

i Havet, 386.

torre, 724.

St. Mortens Bad, 888.

Bad:

Register.

- Badstofuhver, 891.
 Baarsfofn, 80.
 Bække bleve til Gloder, 844.
 Bær, Mytningar, 170. 322.
 Blau, 170. 171. 322. 436.
 Krefte, 171. 322. 436.
 Cene, 322. 436.
 Hrutar, 322.
 Jorde, 675.
 Baggashutar, 803.
 Bakkeshord, 744.
 Bald-Jøkul, 95. 629. 627. 752. 776.
 860.
Balanus, litoralis, 937.
Balana, dorsæ impenni, 541. 3. Grönlan-
 dica.
 rubere pinniformi, 541.
 ventre plicato, 542.
 maxima, ventre plicato, 442.
 media, ventre plicato, 542.
 minima, rostro acutissimo, 543.
 Balsens-Braa, en Uet, 433.
 Balsaneo, 621. 693.
 Bardestrand-Syssel, 374. 375. 428. 437.
 Bard, 505.
 Bardeviik, 504.
 Barkning, hvad dertil bruges, 165. 173.
 337.
 Barnahlid, 414.
 Barnaborg, 315.
 Barnamølle, 125.
 Barnamose, 175.
 Barfsa, alpina, 433. 815.
 Basalter, 395. 653. 736.
 jordsinner-arbe, 810.
 Baula, et Viarg, 81. 83. 138.
 Bausustein, 138. 139.
 dens Mytte, 140.
 Baulaarvatin, 294.
 Bauluhellir, 658.
 Been album, 19.
 Beenrad, gammelt, 740.
 Beina-String, 826.
 Beinvider, 172.
 Beitumadkur, 715.
 Beitelyng, 940. 941.
 Beitufongur, 1012.
Bellone, en Giff, 995.
 Beredning, Skinde og Ladere, 44. 337. 339.
 Beresford, 747.
 Bergaarsfiall, 810.
 Bergbue, 1009.
 Bergvand, 117.
 Bergfok, 658.
 Beria-Arve, 677.
Bernicla, en Fugl, 64. 549.
 Berserkiathraun, 367.
 Bernviik, 276.
 Bessetted, 261. 853. 1032.
 Bessetteda Poster, 37.
Betula, erecta, 167.
 procumbens, 167. 233. 320.
 nana, 167. 320.
 Biargfuglen, 513. 562. 566. 568. 625.
 855. 982.
 dens Sangst, 563.

Biarnar:

Register.

- Biarnathasn, 371.
 Biarnathellir, 237.
 Biarneyar, 377.
 Biarney, 749.
 Biarnefsfordaa, 381.
 Biarnatfiord, 502.
 Biarneflag, 725.
 Bierge, iidsprubende, ved Myvatn, 725. 727.
 deres Virkning, 808.
 deres Product, 809. v. Iidsprubnin-
 ger.
 Bierge, sette, 3.
 rede, 3.
 hvilde, 3. 12. 83. 806.
 gamle, 3. 397. 398. 924.
 nye, 3. 397.
 ved Jordskifte, 760.
 ordentlige, 3. 82. 83. 131. 270. 379.
 396.
 uordentlige, 3. 82. 86. 267. 292. 626.
 Biargenes Dannelse, 3. 82. 83. 85. 91.
 130. 267. 379.
 Forfættelighed, 3. 11.
 Hvide, 4. 82. 85. 91. 267. 268. 288.
 289. 380. 628. 867.
 Materie, 11. 12. 82. 84. 89. 267.
 286. 289. 418.
 Lage, 131. 267. 270. 289. 397. 397.
 417. 727.
 Etager, 727. 855.
 Bierge, trække Damp til sig, 285. 867.
 ere seilere mod Sønden, 379.
 Biargfald, forferdeligt, 498. v. Fjeldfæled.
- Biargfald, af Fugle, 569.
 Bibelen, paa Islandsk, 1039.
 Bilsøse, 266.
 Bilsedals-Havn, 390.
 Billeder, af Kobber, 616.
 Birke, 511.
 Birkebov, 88. 166. 168. 320. 361. 408.
 435. 613. 733. 1021.
 Birkeetrær, deres Mytte, 167. 233. 435.
 endeel store, 1021.
 Bispestol, paa Holum, 735.
 paa Skalholt, 1031.
 Bispetunger, en Bygd, 851.
 Bistorta (Polygonum), 677.
 Bitra, en Viig, 373.
 Bigrne, de Grønlandske, 519. 837. 980.
 Blaabar, 170.
 Myra, 322.
 Abak, 171. 322.
 Blaafæll, 861.
 Blaafælls-Besul, 95.
 Blangryte, 313. 654.
 Blaatuffe, en Ur, 429. 618. 814.
 940.
 Blaamor, 607.
 Blaafogsa, 72.
 Blaafogseide, 103.
 Blanda, en Drif, 31. 180. 692.
 Blanda, en Bog, 43.
 Blanda, en Elv, 630.
 der en Havn, 741.
 Blennius, 559.
 maculis 10 & ultra, nigris, 588.
 Blaf,

Register.

Blæk, hvad dertil bruges, 173.
 til Pergament, 198.
 Forsøg at gløse, 724.
 Bleika, en Jordart, 393.
 Bleika, en Fisk, 595.
 Bleikula, 674.
 Blodberg, en Urt, 944.
 Blodsteen, 425.
 Blodslug, 611.
 Blod, i Havet, 732. 846.
 Blot o: Offringer, 468.
 Blotstein, 365. 736.
 Blot, Disa, 468.
 Blsa, 468.
 Blødfisk: Stoppe, 330.
 Bløddyr: Skene, et Insect, 1000.
 Bobbe, en Skiel, 70. 1012.
 Boemærker, 202.
 Bogtrykkerie, paa Island, 739. 1040.
 Bogstaver, Rime, 255. 274.
 ufiendelige, 257.
 Hæse, 257. 274.
 Boli, 889. 897. 898. 915. 917.
 Bolus insipidus, 652.
 thermarum varius, 652.
 thermarum, 111. 126. 129. 177.
 639. 651.
 violaceus, 126. 127.
 cæruleus, 127.
 albo-cæruleus, 650.
 variegatus, 127. 128. 650.
 brunneus, 129.
 brunneus tenacissimus, 650.

albus, 128. 139. 310.
 carneo-albus, 291.
 lucide-carneo colore, 650.
 Dolungaviik, 504.
 Bombyliur, et Insect, 603.
 Borg, paa Myrar, 260.
 i Bildebal, 736.
 Borgarfjorð, 78. 79. 81.
 Borgarfjorðs: Syssel, det's Deeling, 78. 80.
 det's Strækning, 79.
 det's Størrelse, 80.
 Strande og Øer, 81.
 Værge, 81.
 Floder og Søer, 103.
 varme Vandsspringe og Bæde, 108.
 Bærligt, 118.
 Jordarter, 122.
 Steenarter, 130.
 Draumstrækninger, 133.
 Mineralier, 146.
 Fosfiliier, 150.
 Frugtbarhed, 154. 426.
 Urter især, 164.
 Skove, 166. 232.
 Indvaanere, 175.
 Bygninger, 177.
 Episke, 179.
 Arbeide, 180.
 Øer, 187.
 Fugle, 220.
 Fiske og Fiskerie, 228.
 Havne, 262.
 Borgareyar, 81.

Register.

Dorgarey, 378.
 Dorgarfiord, paa Hjerlandet, 745.
 Dorgarhraun, 362.
 Dordepre, 617.
 Dotn, en Dal, 72.
 Dotnsaa, 79. 103.
 Dorryis, Blodsteen, 425.
 Draaf, et Riedskab, 339.
 Drændsef, i Island, 331. 332. 434. 441.
 442. 459. 481. 625. 693. 826.
 968.
 Drændenelle, 429.
 den store, 435.
 Brandfod, en Rist, 596.
 Brathals, 768.
 Brathals-Quist, 768.
 Braunngraus, 166.
 Brantartholt, 4. 72.
 Breccia, 655. 659. 725. 777. 861. 926.
 constans lapidum fragmentis, 316.
 405.
 griseo czulena, 316.
 nigricans, 316.
 Breddalsbugt, 747. 848.
 Breddeford, 373. 375.
 dens Her, 376. 481. 631.
 Breydeviik, 746.
 Bredemark, 784. 840.
 Bredemarks-Sand, 748. 784.
 Bredemarks-Jøkul, 751. 786. 787.
 Breidaa, 786.
 Breddebolstad-Gjæld, 750.
 Brestu-Enigill, 715.

Breme-Solej, 18.
 Brenta, 548.
 Briamones, 648.
 Brimbutur, 1004.
 Broddamuns, 589. 710.
 Broddenes, 378.
 Broe, over Jøfelsaa, 792.
 Broer, almindelige sordum, 793.
 Brokke, 266.
 Bruataa, 874.
 Brunavik, 746.
 Brunella, 946.
 Brunnisvaller, 732.
 Brunnfluka, 600. 712.
 Bruuse, en Jøgl, 556.
 Brygde, 988.
 dens Gangst, 989.
 Brynesteen, 928.
 Brynjedal, 72.
 Brynjedalsaa, 103.
 Brynjolf, Svendsen, 262. 859.
 Bryslisje, 176. 821.
 Bryd, Glade: Cuurbrød, 179.
 af Kornsur, 432.
 Bualaug, paa Island, 15.
 Budahraun, 271. 320.
 Budaflettur, 271.
 Bundenstad, 371.
 Bulandshøfde, et Viarg, 269.
 Bulteflade, 211.
 Burene, 816.
 Burt, 320. 678. 19.
 Bordinger, 508.

Dyg.

Register.

Bygden, dens Brede, 503. 621.
 Aftagelse, 737.
 Bygde, tilføi beboede, 678. 738. 765.
 deres Odelsagelse, 760. 781. 784. 786.
 840. 862.
 Bygninger, paa Sønderlandet, 22. 965.
 i Borgarfjords-Eyfel, 177.
 i Sneefjeldenes, 326.
 i Vestfjordene, 453.
 paa Nordlandet, 690.
 paa Østlandet, 824.
 Bygning: Materialier, 35. 453. 690. 926.
 965.
 Maade, 326. 500. 825.
 Bygninger, aldgamle, 825.
 flette paa Sønderlandet ved Søefanten,
 965.
 der flere smukke, end andesteds, 965.
 Bøger, oversatte, 449.
 om Chiromantie og Astrofantie it. 467.
 Børn: Afte, 124.
 Børn, deres Opaming, 451.
 Sygdomme, 450. 961.
 Død, 451. 452.

G.

Calendarier, 40.
 Caltra, palustris, 18.
 Campanula, rotundifolia, 429.
 potula, 688. 814. 540.
 Cancelli, Eremitici, 223.
 Cancer, Bernhardus, 232.

Cancer, Araneus, 996.
 Diogenes, 997.
 Macrourus, rostro lateribus denta-
 to, 997.
 Macrourus, thorace aculeato, 998

Lap de Nord, 374. 378. 513.
 Carbo, aquaticus, 555.
 Carcharias, vulgaris, 359.
 Carex, 18.
 Cardia Veneres, 665. 1010.
 Cardia, striata, 665.
 Carduus, Heterophyllus, 679.
 Carum, 814. 940.
 Cataphractus, en Hest, 589.
 Catarrhactes, en Fugl, 838.
 Catarrhæber, 176.
 Centrina, 598.
 Centaurium, minus, 673.
 Chalcedonii, 403. 658.
 semi-pellucidus, 656.
 Charadrius, variegatus, pectore nigro, 580.
 variegatus, pectore macula ni-
 gro, 581.
 variegatus minimus, collari ni-
 gro, 581.
 Chimæra, monstrosa, 360. 598.
 Christine Religion, paa Høland, 1031.
 Clupea, lata quadruncialis, 224. 587.
 villosa foetens, 224.
 vulgaris maxima, Eild, 358.
 longa, arenaria, 549.
 longa tenuis, argentea, 587.
 linea laterali villosa, 695.

Calym-

Register.

Colymbus, dorso nigro, maculis albis, Him-
brynæ, 710.

collo antice ferrugineo, Lemnæ,
710.

Concha Bivalves, 1019.

ventrosa, crassa, 153. 69. 410.

pecten auritus, 153. 232. 1010.

oblonga, 69.

Pholas, testa oblique truncata,
1009.

Mya,

testa ovata truncata, 1009.

testa ovata membr., 1009.

Ostrea,

edulis, vulgaris, 1010.

testa orbiculari, aurita, 1010.

testa pectinata, 1010.

Anomia,

orbiculata, 1010.

testa piriformi, 1010.

Mytilus,

testa oblonga, 1010. 1019.

testa ovato-oblonga, 1010.

Cardia,

testa cordata, 1010.

testa ovata, 1011.

testa ovata tenera, 1011.

testa ovata minus convexa,
1011.

Concha Multivalves,

Chiton punctatus, 1008.

Lepas,

testa cylindrica, 1008.

testa ovato hexagona, 1008.

concha anatifera, 1009.

Concha Univalves, 1014.

Buccinum, 1019.

testa oblonga, spiris 7 : 8,
1011.

testa oblonga candida, 1012.

testa ovata, acuta, 1012.

testa ovata, acuta ærulea,
1012.

Murex, 1012.

Dolium, 1012. 1019.

Trochus, 1013.

Nerita, 1015. 1020.

Patella, 1018.

Turbo, 1014. 1020.

Dentalium, 1017.

Serpula, 1013.

Cylindrus, 1019.

Cochlearia, 19. 321. 483. 625. 673. 677.
rotundifolia, 429. 815.

Cochlea, 70.

acuminata &c. 70.

Columba, Grönländica, 482. 557. 558.

Columbarius, Plautus, 558.

Colymbus, minimus, Teiste, 356. 557.

maximus, pectore albo, 556.

cineus, pectore albo, 557.

niger, pedibus sanguineis, 557.

pectore ferrugineo, 586.

Comarum, palustre, 18.

Compasset, ufsadigt paa Tiebiørge, 282.
283.

Con

Register.

Conchyliet, 1007.
 mangskallede, 1008.
 Treffkallede, 1009. v. Conchæ.
 Conchyliet, i Jorden, 126. 153. 410.
 665. 936.
 i Etene og Klipper, 411. 926.
Concreta thermarum, 112. 144. 289. 667.
 806. 885.
 tophacea, 289.
Conserua, palustris, 441.
Corallina, pennata, 447.
Corallina, officinarum, 446.
Coralloides, nigricans, 162. 676.
Cottus, Alepidorus, 359.
 corpore octogono, 589.
Cremor thermarum, 109.
Creta, Skide-Arter, 124.
 Truncifir, paa Kaldadernes, 1033.
 Crystaller, i Stiel, 666.
 Crystaller, Spat- og Kvartz, 84. 313.
 398. 399. 657. 658.
 Berg, 314. 657.
 i Bolis, 650.
Crystallus, litoralis, 399.
 disdiaclastica, 400. 804.
Cuculains, aculis, 19. 433. 815.
Cycloprerus, en Gist, 227. 486. 588.
 Lumpus, 359.
Cyprinus, pelagicus, 359.

D.

Dagmaal, 40. 41.
 Dagmærker, 40.

Højst dermed, 41.
 Daglaatta, 33.
 Dale-Spyss, 373 375. 426.
 det's Tingslave og Eogne, 375.
 Strande og Her, 375.
 Egne, 381. 426.
 Arter, 429.
 Indbyggere, 447.
 Daletaa, 621.
 Deilderdals-Jøkul, 622.
Delphinus, minimus rostro protracto, 544.
 — — maximus pinna in dorso, 544.
Dendrotyolibi, 290.
 Desey, 154.
 Diamant, Jelandh, 314. 398.
 Dilaskarf, 482. v. Skarf.
 Dillkar, smaa Giarder, 206.
 Diupaa, 775.
 Diupadalskraun, 930.
 Diupalon, 275.
 Dobbelsstein, 400. 804.
 Dordingul, 609. 712.
 Draapehlid-Sjæld, 268. 289. 292.
 Draapstær, 388.
 Draffe, rød, en Diet, 26.
 Drange, 378.
 Drange-Jøkul, 380. 503. 504. 516.
 Dranger, paa Hornstrandene, 497.
 Drangeviik, 457.
 Drangey, 623. 706.
 Draugur, 471.
 Draugasteinar, 398.
 Driffe, forðum, 692.

Her rrr 3

Driffe,

Register.

Drifke, hvad nu dertil bruges, 31. 157.

171. 180. 304. 333. 433. 436.

438. 625.

for spæde Børn, 334.

Drifke Vand, 5. 117. 294. 304. 625.

642. 798. 960.

Drifkehjørn, 52.

Dristliar, 364.

Dritolif, 274.

Drivehvale, 505. 519. 705.

Drivetsommer, 491. 496. 487. 502. 504.

505. 510. 514. 519. 690. 699.

824. 972.

Øjelsked dermed, 501.

dets Alter, 511.

hvorfra det kommer, 512.

Drunnesia, 355. 562.

Dryctiarthals, 926.

Dryppsteene, i Erttshellir, 242. 246. 659.

andre, 932.

Dryas, octopetala, 433. 949.

Duun, af Eder, 550. 553. 554.

Thang, 553.

Græs, 553.

dens Behandling, 553. 554.

Dverga-Soleyg, 433.

Dybevaag, 747.

Dymon-Klaffet, 376.

Dyndart, fort, 309.

Dyrtholar, 751. 849.

Dyr, et besynderligt, 716.

Dyrtilid, af Havn-Bisen, 518. v. Lis, den

Grønlandske.

Æ.

Æbbe og Flod, 42.

Æhenum, Fossile, 412.

Æchenis, cauda bifurca, 994.

Æchinus, efculentus, 612. 716.

ovato gibbosus, 612.

maris, 717.

Æenetræer, 436. 940.

Æinebær, 678.

spisest, 941.

Æfferøey, 854.

Æggiaberg, 655.

Æguens Beskaffenhed, ved Grotland, 88. 92.

i Kiosar-Syssel, 4.

paa Nordlandet, 627.

om Myvatn, 718.

paa Østlandet, 743.

paa Sønderlandet, 852.

om Hekla, 862.

Ægn, fordrevet af Katlegiaa, 772.

af andre Fjeldbærge, 840.

af Hekla, 862.

Æinhyrninger, 772.

Æirefs-Jøkul, 95. 860.

Æitleberg, 926.

Ælbborg, 362.

dens Sterrelse, 363.

Ældey, 855.

Ældeyar-Drangur, 855.

Ældtinna, 399.

Ælinarholm, 623.

Ællidse, 266.

Æling,

Register.

Ætling, Equisetum, 17. 155. 319. 427.

Æto, under Jorden, 106. 876.

i en Hule, 240.

Empetrum, baccis nigris, 171. 322. 683.
940.

Ængellander, deres Handel i Island, 371.
372. 1036.

Ængenes, 497.

Ængey, 854. 975.

Ænnet, et Viarq, 268.

Epilobium, angustifolium, 166.

latifolium, 429.

palustre, 432. 814.

tetragonum, 432.

Alpinum, 673.

Episternum, foliis octonis, 17. 434. v. Hæ:
sterumpe og Ætling.

Ætter, vilde, 322. 496.

Eruca, 839. 940.

Erythrinus, 996.

Eschara, 446.

Æsian, 2. 4. 11. 12. 73.

Æsiubetg, 75.

Æsiefjord, 745.

Esux, rostro subulato, 995.

Euphrasia, officinalis, 433.

Æyasfialldes: Æsuf, 752. 762. 763.

Æsande, 852.

Æstrand, 971.

Æyasfiardar: Æa, 633.

Ævegur, 753.

Æyamann, 447. 481. 489.

Æya: Æpp, 265. 293. 369. 376.

Æyar, en Gaard, 378.

Æyaraa, 843.

Æydesvatn, 82. 103.

ÆyF, hvert stort Træ, 733.

Æylisfiall, 657.

Æylisfihnufr, 745.

Æyvat: Æos, en llt, 166. 673.

Æyrarhala, 495.

Æyvindsaa, 381. 496.

Æyvindedal, 840.

Æyvindarfjord, 496.

Æyvindarhofnær, 745.

Æ.

Æaar, i Island, 53. 702. 836. 978.

deres: Æris, 54. 207.

deres: Æygtning, 54. 208. 352. 525.

deres: Æld, 54. 978.

— Æoder, 525. 978.

— Æpringetiid, 54. 191.

— Æskabning og Æart, 191.

— Æander, 191.

— Æalkning, 197. 978.

— Æld, 199.

— Æiarder, 203. 204. 204.

— Æehandling om Æinteren, 208.

— Ælter, 208.

— Ængdounne, 209 524. 526. 978. 115

— Æaveholle, 212.

— Æuus, 213.

— Æængde, 214. 702. 978.

— Æad, 214. 526. 703. 978.

Æan:

Register.

- Bankebninger deriblandt, 525.
 formange, skadelige, 702.
 Saar, vilde, 191.
 Saarehuuse, 453.
 Saareluus, 606.
 Saastundesford, 747.
 Saehunde, 526.
 Saeborge, 836. 978.
 Saeralut, 344. 976.
 Saergesteder, hvor Overfart i Kurve, 793.
 andre, 873. 875.
 Sagerpe, 266.
 Sagrastoga: Siall, 85. 268.
 Sagredal, 745.
 Sagurhols: Tiarnir, 295.
 Saldjseker, 520. 521. 763. 779.
 Salke, i Island, 60. 220. 548.
 Samlie, hvormange Menneker i hver, 737.
 Sarve, hvad dertil bruges, 394. 395. 407.
 511. 650. 801.
 Sarvemaade i Island, sort, 148. 164.
 165. 662.
 Sarve, gul, 162. 171. 174.
 brunroed, 163.
 blaa, 164. 171.
 violet, 171.
 Sauskagrisst, 234.
 Sarsford, 378.
 Sell, 789.
 Semtar: Dom, 365.
 Seetsteen, 395.
 Sieqværn, hos Saar, 212.
 Siflavatur, 943.
 Siltingen, en Fugl, 625. 983.
 Filipendula, 320.
 Filix, maxima, 320.
 mas, 816.
 Sinneford, 744.
 Sialdsfred, 2. 380. 627.
 Sialdveie, 81. 320. 380. 491. 495. 497.
 504. 621. 631. 639. 742. 745.
 754. 765. 861. 898. 926.
 forrige, 753.
 Sialdegræs, 445. 676.
 Sialdegnen, 626.
 Siæremuus, en Fugl, 580.
 Siæremadker, 71.
 Siaurugraus, 445. 816. 858.
 SiæruKongr, 665. 1014.
 Sialla: Kongulo, 608.
 Siallagraus, 20. 158. 162. 322. 434.
 491. 513. 941. 942.
 hvordan samles, 159. 941.
 hvoreledes tilslaves, 160.
 dets Virkninger, 161. v. Sialdegræs.
 Siallagraavider, 172.
 Siallgange, 202.
 for tiidlig, 203.
 den senere, 206.
 SialkabaK, 765.
 Sialldrape, 167. 320.
 Siallajakar, 521.
 Singer: Kiim, 43.
 Siola, en Krt, 429. 675.
 Siordungs: Thinge, 364.
 Domar, 365.

Sikke,

Register.

- Siste, 68. 228. 710.
 som komme med Siset, 520.
 Særskands, 594. 595.
 forgiftige, 596.
 brystsinne, 597. 987.
 i varme Bænde, 633.
 Reister, 1007.
 Siste, Blod, 30. 330.
 Skibe, 591.
 Siste: o: Ber-Tiden, 973. 975.
 Sistes Behandling, 30. 345. 358.
 Deeling, 344. 457. 458. 828.
 Dele, 345.
 Skingelse, 447. 349.
 Sistes Epist, 329.
 Siste, fremmede, 464.
 Sisteleier, 338. 343. 457. 458. 624. 693.
 695. 971.
 de tage af, 347. 369. 458.
 der stette Huse, 24. 274. 326. 353.
 Siste: Baade, 67. 228. 338. 339. 342.
 971. 975.
 Kongens, 973.
 Siste: Baadens Besætning, 340. 457.
 972. 975.
 Orden deri, 340. 342.
 Andov, 341.
 Siste: Kedske, 67. 230. 338.
 Siste:erne, i de sidste Tider, 505.
 691.
 deres Misbrug, 506.
 Fremmedes under Island, 507. 515.
 741.
 Siste:er, deres Drot, 32. 66. 67. 68.
 228. 338. 348. 457. 486. 505.
 588. 697. 827. 971.
 i første Bænde, 104. 229. 294. 381.
 595. 631. 633. 697. 720. 791.
 827. 870. 872.
 deres Tilgæls, 348. 507.
 Skingelse, 505.
 Siste: Byer, hvorledes bedes indrettes, 328.
 Siste: Bænder, 339.
 Siste:vanth, 80. 107. 792. 870.
 Siste: Tid, 341. 377. 974.
 Siste: garn, af Tø, 588.
 Siste: Linc, 974.
 Siste: Inset, 607.
 Siste: Karl, et Inset, 609.
 Siste: æthverse, 731.
 Siggrasat, Baade, 66.
 Siggrasat: Smaare, en llet, 940.
 Siggrasat, 1006.
 Siggrasatmann, 472.
 Slater, en Skibsvær, 300.
 Slater, i Bredeforden, 377. 617.
 paa Nordlandet, 624.
 Skioten, 514.
 Skiotahorn, 621.
 Skiotet, aa, paa Sønderlandet, 874.
 Skiot, 631. 693. 741. 745.
 Skiotaa, 632.
 Skiotdals: Herred, 745. 746.
 Skiotdals: heyde, 745.
 Skiotdøl, 798.
 Skio: dalevatn, 632.

Register.

- Floar-Urt, 814.
 Floen, en Bygd, 850. 962.
 Floder, bleve af smaa Bakke, 844.
 Floetian, 871.
 Fluga, Lunang, 603. 712.
 Bangdila, 603.
 Iheq, 603.
 Galbra, 604.
 Tin, 604.
 Randa, 605.
 Myte, 605. 712.
 Ragnar, 605.
 Mabla, 605. 712.
 My, 606. 712.
 Færlus, 606.
 Mæ, 712.
 Mog, 712.
 Flydra, en Fjæl, 358. 589.
 Flynder, 318. 827.
 rødspættede, 589.
 Flynderfangst, 827.
 Flyter, en Diet, 26.
 Sniofka, 633.
 Foden, en Holm, 409.
 Foder, 938.
 dets Fortællighed, 15. 16. 426. 671.
 Omgang dermed, 156. 427. 818.
 af Vidier, 173.
 af Thaug og Fiskeben, 352. 427. 428.
 440. 525.
 af Grønsvær, 524.
 Fodrings-Maae, 190.
 Foff, Mand, 693. Qvind, 693.
 Foffemangel, 347.
 Foffemangdens Aftagelse, 347. 348. 369.
 450. 506. 737. 848. 1029.
 Foffeller, 381. 382. 631.
 deres Fængst, 631. 828. 871. 782. 979.
 i varme Vand, 633.
 Hav, 695.
 FoffraadsHuuse, af Omar, 28.
 Foffdalen, 414.
 Foffeliev, Eurtarbrand, 150. 410. 412.
 668.
 Concha, 153. 410. 665.
 Gagates, 410.
 Fragaria, 320. 815. 940.
 Fredsfe, deres Tilflugtssteder, 239.
 Fringilla, remigibus albis, 582.
 Frodaar-Geide, 297.
 Frodaar-Lindur, 368.
 Frugtbarhed, Fiælsfiæns, 17.
 Frugtbarhedens Aftagelse, 16. 506.
 Fucus, foliis dichotomis, 442.
 dichotomus, caule crassissimo, 442.
 Baltheiformis, 442. 942.
 folio ensiformi, 443.
 folio latissimo, 443.
 Scoticus edulis, 433.
 Penniformis, 443.
 caule lignescens, 443.
 Sacccharinus, 443. 942.
 Lichenoides, 445.
 filiformis, 445. 539.
 foliaceus, acaulis, latifolius &c. 941.
 foliaceus, ramulosus, 943.

Sugte,

Register.

- Fugle, tamme, i Island, 59. 548. 587.
 Novr, 548.
 Oer, deres Omgang med Ungerne, 567.
 Fugle, Smtar, 578.
 Land, 578.
 Flotte, 579.
 Dvale, 584.
 Diarg, 624. 706. 707.
 i heede Wade, 890. 893. 896.
 Fugle-Gaagst, 224. 225. 482. 485. 563.
 696. 698. 706. 707.
 Æg, deres Samling, 482. 548. 706.
 Gang, 583.
 Fuglestier, 226. 855.
 Fugleprær, 240.
 Fuglebiarg, 378. 562. 569. 706.
 Fulaalefr, 797. 845.
 Furefjord, 504.
 Fura, Ørene, 511.
 Linde, 511.
 G.
 Gaarde, i Island, 22. 326. 453.
 nyes Indretning, 262.
 Odelagde, 369. 496. 502. 504. 738.
 759. 781. 784. 840. 862.
 forladte, 731. 737. 765.
 hvorfør, 738.
 Gaase-Arter, Evanten, 548.
 Hrota o: Marglað, 548.
 Hraagaas, 548.
 Helsing, 548.
 Gaasfæ, en Havu, 741.
 Gaddastata, 359.
 Gadus, ore cirrato, 357.
 minimus, 357.
 ore imberbi, 357.
 linea laterali nigra, 30. 357.
 major, dorso monopterygio, 358.
 minor, — — — 358.
 maximus, 991.
 Gafsheide, 631.
 Gagaris, Islandicus, 419. 420.
 Gagl, 549.
 Gagnheide, 81.
 Galdur, 467. 470. 472.
 Galdeafag, 470.
 Galeus, glaucus, 598.
 Galium, foliis graternis, flore albo, 430.
 verum, 431.
 boreale, 19.
 Aparine, 432.
 flore luteo, 19. 675.
 Gallinago, 579.
 Galtalef, 877.
 Gammelstæ, 266. 369.
 Gan, 475.
 Ganveid, 475.
 Ganslue, 604.
 Gaudreid, en Vog, 404.
 Gangere, skonne blandt Heste, 701.
 Garde, i Stadarsveit, 370.
 Gardehraun, 930.
 Gardur, 973.
 Gasterosteus, aculeatus, 359. 596.

Register.

Geeder, saa i Jøland, 55. 215. 703. 837.

Geirnesfur, en Fiske, 598. 991. 995.

Geirnytt, en Fiske, 360. 598. 991. 995.

Geiser, markværdigt Vandspring, 882. 884.

Stedets Beskaffenhed, 886.

Geiser, en anden opfaagende Rilde, 891.

Geita-Liola, 430.

Geirholm, i Borgarfjord, 81. 223. 239.

Geirholm, et Forbiærg, 502.

Geirfuglen, 750. 858. 983.

Geirfuglestier, 759.

paa Sønderlandet, 855.

ved Vestmannoe, 858.

Geitaa, 89. 91. 105.

Geitlands-Jøkul, 81. 86. 93. 95. 860.

Geitland, Reise derved, 87. 88. 99.

Geitnaakof, 163. 816.

Geldingafell, 271. 279.

Geldingarfknappur, 19.

Gentiana, 673.

autumnalis, 432. 814.

nivalis, 432.

verna, 432.

pneumonanthe, 432.

Geranium, sylvaticum, 165. 491.

montanum, 20.

Geum, 320.

rivale, 433.

Gierder, forældne i Jøland, 16. 672.

om Jiesbiærge, 768.

Giesing, en Fiske, 595.

Gies, tamme, fordm i Jøland, 705.

Giesgiverhuuse, 366.

Gigarpus, 1004.

Gilefjord, 373. 375.

Gimbursfel, 1011.

Girde 3: Girdie-Mitur, 511. 512.

Gisle Oddson, 74.

Gisduings-Maade, forandret, 16.

Epilde, 453. 460. 826.

Mangel, 453.

Gisgrer, 621.

Gleder 3: Lystighebter, 351. 977. v. Lg.
stighebter.

Glama-Jøkul, 380.

Glamuheyde, 380.

Glassteen, grøn og sort, 405.

Glaux, maritima, 166.

Glerhallur, en Agat, 399. 405.

Glerhallar, 657.

Glerhalle-Viif, 657.

Glimu-List, 45. 186. 350. 976.

Galbur, 350.

Glimsuraa, 107. 230.

Glugga-fel, 1010.

Gnaphatium, montanum, 423. 430.

dioicum, 430.

sylvaticum, 430.

Gnyppusell, 414.

Godaland, 762.

Gordius pallidus, 611.

Graaberg, 396.

Graagaas, en Jølandsf Lov, 35.

Graajurt, 430.

Graamage, 588.

Graasleppa, 588.

Grade.

Register.

Grædeslura, 165. 676. 946. 430.
 Grænavatn, 878.
 Grænaberg, 927.
 Græsfridil, 712.
 Græsarter, 929.
 Græstige Egne, 678. v. Græsgange.
 Græs, voret best med Norden, 672.
 dets Forskiellighed, 15. 17.
 dets Vægt, 154. 502. 672. 818.
 lidet, 426.
 Græsgange, 155. 426. 481. 496. 499.
 626. 678. 745. 767. 813. 938.
 939.
 Grædrot, 945.
 Græsfarhver, 889.
 Græfeg, en Havn, 272. 371.
 Græuen, fecalinum, 236.
 Græn, i Island, 733.
 Grænnaqvist, 785.
 Græshage, 767.
 Græne, Vord, 511.
 Gura, 511.
 Haudar, 511.
 Grættibale, et Viærg, 85.
 Grættistak, 616.
 Græmoaa, 104. 231.
 Græmsey, 378. 623. 624. 626. 741.
 Græmoevæutn, 730.
 Grændhval, 360.
 Grændevist, 572.
 Grændevistshavn, 832.
 Græund, en Gaard, 262.
 Græunderfiord, 371. 372.

Grænnavist, 515.
 Grænnehlid, 415.
 Grænland, dets Debelise, 614.
 Græfunes i Klesfar-Øyfel, 4. 853. 961.
 Græfustaalir, 276.
 Grældbringe-Øyfel, 851.
 Grællhøll, 491.
 Grællmetur, 406.
 Grællvarta, et Insect, 600.
 Grællvindr, et Insect, 601.
 Grænbisræstikær, 376.
 Grænløsvist, 744.
 Grænløst, 685.
 Grændarlang, et Vad, 385.
 Grændargræs, 942.
 Græsum, Spatholium, 402.

G.

Gaa, 359.
 Heide, 494.
 Gunt, 598.
 Gaadege, 40. 41.
 Gaadegtskinnur, 93.
 Gaafur, en Fisk, 359. 989.
 Gaagangar, et Viærg, 745.
 Gaafall, 359. 597. 839.
 dens Jangst, 493. 695. 711.
 Gaafall, Wein, 588.
 Gaafærling, 597.
 Gaamuns, en Fisk, 360. 597. 991.
 Gaamar, 360. 598. 710. 991.
 Galaviskur-Viærg, 378. 569.

Register.

Hamnropus, 71. 484. 577.

hangur, en Giff, 595.

haffiordase, 266. 369.

haffiordaa, 294.

haffongur, en Skjal, 1012.

hafsir, 972.

hastirdil, 984.

hafuræp, 760.

hagel, af Plumpskeen, 759.

hagey, 874.

hallgilsadeheyde, 744.

halse, en Hjalde-Wei, 81.

halsavegur, 81. 165.

hallrune-Wei, 491.

hallofa, 665. 1009.

hamborgere, deres Handel i Island, 372.
1036.

hammarfjord, 747.

handel, i Island, 372. 464. 694. 1036.
Fremmedes, 464. 1036. 1039. 617.

handel, med Trævarer, 499.

Gisfevarer, 694.

Madvarer, 694.

andre, 694.

haraldsfridur, et Fjeld, 502.

harpudiskur, 665. 1010.

havet, dets Aftagelse, 280. 361. 417. 614.
dets Vunde Ujavnhed, 377. 751. 930.
dets Dybhed, 377.

hav:Snegel, 70. 487.

hav:Sula, en Fugl, 223. 556. 858.

havhest, 625.

hav:Vandets Uddunstning, 384.

hav:Vade, 386.

deres Nytte, 388.

hav:Vinde, 390.

hav:Væfter, 440.

hav:Vis, 517. 521. 800.

havmand, 537. 538.

haver, i Island, 157. 322. 437. 682. 683.
816. 950.

havedsprængning, 955. 957.

have:Urter, 26. 156. 322. 437. 955.

havne, tilførn, og nu befjendte, 77. 272.
371.

havnefjord, 853. 975.

haysift, 359.

heede. v. Kilde og Hæde.

heeden, hvor dybt i Jorden, 917. 921.

— — dens fornemste Eade, hvori, 917.
921. 922.

heedens Grad i Hvererne, 892.

heeder, paa Østlandet, 745.

hegome, Spindeleav, 609.

hegre, 356. 984.

hegrenæs:Syffel, 622.

heing, 736.

heilo, en Fugl, 580.

heimae, 857. 858. 926.

heimaflettur, 859.

heimanamar, 898.

heimioniola, 157.

heinebergs:Ala, 748. 790.

heitel, 751. 790.

hefla 2: heflusfall, 861. 862.

dets Samfund med andre Jibbiærge, 866.

dets

Register.

- dets Virkninger, 866.
 dets Størrelse og Høide, 867.
 dets Tidspændinger, 868.
 Hella, 926.
 Helgahol, 734.
 Helgavann, 631.
 Helgasfæll, 270. 364.
 Helgasfælls:Øvet, 265. 293.
 Kloster, 365.
 Hølfundshøyde, 744.
 Høllnar, 274.
 Høliardalsfæll, 745.
 Hølluhodre, en lrt, 433. 20.
 Hølluberg, en Steenart, 654.
 Hølleraa, i Kiofar:Øyffel, 5. 65.
 Høllersøheide, 17.
 Høllersøse, 858.
 Høllioralle, 765.
 Hølliosand, 372.
 Hølliosfjord, 746.
 Hølliosfærd, 860.
 Hølliomenn, 239.
 Hølliosfiar, 240.
 Hølga, en lrt, 287.
 Hølge Biola, 75.
 Hølleflynder, 358. 589. 996.
 Høllingen, 61.
 Høllingianef, 1009.
 Hønglesfæld, 859.
 Herba Paris, 320. 940.
 Herdarbreid, 745. 752.
 Herdisarvillø:Graun, 930.
 Hørgilsøey, 377.
 Hørfølsfæst, 842.
 Hørrød, 746.
 Hørrødsvande, 631. 745.
 Høste, Vatna, 835.
 Høste, i Høland, 51. 187. 352. 522. 700.
 835. 977.
 Høstes Nygting, 182. 522. 977.
 Høstehaars Drug, 182.
 Høstetøi, 833.
 Høstenes Vittighed, 187.
 Hørbighed i Svømmen, 188. 835.
 Vardie, 189.
 Øydomme, 977.
 for store Mængde, 701. 702.
 de spises i Høngers:Mad, 701.
 Høstfjord, 514.
 Høstgiardio:Gæld, 790.
 Høst:Stene, 472.
 Søuge, 472.
 Høstøver, 473. 375. 476.
 Høstfæbe, 477.
 Høst, brandte, 469. 471. 478.
 Høst:Middele, 20. 402. 435. 480.
 dets Høstfælle, 471. 472. 478. 479.
 Høst:riet, 20. 700. 834. 977. 1035.
 Ølmu:Gæld, 350.
 Høst:Kunst, 465. 466.
 Høst:Øst, 466. 473.
 Øst:Kunst, 467.
 Øst, 468.
 ved Mør, 469. 476.
 Gæld, 470.
 i de Høst:Øst:Øst, 470.

Register.

- i de senere Tidder, 473. 474. 475.
 det sidste Tilstand, 477.
 derfor mistænkte, 493. 515.
- Hialeier, 326.
 Hiale, 327.
 Hialmholt, 950.
 Hiartagras, 20.
 Hiartastel, 1010.
 Hieracium, 18.
 alpinum, 433.
 umbellatum, 433.
 murorum, 433.
- Himbryne, en Bugl, 556. 710.
 Hionagras, 945.
 Hippobosca, ovina, 213. 606.
 Hirdis Riemaal, 40.
 Hirudo, corpore tereti, 611.
 annulis 40, 1001.
- Historie, naturlige, dorkes, 461. 448.
 Historiers Læsning, 350. 461. 700.
 v. Saugwæstur.
- Hjæfning, 461.
- Historier, naar man begyndte i Island at
 skrive, 47.
- Hitaraa, 79.
 Hitarðal, 80.
 Hitarðals Smærboud, 253.
 Kirke, 258.
- Hitarvatn, 226.
 Hitarnesholm, 266.
 Hitahol, 725.
 Hisleisfahsfide, 748.
 Hladeviib, 514.
- Hladhamar, 72.
 Hlaudevalle, 860.
 Hlidarende, 925. 947.
 Hlidarhuus-Hiald, 495.
 Hlutastæaler, 1035.
 Hlyre, en Gist, 592.
 Hnappadals-Syssel, 265. 293.
 Hnoda-Rongulo, 609.
 Hof, paa Hialarnæs, 74.
 paa Hoffstad, 260. 364.
 i Midstid, 736.
 i Gøddale, 736.
- Hofa-Jækul, 622. 752. 776. 860.
 Hoffstad, 260. 364.
 Holcus odoratus, 431.
 Holmfila, en Duf, 280.
 Holm, et Viarg, 86.
 Holmesaa, 748. 772. 790.
 Holm, Indre, en De, 222.
 Holme, for Værfuglen, 222. 226. 294.
 873.
- Holmens Havn, 853.
 Holmen, 854.
 Holt, hvad er, 683.
 Holstarod, 815.
 Holta-Soley, 433.
 Holtevarde-Heyde, 220.
 Holtoaar-Øs, 1036.
 Horbladfa, 432. 18.
- Horn, 52. 374. 378. 513. 569.
 Hornstrandene, deres Indvaanere, 515.
 Horn, Øster, 742.
 Horn, Vester, 747.

Horne:

Register.

Hornesfiord, 747.
 Hornesfiords-Jøkul, 789.
 Hornesfiords-Øliet, 790.
 Hornfjærg, i Island, 51. 189. 352. 523.
 det's Priis, 57.
 der tager af, 703.
 Hornsfi, 995.
 Hornsle, 276. 359. 596.
 Horsedal, 725.
 Hospitaler, i Island, 325. 685. 775. 820.
 853. 961.
 Hraugar-Eldur, 7. 121.
 Hrafnakluffa, 430.
 Hrafnagla, 928.
 Hrafnagil, 640.
 Hrafnatinna, 405. 419. 660. 725. 810.
 933.
 Hrafnatinnu-Drøder, 135. 660.
 Hrafnatinnu-Øiall, 725.
 Hrafnafjord, 514.
 Hraunsteene, halvsmalste, 658. 807.
 Hraunstof, Lava, 729. 731.
 Hraunspræfker, 929.
 Hraun, Hørfiall derpaa, 807.
 Hraun, smeltet Steen, 13. 133. 135. 315.
 659. 729. 807. 924.
 dens Løges Tylbed, 916.
 Hraunrepp, 80. 103. 134.
 Hraunhafnar-Øs, 371. 372.
 Hraunhavn, 370.
 Hraunlande-Ref, 272.
 Hraunpuffa, 1004.
 Hraundal, 204.

Hraundals-Dietter, 204. 205.
 Hraunstrækninger, i Borgarfjörðs-Øyfiel,
 133.
 paa Sneefjældene, 315. 362. 367.
 i Væstfiordene, 613.
 paa Nordlandet, 626. 638. 659. 719.
 752. 765.
 paa Østlandet, 807. 808.
 paa Sønderlandet, 860. 863. 928.
 929.
 Hreðiafteinur, 803.
 Hreggagerdiðsfiell, 790.
 Hrip, en ødelagt Gaard, 362.
 Hriðelting, 434.
 Hriðey, 624.
 Hrognfelli, 486. 588. 992.
 Hrognafall, 588.
 Hrolløgs-Øer, 760.
 Hrollangsviik, 505.
 Hroffagðer, 579.
 Hrudufaller, 937. 1008.
 Hrófkaalen, 596.
 Huler, Burtshulen, 239.
 Viðgeimur, 240.
 Hornureitir, 240.
 Blarnarhellir, 257.
 Baardarhellir, 76.
 i Bndahraun, 271.
 Sanghellir, 273.
 Slagnahellir, 281.
 Møgugilshellir, 932.
 Stettihellir, 659.
 Rangervatshellir, 925.

Register.

i Varnaborgsgraun, 315.
 ved Helliðvalle, 766.
 Rutafellskúle, 925.
 Húler, bebörðe, 239. 243. 245.
 i Hraunene, 271. 281. 315. 720. 730.
 Húmar, 997.
 Hunde, i Ísland, 57.
 til Fuglsfangst, 560.
 Þest íslandi dem, 981.
 Hunde, Dyr, 57.
 Dverg, 57.
 Hundsfiskur, 360.
 Hunevands-Sýssel, 622.
 Hunevatn, 631.
 Hunesfjörð, 621.
 Huuse, see Dýgnningar.
 deres Orden, 824.
 deres Tæge, 824.
 deres Antal, 825.
 Husagard, 824.
 Husafells-Söfn, 80.
 Husafell, 82. 85. 132. 134.
 Husavíið, 416. 617.
 Husavíið, paa Østlandet, 746.
 Husblas, 346.
 Hval, Stíðisfiskur, 541.
 Stetbakur, 541.
 Hnufubakr, 541.
 Kengisfiskur, 541. o: Reyðar-
 fiskur, 542.
 Steipe-Reibur, 542.
 Hrafn-Reibur, 542.
 Andarnefia, 543.

Tannfiskur, 544.
 ædelige, 544.
 Hynen o: Marfvin, 544. 981.
 Hundfisk, 544. o: Høfning.
 Hynþing o: Spækfugger, 544.
 Haahyrningur, 544.
 Illhvele, uadelige, 545.
 Rødkammen, 545.
 Naahval, 545.
 Hvalfangst, 546. 547. 705.
 Hvalsfjörðstrand, 80.
 Hvalsfjörden, 65. 79. 81. 231. 232.
 Hvalsfjardar-Lyre, 77.
 Hvalfiske, 65. 360. 519. 540. 705. 981.
 Weenrade deraf, 73.
 deres Størrelse og Nummer, 981.
 Hvalbeen, 443.
 Hvalvatn, 73.
 Hvalsaa, 381.
 Hvalsnæs, 852. 973.
 Hvalsaeyar, 81. 222.
 Hvalaatur, en De, 377.
 Hvamsefjörð, 374. 374. 596.
 Hvangil, 771.
 Hvanggaard, 940.
 Hvanrot, 943.
 Hverafugle, 890. 893. 896.
 Hverahrudur, 145. 405.
 Hverhella, 142.
 Hvera-Leir, 127.
 Jord, 892.
 Hverevand, 118.
 Hverastýp, 109.

Hvera:

Register.

- Hverasteinar, 660.
 Hverellirer, 945.
 Hverer, paa Hiebiarge, 93. 102. 766. 767.
 i Havet, 386.
 Hveret, ved Leyraa, 109.
 paa Vesterlandet, 382. 385.
 paa Nordlandet, 634. 638. 640.
 paa Østlandet, 766. 798.
 paa Sønderlandet, 882. 888. 890.
 895. 897. 1023.
 Hverdens Grad i dem, 893.
 Hverernes Forsigtelse, 114. 295. 638.
 Nytt, 115. 118. 382. 383. 641.
 Hverens Ene, 896.
 Hveravalle, 637. 638.
 Hverholme, 895.
 Hverflot, 775.
 Hvirvelvind, 493. 880. rar, 902.
 Hvinvariadal, 639.
 Hvita, 79. 88. 89. 105. 230. 237. 871.
 874. 877. 879.
 Hvitaarvatn, 870.
 Hvitaar-Øs, 262.
 Hvitaaside, 80.
 Hvitaar-Bru, 261.
 Hvit Branngras, 433.
 Hvit Madra, 19.
 Hvæn, en Urt, 158. 429. 431. 676. 939.
 Hyrde, hvordan bør være, 214.
 Høe, Omgang dermed, 16. 33. 817.
 deres Priis, 155.
 hvilket best, 818.
 Høelader, 817. 825.
 Høestatten, 33. 156. 481.
 Høebiærgning, vanffelig, 426. 427.
 Høestakke, deres Dannelsse, 16. 33. 156.
 183. 319.
 Høedal, 495.
 Hødestrand, 514.
 Hødsastrand, 529.
 Hødsfiell, 629.
 Hødsen, 630.
 Høds-Letur, 735.
 Hødsabrecke, 843.
 Hødsavatn, 632.
 Høgedals-Na, 381.
 Watn, 381.
 Høie, Etægges, 259.
 Ingjolls, 734.
 Mosolls, 393.
 Fimboge den Dammes, 494.
 Thorlev Jarlaftalds, 1032.
 Høihals, 280.
 Høus, i Island, 59. 839.
 Høer, af Nalder, 435.
 Høergaa, 633.
 Hørpudisfur, 153. v. Hørpudisfur.
 Høstuldege, 266.
 Høvn, 514. 617.

3.

- Jærn, i Kiofar-Øffel, 9. 11. 12. 14.
 i Vørgar-Øffel, 147. 232.
 paa Eneefiælden, 316.
 i Vøstfiordene, 407.
 paa Nordlandet, 661.

Register.

paa Øslandet, 811.
 paa Sønderlandet, 934.
 Jærn, i Hraun, 133.
 Jærnværk, paa Myrar, 232. 233. 254.
 andre, 407. 408. 603. 811.
 Jærn Leer, 316. v. Leer.
 Jærnhaltig Svovelskis, 406.
 Jærnskorp, 661.
 Jærn-Ørge, figurette, 662.
 Jærnkis, 662. 811. v. Kis.
 Jærte-Øgen, et Insect, 6. o.
 Jacobosifisk, en Ur, 946.
 Jacobaea, minor, 946.
 Jadrækan, en Fugl, 984.
 Jafne, 174.
 Jærdarber, 320. 815. 940. v. Vær.
 Jærnsmidur, et Insect, 601. 712.
 Jaspis, Kiæle:, 314.
 sort, 656. 803.
 rød, 656.
 grøn, 656. 803.
 Jaspisartet, sort Steen, 927.
 Jaspopyx, chalcedonio mixtus, 656. 803.
 Jgul: d. Jiltiar, 716.
 Jgulsker, 612.
 Jis, den Grønlandske, 517. 518. 521. 800.
 904.
 dens Virkninger, 518. 519. 644. 800.
 904.
 dens Nytte, 519.
 dens Baragtlighed, 520.
 dens Fart, 520.
 naar har besøgt Island, 904.

Jis, Hølln, 521.
 Kiæld, 521. 763.
 Jis, tistager, 83. 503. 517. 784.
 Jisaaabninger, 98.
 Jisbiærge, 85. 91. 277. 380. 405. 503.
 516. 622. 751. 768. 860. v. Isfel.
 trække Damp til sig, 88. 285. 299.
 deres Farve, 98. 99. 779. 782.
 deres Størrelse, 516. 779.
 deres Samfund med Havet, 789. 865.
 Ødelæggelser af dem, 840.
 Jisbiærge, de hindre ei Frugtbarheden, 777.
 784. 816.
 farlige at bestige, 277.
 deres indvendige Beskaffenhed, 286. 779.
 789.
 deres Af- og Tiltagelse, 517.
 de forude Jid, 732. 756. 775. 782.
 Vandspretninger derfra, 756. 759. 781.
 782.
 disses Aarsag, 764. 789.
 Jisen, dens Figurer, 250.
 JidBloder, 646. 770.
 Jidvisker, 646.
 Jid, brandende i Vand, 781.
 Jid, Rødt: d. Luste, 648.
 Jidspremdninger, de senere, 728. 756.
 775. 783. 869. 1024. 1025.
 deres Virkninger, 759. 775. 844. 866.
 1025.
 deres Samfund med Havet, 865.
 Jiltaklif, 74.
 Incrusasa martialia, 661. 934.

Inde

Register.

Indbygggerne, ved Myvatn, 730.

deres Antal paa Nordlandet, 737.

deres Antal paa Island, 848.

deres Antal paa Østerlandet, 848.

Judreholm, 81.

Indretninger, offentlige, 261.

nye paa Island, 1040.

Indviiede Steder, 385.

Ingelshol, 276.

Ingjolf, Islands første Deboer, 75.

748.

Ingjolfestord, 495.

Ingjolfesfell, 859.

Ingjolfestordshals, 495.

Ingjolfshaugr, 734. 859.

Ingjolfshafse, 748.

Ingjolfshafshvarfe, 841.

Ingvældstadsbolm, 623.

Innviæ, 853.

Inscriptioner, 255.

den paa Borg, 255.

den paa Hvam, 256.

den paa Holm, 735.

Insecter, i Island, 71. 598. 712.

Hav, 599.

Colcoptera, 600.

Dermestes Pilula, 600.

Curculio abdominalis niger, 600.

Staphilinus niger, 600.

Dytiscus nigro-brunneus, 600.

Carabus niger, 601.

nigro-aureus, 601.

Scarabæus, 601.

Insecter.

Hemiptera, 601.

Vandkat, 601.

Cimex Grylloides, 601.

Lepidoptera, 602.

Phalænz,

maxima, 602.

Fluctuata, 602.

Geometra, 602.

tota aurea, 602.

Hymenoptera, 603.

Tenthredo, sculco crasso, 603.

Ichneumon Errator, 603.

Ichneumon niger, 603.

Apis hirsuta, nigra, 603.

Diptera.

Tipulæ,

maxima, 603.

hortorum, 603.

lutea, 603.

culiciformis, 604.

nigra fulvifrons, 604.

nigra subhirta, 604.

Musca,

variegata, thorace nigro, 604.

hirsuta, lutea, 605.

gibba, capite alio, 605.

aurata, thorace nigro, 605.

domestica, 606.

Hippoboscæ, 605.

Aptera.

Pediculi, 606.

humanus, 606.

Register.

Insecter.

- seius*, 606.
Aleo arctica, 606.
capite fusco, 606.
Podura,
tota argenteo-aurata, 607.
obscura cærulea, 607.
Acari,
albus, 607.
petrarum ruber, 608.
Aranea,
Phalangium pallidum, 608.
 — — *supra nigricans*, 608.
Araneus cruciger, 608.
Aranea nigra saccata, 608.
Araneus totus niger, 609.
 — — *palustris minimus*, 609.
Canceri, see *Cancer*,
Brachyurus, 609.
Macrourus, 609. 997.
Pulex, 609.
Macroirus, rostro serrato, 609.
Oniscus, 610.
 — — *fuscus*, 610. 998.
 — — *niger*, 610.
Pediculus cataphractus, 610.
Jon Dadesen, 404.
Jon Gudmundsen, Jølands Plinius, 403.
Jonsbogen, en Lov, 37.
Jord, Mudder, 9. 10. 11. 122. 306.
 392. 914.
Lege, 11. 914.
Madjord, 8. 3. *Bæstjerd*, 122. 306.
 307. 392. 649. 800. 913.

- Jord, Torve*, 122. 306. 392. 440. 914.
Myre, 147. 306.
Swarte, 147. 407. 800. 914.
Spotte, 683.
Dynd, 309. 392.
Strandmudder, 392. 914.
Strandtorv, 914.
blaa, 394. 899.
grøn, 394.
gul, 899.
brun, 899.
Ofte, *Nur*, 439. 800.
Smildumor, 679.
Petremølle, 649.
Mergel, 653.
Alun og Vitriol, 721.
Jordarter, i Riosar-Eyfel, 8. 11.
i Vørgarfiord, 102. 122. 123. 147.
i Snæfjallshnæfsete, 290. 306. 318.
i Væstfiordene, 392.
paa Nordlandet, 649.
paa Østerlandet, 800.
paa Sønderlandet, 899. 914.
Jordarter, fundne ved Jordborren, 915. 917.
Jordens Dybhed, 123. 684.
Jordborren, Undersegninger dermed, 914.
 917.
Jordlag, 10. 123. 307. 915.
Jordlus, 610.
Jordbrand, for Jølands Væboelse, 237.
 240.
Jordbrand; almindelig, 807.
Jordbrand, 14. 74. 286. 613. 723. 732.
Jord;

Register.

Jordbrand, dens Virkninger, 83. 85. 106.
134. 442. 314. 362. 404. 626.
870. 928. 974. 1023.

Jordbrands-Caminer, 84. 134. 362.
728. 808.

Jordpæter, 439. 955.

Jordæbler, 955.

Jordfrugter, forðum, 680.

Jordsinner, 106. 133. 289. 404. 807.

Strafninger, 281. 807. 1024.

gammelt, 807.

nyt, 807.

Prøver deraf, 930.

Jordkærløe, af Kattegata, 646. 756.

af Heklefjæld, 732. 912.

almindelige paa Sønderlandet, 912.

Jrasfæll, 895.

Jestebuder, 280.

Jestfiords-Spyss, 374. 375. 427.

Jestfiord, 378. 516. 517.

Jsen, en Bjf, 30. 357.

Jst, 447. glohofa, 447.

Jolandernes Legems-Deffaffenhed, 20 175.

323. 447. 685. 820. 960.

Jinds-Deffaffenhed, 22. 176. 448.

480. 687. 821. 962.

Frugtbarhed, 451.

Klædebragt, 969.

Glaftfjæb, 489. 490.

Joland, hvoraf faaet Navn, 517.

dets første Deboelfe, 846.

dets Spyss, 1. 78. 264. 373. 619.

623. 742. 850.

Wiarge, 3. 4. 81. 267. 379. 622.

626. 745. 751. 859.

Wiøder, 5. 103. 294. 381. 630. 791.

870.

Wiøer, 5. 103. 294. 381. 630. 791.

870.

Warme Wæde, 5. 108. 295. 382. 634.

791. 882. v. Wiøer, Silber,

Wrende.

Wiørligt, 5. 118. 304. 389. 642.

799. 900.

Wirdarter, 8. 9. 122. 306. 392. 649.

800. 913.

Wteemarter, 11. 130. 310. 394. 653.

800. 924.

Wirdbrandt, 14. 74. 658. 807. 928.

1023.

Wmineralier, 14. 146. 316. 406. 661.

811. 934.

Wras og Wiøder, 15. 154. 319. 426.

681. 813. 938.

Wreter, 17. 18. 156. 319. 428. 436.

673. 814. 939.

Wndbyggere, 20. 175. 323. 347. 364.

447. 614. 685. 737. 820. 846.

960. 1029.

Wygninger og Wygninge-Maade, 22.

177. 453. 500. 690. 824. 965.

flettere end før, 23.

Wpiife og Levemaade, 24. 69. 70. 179.

328. 454. 481. 499. 691. 825.

966.

Waver, 26. 322. 436. 682. 946.

Register.

Island, der

Arbeide eller Handtering, 32. 38. 44.

180. 335. 455. 693. 827. 970.

Etide: Regning, 40. 41. 185. 349.

834. 976.

Etidesfordriv, 45. 50. 185. 350. 461.

699. 834. 976.

Eyrog, 48. 186. 464. 700. 823.

962.

Dyr, 51. 59. 187. 352. 522. 700.

835. 977.

Fugle, 59. 65. 220. 355. 547. 705.

837. 981.

Fiske, 65. 68. 228. 357. 486. 540.

587. 710. 839. 987.

Fiskerier, 338. 457. 486.

Haadbyr, 69. 71. 839.

Insecter, 71. 598. 711. 839. 996.

Stove, 72. 88. 166. 232. 361. 435.

613. 679. 733. 819. 1021.

Hayne, 77. 162. 371. 617. 741.

848. 1036.

Dreeling og Grandseffiel, 78. 80. 364.

373. 620. 623. 742. 851.

Der, 81. 265. 375. 376. 623. 749.

832.

Fiorde, 81. 375. 622. 744.

Fialbveie, 81. v. Fialbveie.

Jokler, 86. 270. 503. 622. 751.

755.

Jokstiler, 150. 318. 410. 665. 812.

935.

Snurbrønde, 296.

Forbiærge, 380.

Frugtbard, 14. 426. 671. 813. 937.

Nordbyrning, 436. 945.

Hoalfanast, 546.

Julus, pedibus uningue, 150. 1000.

Juniperus, 940.

procumbens, 322.

fruticans, 678.

Jokstelsfjord, 378. 514.

Joksteldal, 745.

Joksteldalsheede, 791.

Jokstelsellobal, 841.

Jokstels: Jialde, 81. 91. 380. 405. 516.

751. 786. 799. 861.

te tiltage, 83. 517.

de hviere, end de andre, 628.

deres Dronnesker, 763. 779. 780.

Jokstels-Band, 89. 117. 631. 798.

Jokstels-Riser, 94. 521.

Jokstelslied, 770.

Jokstels-Bandhuller, 97. 98. 768. 788.

Jokstels Jis, 98. 520. 521.

Jokstelsbals, en Vel, 272. 280.

Jokstels: Taa, 265. 276.

Jokstels: Afte, 809.

dens Medsigtselse, 782.

Jokstels: Arter.

Haar-Joklar, 788.

Skrid-Joklar, 788.

Grunn-Joklar, 788.

Jokstels-Galde, 783.

Jokstels: Elve, 748. 752. 778. 781. 797.

farlige at passere, 785. 790.

Jokstels:

Register.

Jøfels-Na, paa Gladsbø, 631.
 i Dyrefjord, 633. 752.
 i Mule-Syssel, 752. 792.
 paa Bredemærks-Sand, 785.
 i Lon, 791.
 paa Solheim-Sand, 797. 845.
 Jørva-Øer, 266.
 Jøtun-Øer, 600. 712.

R.

Raal, 26. 322. 437. 684. 816. 950. 955.
 af Coghære, 483.
 af andre Uter, 677.
 Raldaa, 876.
 Raldbæse, 117. 118.
 Raldbadarnes, 961. 1033.
 Raldbedal, 81. et fælt Sted, 91.
 Raldranenes, 378.
 Ralsafells-Jøful, 790.
 Ralsaa, 874.
 Ralf, hvad dertil bruges, 400. 735.
 Ralfsteene, 661.
 Ralmanstunge, 90.
 Ralvskind, en Gaard, 739.
 Rampalampe, et Insect, 998.
 Rampesten, rød, 654. v. Sakum.
 Rapal, hvad er, 160.
 Rar, af Træ, 500.
 Rarfe, en Fisk, 359. 587. 710. 996.
 Rarkole, en Fisk, 358.
 Rarken, en Klippe, 709.
 Rarl og Rærking, 855.

Rastel, gammelt, paa Borg, 736.
 paa Skoggestad, 847.
 Ratte, i Jøland, 57.
 Rattar-Balsam, en Urt, 433. 946.
 Rattar-Tunga, 19.
 Ratlegiaa, 752. 843.
 Ratlegiaa, dens Brand, 646.
 dens Jld: og Vand-Sprudning, 755.
 dens Jisbjerg, 768.
 dens Jdelæggesler, 772. 774.
 Raupamenn, 183.
 Reila, en Fisk, 710.
 Redshverfe, 731.
 Rer, Søe i en huul Klippe, 876.
 Retilstig, 898.
 Riampemure, 654. 613. 924.
 Riærkingedal, 843.
 Riærkingefjord, 843.
 Riærkingefjord, 294.
 Riærkingar-Øyra, en Tang-Art, 443. 680.
 Riartan, Olafsen, 255.
 Riialarnes, 66. 74.
 Ridfe, 266.
 Rieblevliif, 853.
 Riediumadur, 1006.
 Riedusvinn, 227.
 Riis, 146. 310. 311. 406. 662. 811.
 Rildehverfe, 633.
 Rilder i Havet, 387. 388. 876.
 paa Jisbierge, 766.
 Rilder, mineralske, 798.
 Rilde, opvædende, 114.
 Rildewand, 117.

uuu uu

Rilde,

Register.

- Kilde**, varm, i Hitarðal, 253. 304.
 i Klauðamell, 253. 300.
 i Groðaaheide, 297.
 i Hsefot, 298.
 i Hstleida, 296.
 i Olusfrigeddal, 299.
 ved Hstsum, 299.
 i Selingeddal, 382.
 ved Hstfhele, 383.
 andre Kilder, 385. 386. 634. 638.
 781. 798. 883.
Kios, det Ords Bemærkelse, 2.
Kiosar: Syssel, dets Velggenhed, 2.
 dets Værg, 2. 4.
 Bygde, 4. 14.
 Hede og Søer, 5.
 Varme Bæde, 5.
 Værligt, 5.
 Jerdarter, 8. 9.
 Steenarter, 11.
 Mineralier, 14.
 Frugtbarhed, 14. 15. 17.
 Urter, 17. 18.
 Indbyggere, 20.
 Ejend, 48.
 Dyr, 50.
 Fiske, 65.
 Markvaardigheder, 72.
Kive v: Kioven, 573. 575.
 dens Driftighed, 574.
Kirke, første i Island, 75. 260. 739.
 — af Lemmer, 276.
Kirkebo, 502.
Kirkebæ, 847.
Kirkebær, paa Vestmanna, 857.
Kirkevaag, 972.
Kirkefjell, et Værg, 269.
Kisugras, 430.
Kisphæd, hvor anlagges, 263.
Kisbmands-Hædrid, 712.
Kisbmands-Hæuer, 715.
Kisb, sænderlig Omgang dermed, 962.
Kisdmeyse, 585.
Kisveien, 620. 621. 753.
Kisshædet, 637.
Kisshæum, 638.
Klædedragt, Hændernes, 963.
 de Hæuermæres, 970.
 gammeldags, 969.
Kleifarvatn, 873. 878.
Kliaagriet, 395.
Klipper, opstæde af Jidbiærg, 844.
Klipper, graa, 653.
Klipper, usædoantlige, 613.
Klippelag, 123.
Klofajsfel, 752. 776.
Klofkebiærg, 312.
Kloster, i Hitarðal, 259.
 paa Helgafell, 365.
 paa Hingore, 736.
 paa Hveraa, 736.
 paa Heine, 736.
 paa Hæderalle, 736.
 paa Htrida, 746.
 paa Kirkebæ, 774.
 paa Hthæbæ, 774.

Kloster,

Register.

Kloster, paa Vidde, 850. 1032.
 Kloungur, 158. 162. 942.
 Klumbunefia, 355. 562.
 Klunfelang, 386.
 Kløsterhole, 961.
 Knappefiatba:Jofel, 752. 782.
 Knararnea:Eyar, 81.
 Kobber, i Mareast, 12.
 Kobbergrøn, 934.
 Kolbeinstade:Kopp, 265.
 Kolbeinsøey, 626.
 Kolbeinsaa, 741.
 Kole, en Biff, 358.
 Kollie, 357. 710.
 Kolleaal, 377.
 Kollebudeaa, 381.
 Kollefjord, 65. 373.
 Kolgrima, 748. 790.
 Kolorstein, 131.
 Koler, en Værrart, 394.
 Kommervaaag, 371.
 Kongakrabbe, 997.
 Kongr, en Skial, 70. 665.
 Kongulvofa, 608. 712.
 Konst:Arbeide, 38. 184. 185. 337.
 Konnpungur, 1001.
 Kopenes, 389.
 Korn, om fan vore i Jeland, 236.
 Korn, vildt, 236. 321. 370. 681.
 dets Beskrivelse, 829.
 Kornfad, fordm, 615. 680. 947.
 nye Forsøge dermed, 681. 947. 956.
 Kornsura, en Ur, 432. 677.

Korøfer, 376.
 Korones, 495.
 Kortholfsstade:Ma, 65.
 Kotunavider, 172. 173.
 Kotunelauf, 173.
 Krabbe, 71. 712.
 Krabbe, Taster, 609.
 Kofunga:, 609.
 Koll:, 612. 715.
 Krabla, et Viarg, 726.
 dets Jidsprødnung, 728.
 Krablande, en Rilde v: Hver, 383.
 Krada, en Ur, 161. 445. 676.
 Kræflinger, 70. 1010. Kragefiat.
 Krækebar, 171.
 Kragefiat, 590.
 Kria, en Hugel, 227. 575. 576. 577.
 Kridmergel, 126.
 Kride:hvid, 801.
 Kriføviig, 897.
 dets Hverer, 897. 899.
 dets Svovelbiarg, 917.
 Kristnes, 640.
 Krofa:Maere, 446.
 Krofsistur, 1011.
 Krofs, et Sogn, 856.
 Krofselaug, 109.
 Krosemadra, en Ur, 430.
 Krofsistur, 612. 715. 1005.
 Kryd:Spil, 446.
 Kryffie, 572. 575.
 Kubbe, en Skial, 665.
 Kudungr, 70.

Register.

Kufunge, 70. 487.
 Kufelnret, 70.
 Kulde og Herde, 305. 389. 391. 644.
 800. 903.
 Kulde, hai Grad deraf, 250. 645.
 paa Jiebierge, 282. 800.
 Kull, 169. 173.
 Kullfoiden, 169. 233.
 Kull, af Burtarbrand, 415. 669.
 Kumbleviif, 744.
 Kumin, 814. 940.
 Kuppunge, 1013.
 Kurl, hvad er, 169.
 Kufel, 69. 153. 410.
 Kvæg, at slagte, 426.
 Kvæg, Mængde deraf, 156.
 driftigt, 178.
 Kveffott, 176.
 Kviflandur, 93.
 Kper, 15. 154. 426. 836.
 deres Mafkning, 15. 53. 156. 491.
 836.
 deres Wartning, 52.
 Foder, 352. 353. 441. 977.
 deres Godhed, 426.
 deres Vansfabninger, 524.
 Kpérur, 511.

L.

Laagheyde, 745.
 Laas, funfligt, 847.
 Laatrabiarg, 378. 562. 569.

Laatraviif, 505.
 Laatur, Sælhunde-Voe, 59.
 Lægemedler, af Krækebat, 173.
 for Tak, 313.
 af Jordarter, 393.
 af Urter, 433. 676.
 af Insecter, 715.
 Lafl, paa Vardestrand, 412.
 Laflia-Soley, 18.
 Laflia-Silungur, 395.
 Lafladudra, 985.
 Lagarflot, 742. 745. 793.
 Lagopur, Nppe, 581.
 Lambahraun, 660.
 Lambastada-Lyar, 81.
 Lania, 988.
 Lam, vanskabte, 195.
 Lammetiiden, 194.
 Lammenes Afvannelse, 196.
 Lampevaage, 456.
 Landfar-Sott, 176. 449.
 Land-Selur, 58.
 Landvæfenet, dets Forsald, 348. 349. 369.
 506.
 Landeting, det første paa Island, 74.
 forfattet, 75. v. Althing.
 Landperne, 852. 856. 971.
 Langa, en Fiff, 358.
 Langa, 107.
 Langavatedal, 82. 261.
 Langavatn, 107.
 Langanes, i Vestfjordene, 390.
 paa Nordlandet, 390. 741. 742. 621.
 Lange

Register.

Langenesstrande, 744.

Langesierer, 265. 370.

Langesjøfæl, 622. 752. 776.

Langnesfæ, 562.

Langvølgie, 355. 562.

Langøfer, 376.

Lapathum, 18. 319.

foliis oblongis, 18.

Lapis, ochraceo argillaceus, 131.

arenarius griseus, 311.

arenarius, ochra martis, 311.

Bufonius, 590. 592.

Cotarius, 927.

Larus, maximus, 194.

glaucus, 709. 750.

cannus, 709.

albus, alis nigris, 226.

redicibus duabus longissimis, 226.

albus, alarum extremitatibus nigris,

272. 356. 482. 572. 709.

Rissa, 356. 709.

albus, medius & vulgaris, 356.

variegatus, collo & pectore albis, 570.

tridactylus, 709.

fulvus, macula alarum alba, 838.

Latusstein, 147.

Lang, hrad bemærker, 108.

Langastier, 387.

Langaland, 640.

Langafell, 886.

Langarvallebal, 798.

Langarhuus, 798.

Langarvatn, 871.

Langaraas, 883.

Langarnes, 899. 915. 975.

Langarvatohellvat, 925.

Langrettur, gamle, 736.

Langsatse, 46.

Langsærstein, 423. 425.

Larberg, 381.

Larunge, 381.

Larbroder, 595.

Lap, 65. 595. 633.

dens Sangst, 104. 105. 107. 229.

230. 294. 630. 633. 874.

sanges af Fugle, 226.

Lapaa, i Kiefar-Sjøfel, 5. 65.

i Vørgarfiords-Sjøfel, 103.

i Dale-Sjøfel, 381.

i Svartaardal, 631. 633.

ved Myvatn, 731.

Lapaa, Store, 874.

Lille, 874.

Lapaadal, 613.

Lapelven, 926.

Lee, hvorledes dannet i Jæland, 33.

Leer, blaaf, 11. 125. 268. 310. 914. 916.

rodt, 394. 651.

lyserodt, 394.

Myre, 394.

grønagtigt, 409. 801.

høghvidt, 801.

violtsfarvet, 917.

Leesarter, Peders-Vind, 125.

af adskillige Farver, 651.

Hvid-Kilde, 801.

Register.

- Peirptipur, 931.
Lepurus, en Giff, 593.
Lernæa Salmonea, 612.
 Pest, hvad er, 183.
 Pestamadr, 183.
 Levemaade, gamle og nye, 24- 454- 499.
 dens Forandring, 348- 507- 508- 691.
 826. 968.
 de Hornemmeres, 968.
 Levetiid, kort, 450.
 Leydhavneholm, 749.
 Leynevogur, en Havn, 77.
 Leyraafveit, 80.
 Leyraavog, 81. 103.
 Leyraar-Ley, 81. 222.
 Leyraa-Hver, 109.
 og Vad, 109.
 Leyre, 974.
 Leyrefjord, 514.
 Leyrhnuft, et Viarg, 727.
 dets Ildsprudning, 728.
 Leyrhavn, 741.
Lichen,
 Ilandicus, 20. 158. 161. 434- 491.
 676. 816. 937.
 Rhangiferinus, 161. 491.
 Niveus, laciniatus, 163.
 Leprolus, 163.
 foliaceus minimus ascendens, 676.
 probofciens niger, 816.
Lichenoides, Eryngii folia referens, 162.
 Lifiagras, 18.
 Lifrar-Urt, 432.
Lignum, fossile, 150. 412.
 Liigsteene, i Island, 89. 141.
 Liigfisten, et Viarg, 269.
 Liikthraa, 323.
 Liim, hvad dertil bruges, 199. 346.
Limax, 612.
 cinereus immaculatus, 612.
 agrestis, 715.
 ater, 1001.
 Lionslapper, 20.
 Liofavatn, 633.
 Liofavatadal, 719.
 Liotfæde, 772.
 Liotfædeheide, 772.
Lithophyller, 413. 419.
Lithomarga, 801.
 Litla-Gerad, 841.
 Litla-Madra, en Urt, 432.
 Litunar-Mose, 163.
 -Morkur, 511.
 Lo, en Fugl, 580.
 Loar-Træl, 581.
 Lodmundsfjord, 746.
 Lodna, en Giff, 358. 695.
 Lodpurka, et Insect, 714.
 Lodvider, 172.
 Logn, Blava, 907.
 Hvita, 907.
 Logrettur, 203. 204.
 LoFasfoda-Broder, en Urt, 433.
 Lomagnupr, 777.
 Lomagnups-Sand, 742. 748. 778.
 Lomatianer, 778.

Lomur,

Register.

Lemur, en Bugl, 557. 710.

Lonsford, 514.

Lona: Soley, 433.

Lonet, paa Øslandet, 747.

Lon, 274.

Lon-Drangar, 274.

Lon, en Øer, 275.

Lonbugt, 516.

Lonejskel, 791.

Lopt-Eldur, 391. 911.

Lorus, 940.

Lore, Uffiers, 75. 847.

Lusten, dens Tynge, 7. 905.

sundeft nord paa, 901.

dens Dvangelser, 905.

dens Forandring, 905.

dens dødende Virkning, 1026.

Lustsyn, sorgstigt, 740.

Lusthændelser, 7. 121. 391. 646. 800. 910.

Mosabauget, 910.

Miaa: Soley, 910.

Migabauget, 911.

Migabauget, 911.

Lopt-Eldur, 911.

Uppbilingar, 912.

Lumbricus,

marinus f. litoralis, 71. 341. 361.

611. 715.

terrestris, 220. 714.

annalis circiter 40. 611.

Lunaria, 816.

Lund, en Bugl, 223. 355. 482. 485. 513.

559.

dens Fangst, 560. 709.

dens Forandring, 561.

Lunde: Keisefal, 80. 109.

Lunde, 2.

Lundey, paa Nordlandet, 623. 624.

Lupus marinus, 590.

Lura, en Hise, 358.

Lurs, 606. 712.

paa Gaar, 213. 606. 712.

Maa, 606.

Mofu, 606.

Mesta, 606. 712.

Munda, 606. 712.

Mesta, 608. 712.

Mesta, 713. 714.

Musalyng, 171. 940.

Musajurt, 940.

Lycopodium, caule erecto, 174.

caule repente, 174.

digitatum, 174.

Selago, 434.

clavatum, 434.

Lyngdalsheyde, 925.

Lynd, fra Jøllerne, 646. 761. 770.

Lysehel, 295.

Lyftheder, i Jøllerne, 45. 350. 351. 352.

461. 490. 699. 976.

Lybe, af Urt, 18.

Lygevalle, 745.

Lysemænd, 36. 336. 970.

M.

Maafer, 356. 571.

Maafer,

Register.

Maager, deres Forandring efter Alderen,

356. 570.

deres Arter, 570.

hvide, 837.

Maager, 709.

Malmuche, 570.

Svartebagen, 571.

Maar o: Maasur, 571.

Maanemall, 123. 124. 393.

Maar, en Fugl, 356. 571.

Maarebygge, 786.

Mad, lavet af Urter, 18. 157. 321. 432.

433. 434. 459. 483.

af Etiafske, 69. 70. 488. 612.

af Ber, 170. 171. 179. 322. 675.

941.

af Mælk, 198. 692.

af Fiske, 330. 346. 359. 454. 459.

486. 537. 589. 590. 692. 966.

af Tang, 442. 444. 858. 943.

af Rivd, 454. 966.

af Fugle, 482. 513. 557. 578. 625.

af Salskande, 488. 536. 537.

af Haarer, 494. 597.

af Hvale, 489. 544.

af Egg, 513. 557. 597.

af Svampe, 675.

Madens Tillavelse, 331. 459. 693. 826.

Maddding, for Fiske, 71. 341. 361. 976.

Madfur, 71. 361.

Fiske, 605.

Fer, 611.

Namu, 714.

Kiedur, 1006.

Madkamodur, 1001.

Madredals Drafte, 731.

Madra, en Urt, 19. 431. 674.

Mælk, til Drifte, 31. 180.

dens Benytning, 198. 428.

Mælesell, 771.

Mælesells-Sand, 771.

Mærker, paa Fæ, 202.

Mærkevarbigheder, i Naturen, 72. 232.

361. 613. 732. 840. 1021.

andre, 74. 254. 364. 614. 734. 739.

846. 1028.

Magnesia, calcarea alba, 923.

Malachit, Islandsk, 649. 655.

Malinglae, 316.

Malmey, 624.

Malmuche, 570.

Manahaugr o: Manathusa, 734.

Mannabane, en Strøm, 361.

Marenfiarne, 443.

Marietunger, 745.

Mariugraus, 163.

Mariustætte, 18.

Mariuvøndur, 432. 814.

Mariuerlu, 583.

Marmennill, 537. 538.

Marmennillo-Smide, 447.

Marsfiter, i Kiofar: Syffel, 12. v. Steen;

arter.

Marga, 126.

Marsko, 609. 712. 998.

Marglytta, 715.

Margfælla, Krabbe, 71. 609. 998.

Mar:

Register.

Marhnutur, en Fisk, 359.
 Marbalmur, 441.
 Margine, 837.
 Marthradur, 445.
 Marthvare, 609. 997.
 Mark, i de gamle Love, 36. 37.
 Markfarfiot, 762. 873.
 Markeder, en Sort deraf, 205.
 forbun, 692.
 Marsoin, 65.
 Maur: Myre, 609.
 Maurar, Fisk, 607. 712.
 Medalfell, 2. 4.
 Medalfellsvatn, 5.
 Medalland, 748.
 Medusa, 612. 715.
 Melasol, 166. 320. 431. 674.
 Melasveit, 80.
 Melur, vilde Korn, 236. 321. 370. 431.
 673. 773. 814. 941.
 dets Beskrivelse, 829.
 Omgang dermed, 829. 941.
 Melrafske, 266.
 Menyantes, 18. 432.
 rifolium fibrinum, 18.
 Mergus, fulens cirratus, 550.
 capite nigro viridi, 550. Merganser.
 Meesingsstein, 147.
 Metaller, 288.
 Metalsarvede Strandsteene, 406.
 Meyarpatta, 1015. v. Meepatte.
 Miadurt, 18. 165. 320. 430. 676. 940.
 Miidage, 41.

Midnatte, 41.
 Midmunda, 41.
 Midurmorgun, 40.
 Miduraptan, 41.
 Midfjord, paa Østlandet, 744.
 Midfjord, paa Vestlandet, 621.
 Midfjordsaa, 630.
 Midfjordsbale, 631.
 Midhuøser, 406.
 Midhop, 631.
 Miklaholtskepp, 265. 293. 369.
 Miklavatn, 632.
 Millesolium, 676. 677. 815.
 Mineralier, 14.
 Svovel, 146. 316. 406.
 Kits, 146. 406. 811.
 Lapillus pyritaceus, 147.
 Vitriolum, 150. 408.
 Jern, 316. 407. 811.
 Malmglas, 316.
 Salt, 409.
 Mineralske Vand, 296. 300.
 dets Nytte, 302.
 Miøvesfjord, 746.
 Mistur, Vind, 8. 121.
 Mistur, Stovraage, 648. 901.
 af Aske, 842.
 Miøb, brugt i Island, 692.
 Miøstyre, 333.
 Mo, Holst, 682.
 Lyng, 682.
 Moberg, head er, 82. 131. 394. 924.
 Moberg, fast, 310. løst, 310.
 Modur,

Register.

- Modur, stille Elve, 280.
 Moeydathvol, 949.
 Mosell, 82.
 Moshalsen, 926.
 Moskollsdal, 393.
 Moskollshøi, 393.
 Monophyllum, 165.
 Moraa, 781.
 Mosarter, 158. 163. 683.
 Gambermos, 719.
 Mosfell, i Mosar-Syssel, 4.
 Mosfells-Sveit, 4.
 Mosfells-Heide, 5.
 Mosacilla, Oenanthe, 211. 584.
 pedore nigro, 583.
 fusca, cauda surgente, 584.
 Mulen, et Forbiarg, 745.
 Mule-Syssel, dete Deeling, 742.
 Beskaffenhed, 743.
 Muletarn, 871.
 Munadarnes, 495.
 Mundagraus, 434.
 Mundkræft, 179.
 Murar, en Urt, 946.
 Mura, en Urt, bringt til Spiise, 19. 946.
 Murana, unicolor, Hal, 594. 991.
 Conger, 595.
 Mus, Domesticus major, 354.
 Musfarbroder, en Fugl, 584. 585.
 Musareyre, en Urt, 940.
 Muns, i Island, 58. 170. 218. 528.
 beres Heiser over Vandet, 218.
 Mustling, 232. 341. 487.
 Muscus, Islandicus, 322.
 My : Myg, 603. 712.
 Mya, truncata, 716.
 Mylningar, Arbutus, 170.
 Myre-Syssel, 78. 80.
 Myrdals-Sand, 748. 841.
 Dygd, 748.
 Hofel, 751. 755.
 Myrer : Moser, 9. 122.
 Myrar, et District, 80. 102. 122. 154.
 232. 260.
 Myrar, paa Islandet, 791.
 Myrevand, 117.
 Myramenn, 260.
 Myrestitur, en Fugl, 579.
 Myrsnipe, 579.
 Myrekiarn, 680.
 Myrulus, 70. 232. major, 590.
 Myrvatn, 634. 718. 719.
 Myvata-Sveit, 718.
 Meydur, 720.
 Sandur, 731.
 Mysdredal, 840.
 Mysdredals-Drake, 621.
 Mysdalsaa, 502.
 Msepatter, en Skjal, 665.
 Msefstruten, 771.
 Mseg, til Brandsej, 450. v. Brandsej.
 Msegugils-Hellir, 932.

N.

Naa Kongur, 1012.

Naa-Repp, 265.

Namar,

Register.

Hamar, en Egn, 721.
 Grense, 722.
 døde, 723.
 Nassurtium, pratense, 319. 430.
 aquaticum, 433.
 Mattsfare, en Klippe, 735.
 Mattmaal, 41.
 Natursteene, 288. 402. 422. 425. 803.
 805.
 Matturugraus, 943.
 Nereis, Pelagica, 1002.
 Nerita, 665. v. Concha.
 Nislin, en Øgd, 791.
 Nefiastein, 395.
 Nefla, 20. 429.
 Niardarøsttur, 446.
 Niarvill, 745.
 Niarvilltur-Golme, 749.
 Niardvinger, 974.
 Nid, 470.
 Nifur, et opdiater Dyr, 55. 215. 711. 778.
 Niu Angu Kroseffur, 1005.
 Noen, 40.
 Norder-Jsland, dets Størrelse, 621.
 dets Bellagenhed, 621.
 Næs, 621.
 Diarge, 622. 627.
 Øgd, 622. 627.
 Fiorde, 622.
 Inddeling, 623.
 Strande og Øer, 623.
 Floder og Søer, 630.
 Hvæter, 634.

Narne Brænde og Bæde, 639.
 Nærligt, 642.
 Nordarter, 649.
 Oceanarter, 653.
 Mineralier, 661.
 Fosfiter, 665.
 Frugtbarhed, 671.
 Skove, 679. 733.
 Indbyggere, 685.
 Indbyggernes Sindes-Bestaaenhed, 688.
 Døgninger, 690.
 Spiise og Drikt, 691.
 Arbeide og Haandtering, 693.
 Tilidsfordriv, 699.
 Dyr, 700.
 Fugle, 705.
 Fiske, 710.
 Insecter, 712.
 Havne, 741.

Norderaa, 107. 229.
 Norderaadal, 80. 154.
 Norderga, paa Nordlandet, 632.
 Norderstrand, 744.
 Nordsfiord, 746.
 Nordlingasfiot, 106. 240.
 Nordlyset, 8. 121. 908. 909.
 Noronella, 601.
 Numerius, 984.
 major, rostro arcuato, 579.
 minor, longiroster, 579.
 Nup, 777.
 Nupstad, 777.
 Nupovande, 742. 777.

Register.

17upshid, 945.
17ydri-Keyfiadalur, 111.
17yt Land, opkommet ved Jidsprudninger,
843.

D.

Observationer, meteorologiske, 902.
Oebra martis, 316.
Oddbjørns-Stier, 387. 486. 562.
Odino-Gane, 357.
Ofærur, 504.
Ofseigsfjord, 378. 495.
Ofstinger, 365. 468.
Offersteen, 736.
Ofed, 91.
Olafsfjord, 632. 639.
Olufsviif, 371.
Olufsey, 376.
Omtumflinger, ved Jib, 447. 1023.
v. Jidsprudn.
ved Band, 417.

Oniscus, cauda obtusa bifurca, 714.
fulcus, 998.
thorace aculeato, 998 v. *Insector*.
Onyx, 656.
ex albo cœruleus, 656.
Oolibi, 652. 803.
prægnans, 655.
Opbiuror, 1005.
Opunsioides, 447.
Orchis, testiculata, 945.
Orlygr Hapeson, bygger den første Kirke i
Jesland, 75.

Orme, 611. 714. 1001.
Diegur, 839.
Ormur, 447.
Ofkabiðrur, 610. 998.
Ofmunda, kunnig, 434.
Ofte, i Jelsand, 26. 692. 826.
Otta, en vis Tid, 41.
Overfogsmesler, 417.
af Elve, 875.

Overtroer, paa Jelsand, 465.
Orehver, 640.

P.

Paal, et Stedskab, 35.
Papaver Alpinum, 166. 319. 674.
Passer, colore brunneo, 586.
Papey, 749. 847.
Papegsie, Eder, 359.
Pappyle, 847.
Parnassia, triglochis, 432.
Pataster, 439. 955.
Patripfjord, 378. 617.
Peberrod, 438.
Pecten: Kamfisk, 322 v. *Skaf*.
Pelecaner, 555. 982.
deres Arter, 555. 982.
Pelecanut, Carbo, 64. 482.
cinereo albus, Hæ-Cula, 223.
ater, capite cristato, 555.
variegatus, 555.
niger, macula femorum candida, 556.
Bassanus & *Pileator*, 556.
minimus, 556.

Penge,

Register.

- Penge, beres Wæregning, 52. 54. 57. 8. 80.
 160. 207. 208.
 Perficaria, natans, 814.
 Pest, paa Iseland, 688.
 Petra, concreta schistiformis, 661.
 v. Saxum.
 Petrefacter, 411. 641. 667. 812. 866.
 870. 892.
 de sorte Koldvands, 667.
 Petrefacta, Tophacea, 667. 806.
 Petrofalex, 12. 775. 932. v. Stenarter.
 opacus, 12.
 Peturo-Molld, 125. 635. 649.
 Rosa, 356. 557. 558.
 Buddur, 988.
 Rongr, 1011.
 Phoca, dentibus laniariis exsertis, 355.
 532.
 Leonina, 532.
 Vitulina, 532.
 Phocæna, 360.
 Phosphoriste Stene, 398. 399.
 Pimpestene, 315. 809. 866.
 Pinguicula, 676.
 Pinguiner, 855. 983.
 Pisum, maritimum, 322.
 Plantago, latifolia, 165. 430. 946.
 angustifolia, 432.
 Mervia, 676.
 maritima, 19.
 Plaressa, Glynder, 589.
 Plantur, columbarius, 558.
 Plerconarius, 573.
 Pleuronectes, totus glaber, 358.
 squamis asperis, 358. 827.
 maculis croceo-rubris, 358.
 Poesie, de Gamlee, 470.
 Polygala, vulgaris, 940.
 Polygonum, bistorta, 432.
 Polyper, 1006.
 Polypus, tentaculis senis, 1006.
 Porcellain-aignende Materie, 888.
 Porphyrites, rubeus, 657.
 Portland, 751. 849.
 Posenilla, argentea, 19.
 Priapus, marinus, ovato-oblongus, 1004.
 Primula, farinosa, 940.
 veris, 945.
 Procellaria, major, 625.
 glacialis, 710.
 Pissina fossilis, en Bolus, 651.
 Pusabit, 814.
 Pulvinar, marinum, 988.
 Fumex, 315.
 Pung-Nese, 18.
 Purley, 376.
 Purleyar-Sarve, 394.
 Purpureablomstær, 432. 814.
 Pyramider, paa Isel-Staldene, 96. 97.
 Pyrola, minor racemosa, 433. 814.
 Pyle, Leer, ved Skabla, 725.
 ved Hveretne, 825.
 Q.
 Quapsee, en Fisk, 588.
 Quargdruser, 658.
 Quartzum,

Register.

Quartum, parasiticum, colore carneo, 400.
coloratum, 804.

Qveifly, 441.

Qveifugraa, 673.

Qveifke-Tieid, 580.

Qveifker, 784.

Qvoda: Overliim, 198.

R.

Rachit, 961.

Ræfing, 358.

Rave, hvide, 527.

Græs-Tofur, 527.

Rave, i Jøland, 58. 216. 354. 526.

hvorteds fangee, 216. 217.

deres Huler, 216. 528.

deres Rade, 5-7.

deres Behændighed, 354. 526. 527.

Det blandt dem, 981.

Ravesfalde, 217.

Ragnahefhir, 281.

Raja, dorso non aculeato, 359.

aculeata, 359.

vulgaris & major, 30. 987.

clavata, 987.

Raja, ova, 988.

Rangaa, vestlige, 850.

østlige, 873.

Rangaarvælle-Spyffel, 850.

Rangaasand, 852.

Ranunculus, nivalis, 433.

agvaticus, 433.

acris, 18. 946.

Rapsey, 376.

Rauda, 663.

Raudagrene, 511.

Randamel, 265.

Randamels Østide, 253.

Randane, 254.

Randane: Epar, 81.

Randbryfingur, en Fagl, 985.

Randu: Kulur, 85.

Randula, 147.

Randusteinar, 310.

Raufarhefn, 741.

Ravne, i Jøland, 61. 220.

Ravneting, 62.

Ravnebiarg, 81.

Ravngiærdsaa, 742.

Ravnfeladal, 745. 798. 840.

Reddusfel, 716. 1009.

Reformationen, paa Jøland, 1038.

Reger, 997.

Reidinga, Jordsvart-Dyner, 18.

Reidinga: Græs, 18.

Reise, haad er, 200.

Reifedal, 633.

Reifhever, 634.

Reifedales-Hverer, 640.

Reifenes, 386.

Reifavælle, 639.

Reifeneeshyrne, 376.

Reifestrånd, 636.

Reifedalsaa, 105. 113.

Reifhepde, 639.

Reifialaug, i Riosar-Spyffel, 5.

Reifia:

Register.

Reifialaug, i Borgarfjörðs-Eyssel, 110.
 i Midfjörð, 635.
 mellem Qvislerne og Vlanda, 635.
 i Hjaltebøl, 636.
 Reifjarfjörð, paa Vardstrand, 385.
 i Hsefjörð, 385.
 paa Hornstrandene, 386. 502.
 ved Reifenes, 386.
 Reifholt, 113. 260.
 Reifsfjörðs-Heyde, 503.
 Reifsholtbøl, 80. 88. 111. 113. 260.
 Reifshole, 235. 377.
 Reifshole-Sveit, 381.
 Hverar, 382.
 Reifjartholl, 636.
 Reifjar, i Midfjörð, 635.
 i Skagafjörð, 636.
 Reifkaa, 641.
 Reifkeno, paa Nordlandet, 621.
 paa Sanderlandet, 852. 1025.
 Reifkenos-Hverar, 895.
 Reifkenos-Nost, 974.
 Reifkenos-Eyar, 854.
 Reifkar, 110.
 Reifkey, 388.
 Reifsholtshver, 883.
 Reifseviif, 952. 975. 1040.
 Reimatharre, 443.
 Reinevalle, 2. 4.
 Reinevallehals, 2.
 Reirgrefse, 431.
 Reise i Island, dens Begyndelse, 1.
 videre derom, 79. 264. 755. 850.

Reise til Seilands-Hotel, 86.
 til Sneefjælds-Hotel, 270. 278. 281.
 til Draapehlid-Fjæld, 288.
 til Vestfjordene, 374.
 til Hornstrandene, 491. 502.
 over Nordlandet, 620.
 til Hverevall, 637.
 til Myvatn, 718.
 over Øster-Island, 742.
 til Hiebiargene, 755.
 især Katlegian, 762. 768.
 til Hellefjæld, 862. 864.
 til Geysir, 882.
 Reise-Maaed i Island, 43. 185. 457. 689.
 694. 834.
 Remora, 994.
 Repp, hvad er, 80.
 Reppstyrere, 201.
 Reripora, 446.
 Rettergang, dens Indretning, 364.
 Norden, 365.
 Rettir, for Haar, 203. 204.
 Revet, en Havn, 371.
 Revet, et Fiskeleie, 307.
 Reydarfjörð, 746.
 Reydefusa, 674.
 Reydur, 595.
 Reyner, Sorbus, 167.
 Reyner, 436.
 Rhodiola, 320. 431. 678.
 rolea, 19.
 Riden, for Lyst, 186.
 Ride-Heste, 127.

Register.

Misgirdinger, en De, 266.
 Miskytis, 167. 233. 320.
 Misdomme, i Selv, 1029.
 Miumur, 48.
 Mindill, en Fugl, 584.
 Mitur, en Fugl, 356. 572.
 Miupa, en Fugl, 581.
 Moer, 437.
 Mognkellse, en Hiff, 610.
 Moſſe, 359.
 Moſenrod, 495.
 Moſtungr 3: Moſmer, 355. 531. 704. 836.
 Motter, 354.
 Rubellio, 996.
 Rubus, Saxatilis, 322.
 Rugſjerne, 376.
 Runnex, acetola, 18. 321.
 Digynus, 321.
 Patientia, 321.
 Runer, Hæzer, 257. 467. 469. 473. 476.
 Rune:Skriſt, 255. 256. 469. 735.
 Runafello:Huule, 925.
 Rutey, 623.
 Ruteſford, 373. 378. 621.
 Ruteſfordſaa, 630.
 Ryner, en Haa, 988.
 Ryper, 710. v. Miupa.
 Rypeløv, 949.
 Rypſe, 376.
 Rytſa, en Fugl, 482. 572. 625. 709. 983.
 Rødbirtungur, 595.
 Rødenupr, 378. 415. 621.
 Rødford, 646.

Rødeberg, 802.
 Rødenes, 621.
 Rødmage, 588.
 Rødſteen, 394. 802.
 Røn, 436.

G.

Gadler, i Jøſand, 43. 44. 45.
 Gæbunur, 1002.
 Gæd, forðum i Jøſand, 235. 236. v. Korn.
 Gæſſe, 535.
 Gælingsdals Høer, 382.
 Gæle:Konge, 532.
 Gæle:Bræla, 533.
 Gæle:Kiød, 534.
 Gælhunde, i Jøſand, 58. 219. 354. 529.
 698. 836. 980.
 deres Fangſt, 495. 529. 534. 632.
 696. 704. 749. 980.
 deres Priis, 529.
 deres Skind, 530.
 deres naturlige Hiſtorie, 533. 534.
 Land:Selur, 219. 354. 438. 530. 980.
 Ut:Selur, 219. 488. 530. 750.
 Vade:Sel, 520. 696.
 Hav:Sel, 531.
 Gæltiarnenes, 853.
 Gætur, Blandur, 532.
 Gramr, 532.
 Gæter, 155. 178.
 Gæter:Tiid, 178.
 Gæufokpar i Gæ, 1002.
 Gætutaag, en Rod, 434.

Gæft,

Register.

- East, af Kræfekar, 172.
 Egar, læses til Tidesfordriv, 47. 49. 700.
 overfattet paa Vers, 47. 700.
 Ege, Kialnesfuga, 72.
 Vaardar, 76. 258. 367.
 Grettis, 87. 616.
 Sturlunga, 235.
 Diarnar Histela-Kappa, 236.
 Eribyegia, 368.
 Lardela, 613.
 Thorshfirdinga, 615.
 Hlotshlidinga, 947.
Salices, 167. 436.
 alpina glauca, 172.
 folio subferrato, 172.
 incubacea, 172.
 pumila, 172.
 herbacea, 173.
 caprea, 511.
Salmo, *nobilis*, 65.
 minor, 66.
 dorso nigro, Umbra, 595.
 sqvamis argenteis, 595.
 maculis rubris, 595.
 lavis, *pinnis maximis*, 595.
Salmiak, 730. 922.
Saltfaagerier, 409. 410. 501. 663. 935.
Saltfaagning ved Hverer, 382. 384. 388.
 409.
Saltart, 317. 318. 408. 934.
Salt, *Kiøffen*, 409. 663. 812.
 ubekendt, 664.
 Sraum, 664. *Kalkisf*, 812.
Salt, fra Hella, 865.
Samlinger, af Steene, 403.
Sand, et Hifferleie, 307.
Sand, en Hialdvei, 754. 861.
Sandey, 388. 872.
Sandviif, 514.
Sandflugt, 370.
Sandlo, 581.
Sandstrækninger, 742. 743. 748. 777.
 778. 790.
Sandkvika, 93.
Sand, fra Hiesbierge, 760. 773.
Sandr, *Skideraa*, 778. 780.
 Lomagnups, 778.
 Myrdals, 778.
 Knappafest, 784.
 Breedemarks, 784.
 Breiddaa, 786.
 Hangaar, 856.
Sandmigur, 69. 665. 716. 1009.
Sandsteen, 405. 652. 802. 924. 925.
 jærnagtig, 670.
 gul og *rød*, 802.
 lysebluunagtig, 927.
 hærdet eller *smeltet*, 931.
Sandvatn, 103.
Sandviif, 746.
Sandaa, 861.
Sandsfell, 727.
Sandsfello-Løfel, 752. 782.
Sange, 351.
Sanghellir, 273.
Sazyrium, *albidum*, 433.

Register.

Sandvoistur, 172.
Sanda-Retter, 204. 205.
Sangu-Læstur, i Jelsund, 47. 186. 461.
 700.
 tager af, 48.
Saul or *Sel*, 443. 445. 483. 680. 853.
 941.
 det's Priis, 942.
Saurba, i Skofar-Syssel, 4.
Saxifraga, autumnalis, 20. 165. 430.
 oppositifolia, 287. 319. 433.
 Cotyledon, 433.
 Cespitosa, 815.
 Aizoides, 815.
Saxum, ochraceo-arenosum, 89. 131.
 ligvatum cavernosum, 123. 133. 315.
 404.
 schistiforme, 130.
 terrestri-arenosum, 131. 394. 655.
 rude, semiligvatum, 132. 404.
 vitreum, bullulatum, nigrum, 135.
 vitreum, solidum, nigrum, 136.
 vitreum, nitens, colore obscure thallico, 137.
 vitreum, fragilissimum, nigrum, 137.
 tophaceum, basaltiforme, 138. 139.
 tophaceum, subconiforme, 141.
 columnare, 138. 140.
 concretum, tophaceum stratofum, 142.
 tophaceum, brunneo-pallidum, 143.
 tophaceum, semiligvatum, nigricans, vulgare, 267. 144.
 griseum, 396.

scissile, e fusco pallidum &c. 310.
 friabile, lucide fuscum, 310.
 ochraceum martiale rubrum, 311.
 vulgare, griseum pallidum, 311.
 vulgare, e griseo canescens, 311. 396.
 basaltiforme, e nigro griseum, 311.
 396.
 ex atro glaucinum, prædurum, 313.
 jaspideum schistiforme, 314.
 tophaceum, schistiforme, 315.
 tophaceum, thermarum album, 316.
 breccia, 316.
 obscure e purpureo rubicundum, 316.
 ochraceo-argillosum rubrum, 394.
 margaceum e griseo subviride, 395.
 arenario micaceum, 396. 653.
Scolopax, 579.
Scolopendra, corpore lato squamoso, 999.
Scolopendroides, 1005.
Scoria, naturalis communis, 315.
 pulcherrime picta, 315.
Scorpius maris, 359.
Sedum, vermiculare, 20.
 annum acre, 433.
Sef-Ønd, 586.
Selja, en Havn, 853. 1036.
Sel, see *Æter*.
Selcy, 749.
Selardal, 748.
Selatange, 972.
Selningert, en Bugl, 228. 580.
Sellou, en De, 266.
Selgtrese, en Urt, 432.

Selja,

Register.

Selja, 511.
 Selsaag, 972.
 Seltiatnenæs, 32. 975.
 Senecio, Jacobæ minor, 946.
 vulgaris, 946.
 Sennep, 438.
 Sepia, Loligo, 612.
 tentaculis 10, 612. 715.
 Serpyllum, 491.
 Serularia, alietina, 446.
 Serpdingur, en 3. st, 589.
 Seyder, et Vand, 891.
 Seydarfiord, 746.
 Stælehuuse, 714.
 Stiasaborg, 631.
 Sibbaldia, procumbens, 430.
 Siden, en Vngd, 748. 774.
 Side-Jøkel, 751.
 dens Jis-Isrudning, 775. 776.
 Siddemand, 563.
 Sigleviif, 502.
 Siglefjord, 741.
 Silige, at, 563.
 Sila-Peppe, 600.
 Sile, Traume, 587.
 Strands, 587.
 Sand, 587.
 Sild, Hav-Sild, 224. 358. 698.
 Kop-Sild, 224. 587.
 Lodius-Sild, 224. 695.
 Franc-Sild, 549.
 Sildamanna-Gantur, 81. 229.
 Silde-Justerie, 229.

Silene, 433.
 Silningur, Rafia, 595. Vatna, 595.
 Sindobeskaffenhed, Indbyggernes i Riesar-
 Syssel, 22.
 i Borgarfiord-Syssel, 176.
 i Snæfialdnes, 314. v. Islanders
 uds Sindobeskaffenhed.
 Sioreidur, 66. 231.
 Siotorf, 10.
 Siumbrium, 433.
 Skaale, brugte til at spaae, 1035.
 Skaalen, et Viarg, 279.
 Skaaley, 376. 377.
 Skaalatange, 6 3. 744.
 Skæfeterier, nye anlagde, 978.
 Skælfiste, 1007.
 Skætaa-Jøkel, 752.
 Skæptafell, 781.
 Skæstefialds-Syssel, dens Deeling, 742.
 dens Beskaffenhed, 744.
 Skagen, paa Nordlandet, 621. 693.
 paa Sonderl., 973.
 Skægefjord, 621.
 Skægefjords-Syssel, 622.
 Skægeheyde, 622.
 Skælholt, 883. 1031.
 dens Demfiske, 1032.
 Skædsheyde, 81.
 Skædsheyde-Siald, 82.
 Skædsfærida, 146.
 Skædsflosning, 376.
 Skærfen, en Fugl, 64. 482. 485. 555.
 Toppkarf, 555.

Register.

- Graasfarte, 555.
 Disfarte, 556. 982.
 Hossula, 556. 982.
 Ekarskaal, 19. 321. 815.
 Ekaten, en Gist, 30. 359. 987.
 Ekeggestade, 744.
 Ekeggiatungr, 259.
 Ekegla, 336. 572.
 Ekederaa, 841.
 Ekederaa:End, 841.
 Hotel, 751. 776. 779. 780.
 Ekelsfistur, 716. 1007.
 Ekere, et Auset, 999.
 Ekiaa, 53.
 Ekidariim, 27.
 Ekidastade, 627.
 Ekiesfist, 69. 232.
 Ekial, i Jorden, 153. 410.
 Emunter deraf, 392.
 Ekial, Kame, 232.
 Ku, 410. 612. 665. 1011.
 Krage, 590.
 Ode, 590.
 Naaru, 665.
 Gimbur, 665. 1011.
 Kuldar, 1011.
 Ombuga, 1017.
 Piipne, 1017.
 Ekieriasfjord, 853. 975.
 Ekieria:Steenbider, 559. 583. 992.
 Ekialdbreed, 860.
 Ekialbiarnarviif, 502.
 Ekialsfandestfjord, 621.
 Ekialsfandestfist, 719. 741.
 Ekib, seilende paa Landet, 699.
 Ekiesphen, glemt, 740.
 Ekilmannarepp, 80.
 Ekinds Beredning, 44. 337.
 Ekisrbug, 324. 325. 449.
 Ekogarmenn, 87. 472.
 Ekogastrand, 265. 293.
 Ekogse, 266.
 Ekogey, 840.
 Ekolahraun, 930.
 Ekollasingur, 174. 434.
 Ekollaraafe, 612.
 Ekoradal, 80.
 Ekoradalovath, 104.
 Ekoratheyde, 380. 513.
 Ekoraviif, 741.
 Ekove, i Island, 72. 73. 166. 679. 733.
 1021.
 Ekove, forbum i Island, 72. 232. 733.
 860. 1021.
 hvorket Odslagde, 233. 1021.
 fortærede, 234.
 Ekov, Husefelle, 167.
 Fniestdals, 680. 734.
 Madravall, 734.
 Ekovhugst, 167.
 Ekreddal, 746.
 Ekreddsælde, 2. 73. 493. 627.
 Ekreedgiarder, 627.
 Ekribla, en Rilde, 114.
 Ekrida, et Kloster, 746.
 Ekriissand:Steen, 402.

Ekriue

Register.

- Ekseve Historier, naar man i Island ber
 gyndte, 47.
 Ekrofa, en Fugl, 556.
 Ekrudd, en Dr, 749.
 Ekumen, en Fugl, 838.
 Ekursteen, 405. 809.
 dens Forskiellighed, 809. 866.
 Ekpyggesild, 629.
 Ekpyr, splisid, 24.
 Elægna Lamb, 25.
 Elagretiden, 207.
 Eletten, 514. 741.
 Emaakopperne, Død ved dem, 348. 737.
 Emaare, en lrt, 19. 430. 815.
 Emididuaal, 677.
 Emidiumor, 649.
 Emidiunes, 407.
 Emidiuvilf, 505.
 Emofstikur, 612.
 Emysling, 69. 716. 1009.
 Empr, saltet, 26. 28.
 suurt, 27. 28.
 laaquet, 29.
 dyere end tilforn, 967.
 Omgang dermed, 27. 676.
 hvor meget for en Arbeids-Karl, 329.
 330. 455.
 Emprvatu, 791.
 Emorvandeheyde, 745.
 Ence, dens Skilse, 284.
 Eneefælde-Tsful, 270. 279. 282. 283.
 284. 286.
 Eneefældeones, 264.
 Eneefældeones-Dyffel,
 dens Veligheden, 264. 300. 305.
 Viarge, 264. 267.
 Inddeckung, 265.
 Erande og Dr, 265. 293.
 Eguens Veskaffenhed, 293.
 Gloder og Dør, 294.
 Hverer, 295.
 Euntrende, 296.
 Lust og Vairligt, 304.
 Jordarter, 306.
 Steenarter, 310.
 Mineralier, 316.
 Hoeslier, 318.
 Frugtbarhed, 319.
 Indvaanere, 323.
 Hifterier, 338.
 Dyr, 352.
 Fugle, 355.
 Havik, 371.
 Eneefælde, en Gaard, 516.
 Eneefælde-Strand, 516.
 Eneelios, 7. 121.
 Eneefred, 2. 516.
 Eneffer, Land, 612. 1018.
 Fersvaude, 612. 1018.
 Estrand, 665. v. Concha.
 Enigill, Drekke, 612. 715.
 Ewartas, 1001.
 Eniglavatu, 715.
 Enioblomster, 319.
 Enoked-le-Poller, 374.
 Enorro Smuktason, 113. 260.
 Enorra:

Register.

Enorra/Laug, 113. 114. 261.
 Eog, en Elv, 872. 874. 880.
 Solheime-Sand, 748. 852.
 Solheime-Tsful, 7 2 763.
 Solseovia, en lrt, 433.
 Solstrifia, en Jugl, 582.
 Solsgen, en lrt, 946.
 Sorbus, aucuparia, 167. 436.
 pumila, 167.
 Sorta, en Jordart, 147. 316. 636. 800.
 dens Brug, 149.
 Sortulyng, 170. 173. 419.
 Sparus, totus rubens, 996
 Sparum, quarzi sphaeris lamellosis, 399.
 scintillans, 399.
 objecta duplicans, 400.
 objecta non duplicans, 400. 658.
 parasiticum, 400. 658.
 Spedalshed, 176. 323. 449. 820. 961.
 Spbagnum, ramis reflexis, 175.
 Spiise, Wndernes daaglig, 24. 26. 179.
 328. 454. 692. 966.
 Sisternes, 328. 455. 459.
 om Høitidene, 454.
 Spill, i Island, 50. 186. 462.
 Skaf, 462.
 Spinath, 437.
 Spiza ulmaria, 18. 164. 430. 940.
 Spollorme, 211.
 Spongia, ramosa, 446.
 Sprængiukseld, hvad er, 25.
 Sprengesand, 621. 753. 861.
 Springere, 65.

Springtiden, 193.
 Springvande, faagende, 883.
 Sprog, det Islandske, 48. 186. 464. 700.
 730. 823. 962.
 det gamle forstaacs endnu, 49.
 blaudes med fremmede Ord, 464.
 dets lldale, 465. 823.
 meest usforandret paa Østerlandet, 823.
 og i Floen paa Sønderl., 463.
 meest forandret paa Sønderlandet, 964.
 Spurve, ukendiende, 586.
 Squalus, acanthius, 359.
 denticulis pungentibus cune, 359.
 glauca, 360. 991.
 fossula triangulari in dorso, 598.
 cauda longiore quam corpus, 598.
 maximus, 988.
 pinna ani nulla, 989.
 Staalstældet, 374.
 Staarkaa-Blaagrese, 165.
 Stadarbrauns-Øre, 234.
 Stadaraa, 294.
 paa Nordlandet, 631.
 Stadelveit, 265. 293.
 Stado, Truentimmer, 39.
 Stafa-Eyfe, 51.
 Stashol-sunger, 80.
 Staines, 973.
 Stagle, 377.
 Stalachiter, 241. 243. 315.
 Stalde, for Koer, inde i Vareserne, 353.
 Stanfelv, paa Solheimesand, 742. 797.
 845.

Stang,

Register.

Etang, 765.
 Etappens-Gavn, 272. 371.
 EtarKadarslag, 470.
 Etarice Armena, 19.
 Eteen, blaa og hvidet, 12.
 Eteenarter, i Kiofar-Spyss, 11.
 i Vørgarfiord-Spyss, 89. 123. 145.
 i Sneefjælds-Spyss, 310.
 i Vestfiordene, 394. 396.
 paa Nordlandet, 652.
 paa Østerlandet, 801. 915.
 paa Sønderlandet, 924. 946.
 Eteenarter, Marcasti, 12. 290.
 Petroflex, 12.
 Hraun, 13.
 Saxa, 89. 92. 123. 133. v. Saxum.
 Mafutina, 92. 136. 405. 419. 660.
 810. 933.
 Mafutinu-Broder, 92. 135. 660.
 Tophi, 138. 290.
 Dendrotypolishi, 290.
 Moberg, 394. 652.
 Moberg, 394. 653.
 Purk-gar-Farve, 395.
 Phosphorite, 398.
 Sandsteen, 652. 802. 824.
 Hvidsteen, 653.
 Lapis, 656. 802. 927.
 Eteenarter, frembragte ved Jordbrand, 314.
 404. 658. 806.
 Krystalliserede, 657.
 ved Hvererne, 915.
 Eteene, fra Ildsprængninger, 773.

Eteene,
 til Bygninger, 141. 926.
 figurerede, 402. 403.
 grønagtige, 927.
 Eteenforvandlinger, 296. 318. 411. 413.
 667. 812. 864. 870. 887. 892.
 Eteengierde, 327.
 Eteengierder, om Jøfkerne, 100. 101.
 Eteengrimsfjord, 378.
 Eteenhvidet Tra, 292. v. Eteenforv.
 Eteenkar og Eteenkærne, 399. 657.
 Eteenkalk, 657. 669. 670. 671. 813.
 Eteenbog, 397.
 Eteenbider, 227. 359. 427. 590. 591. 991.
 deres Skind, 591.
 Eteenbids-Broder, 592.
 Eteendepil 3: Eteenpavte, 584.
 Eteenstade, 765.
 Eteenfen, hvad er, 196.
 Eteenfur, en Fugl, 580.
 Eteen marina, radiis 5, 715.
 Eteen, alba &c. 227.
 capite lupia nigro, 484. 575.
 fusco alba, Eteen, 573.
 Eteenner, ei mange bekendte i Island, 42.
 Eteen-Ødd, 43.
 Eteensteinn, 400. 804.
 Eteenesholm, 371.
 Eteen, vulcanis, 659.
 Eteenefarm, 510.
 Eteen-Blaagrese, 20.
 Eteenveit, forfødeligt, 492.
 Eteenfar, viffe Skipper, 84.

Eteenda:

Register.

Estrandaſkaull, 745.
 Estrande-Zyffel, 374. 375. 426.
 Estranden, paa Sønderlandet, 852.
 Strandhavnshejde, 744.
 Strand Veibred, 19.
 Stringur, et Slags Spiise, 692.
 Strongylium, simplex carum, 445.
 Struktur, en Viargspids, 767.
 Strømmeas, 514.
 Strømfjord, 81. 263.
 Strømsfjordaa, 294. 371.
 Stude, deres Pris, 483. 523. 524.
 Græs, 524.
 Studslaberg, 311. 396. 653.
 Stusa, en Urt, 939.
 Sturlungerne, 260.
 Stutnesta, 355. 562.
 Styreja, en Fisk, 711.
 Hav, 711. o: Haastørje, 711.
 Styrisfiskur, 994.
 Stød, et Viarg, 269.
 Stødvorfjord, 747.
 Sufkertoppen, et Viarg, 269. 270.
 Sula, et Viarg, 768.
 Sula, en Fugl, 982.
 Sulaſkettur, 226.
 Sumathus, 178.
 Sundmave, 345.
 Surra, en Urt, 18. 157. 321.
 Olase, 321.
 Surbrænd, i Hirtadal, 253.
 ved Hillelleda, 296.
 Grodaarheides, 297.

Surbrænd, Hefote, 297.
 Oluseviſkedals, 299.
 ved Hrifum, 299.
 Eides, 300.
 Naudomills, 300.
 Surbrændes Mytte, 302.
 Surtarbrand, 150. 191. 318. 412. 414.
 415. 416. 668. 813.
 Surtar-Eple, en Urt, 434.
 Surtbellir, dens Beskrivelse, 238. 241.
 248.
 Reise bidſen, 239.
 dens Længde, 252.
 Sværd, Eftauning, 259.
 Sværtjord, 147. r. Sørta.
 dens Trug, 149.
 Svampe, ædelige, 674.
 Swaner, 220. 261. 548. 837.
 Swanen, dens Sang, 63.
 dens Kængse, 221. 791. 827.
 Svanehol, 386.
 Svartaal, en Dyndel, 309.
 Svartbagen, 194. 226. 355. 487. 571.
 872.
 Svartberg, 655.
 Svarte Dande, 261. 506.
 blandt Haar, 526.
 Svartfuglen, 562. 567. 568. 697. 706.
 982.
 dens Længde, 568. 697.
 dens Kængse besynderlig, 707.
 Svæfney, 377.
 Svæppakall, 674.

Svid:

Register.

Svidnur, en De, 377.
 Svin, ei i Island, 55. 215.
 fordum der, 704.
 Svinbingshøjde, 82.
 Svinedal, 414.
 Svinedalovatin, 103.
 Svineskard, 12.
 Svovel, i Klofar-Eyssel, 12. 14.
 i Borgarfjörðs-Eyssel, 146.
 i Vestfjörðene, 406.
 paa Nordlandet, 721.
 paa Sønderlandet, 934.
 dets Præis, 722.
 Svovel-Kiis, 406. 407.
 Miiner, 721.
 Lage, 722.
 Raffinaderie, 722. 897.
 Sand, 723.
 Blomster, 893.
 Svømmen, Færdighed deri, 257.
 forglemt, 740.
 Svørd, Jordsværd, til Brandsel, 459.
 Sygdomme, i Klofar-Eyssel, 20. 21.
 i Borgarfjörðs-Eyssel, 176.
 i Sneskjældnæs-Eyssel, 323.
 i Vestfjörðene, 449. 452.
 paa Nordlandet, 625. 685. 737.
 paa Østerlandet, 820.
 paa Sønderlandet, 961.
 Sygdomme, blandt Væren, 450. 961.
 nye, 508. 961.
 blandt Gruentimret, 686.
 Sygdom, den Veneriske, 961.

Sødenes, 623. 744.
 Sødsøer, 377.
 Søe, særsk, hvori Havfiske, 632. 711.
 Søer, særsk, 5. 381. 596. 631. 791.
 870.
 Søer, som tage af og til, 295.
 Søer, hvori man ei tør fiske, 596.
 Sæklæder, 339.
 Sæorme, i Floder, 794.
 Sæpapegzie, 223.
 Sæuloe, 427.
 Sælo, om er i Island, 12.
 Sæloahamar, 272.
 Sælvemændshøjde, 381.
 Sælvurt, 19.
 Sønderlandet, dets Eysser, 850.
 dets Veligheden, 851.
 Strælske, 851.
 Inddeling, 852.
 Strande og Væ, 852.
 Værg, 852.
 Floder, Søer, Væde, 870.
 Hverer, 882.
 Værligt, 900.
 Jordarter, 913.
 Mineralier, 934.
 Fosfiter, 935.
 Urter, 939.
 Indbyggere, 960. 1029.
 Sprog, 962.
 Erliske og Evemæde, 966.
 Arbeide, 970.

Regifter.

Sønderlandet, bets

Dyr, 977.

Fugle, 982.

Fiske, 987.

Insecter, 996.

Skove, 1021.

Holstingde, 1029.

forneuste Steder, 1030.

Havne, 1036.

Søndernessene, 32.

Sønderstrand, 744.

Søndre Keyfedal, 110.

Sørlaater, en De, 266.

S.

Sad, brigt til Brande, 459.

Sania, 211. 1806.

articulata subteres, 1006.

Særnen, 484. 485. 573. 575.

Sæl, en Eygdom, 452.

Sallnefsfjord, 378. 617.

Sang, til Drønde, 332.

Sapedserier, gamle, 735.

Saraxacum, 18.

Sartusler, 438.

Seife, 356. 482. 557. 558.

dens Veg og Unger, 557.

Sellina, major, 665. 1009.

Seredo, navalis, 611.

Serra, palustris marialis, 9. 122. 147.

subpingvis marialis, 147.

marialis, nigra, 316.

Spyra, 649.

Serlys, corpore rotunda, 1001.

corpore ovato, rubro, 1001.

corpore ovato, albo, 1002.

Serreo, vesiculator, 581.

Saarelaaters-Fiord, 503.

Sang og Sare, 441. 443.

Sang, Sjøfke, 442.

Seter, 442.

Sinna, 442.

Ska, 442.

Selgia, 442.

Sarabelle, 442.

Sarasilur, 68. 357.

Sare, 442. 443. 445. 942.

Saugull, 442. 443.

Sello, en Fugl, 580.

Sel, en Solt Uld, 199.

Sengelsesre, 875.

Serna, en Fugl, 227. 575.

Sernse, 2.

Sidraudelaag, 847.

Sinurian, vild, 944.

Sing, Sinesker, deres Hellighed, 364.

Sing, Siardinge, 364. 365.

Singmændsheyde, 380.

Singvalle, 364. 365.

Singvallesveit, 851.

Singvallevatn, 871. 877.

Singse-Syssel, 623.

Sets Sverer, 640.

Sidbrautar-Skaala, 366.

Siorsaa, 873.

Sistill, 679.

Silassi,

Register.

- Thaspi*, bursa pastoris, 18.
Thordathofde, 630.
Thorgerdesfell, 314.
Thoriedal, 87.
Thorlacus Sr. 1033.
 hans Sönn, 1033.
Thorlakshafn, 852. 971. 1036.
Thormodose, 266.
Thors-hoveb, 475. 476.
 hamar, 477.
Thoremarken, 765.
Thorsnes, 364.
Thorsnes-thing, 265. 364. 373.
Thorsfur, 357. 991.
Thorsfestangst, besynderlig, 992.
Thorsfestiel, 1010.
Thorsfestord-thing, 373.
Thorsfestord, 374.
Thorsfestordshede, 380.
Thrainfioldshraun, 930.
Thristrendengur, 1008.
Throstur, Skogathrostur, 582.
Thurraabræun, 1024.
Thurrabuder, 326.
 mange æde, 348.
Thursfasting, 445.
 hoit, 446.
Thveraa, 106.
Thveraay-thing, 78. 106.
Thveraafide, 804.
Thyrner, et Slægt *Tex*, 511. 512.
Thyrill, 81. 82.
Thyrillswan, 596.
Thyrner, Torn, 820.
Thyrsklingur, 357.
Tialderen, 71. 484. 577. 578.
Tialderper, 266.
Tiende-Lov, 1032.
Tiidsfordriv, paa *Jeland*, 45. 47. 185.
 461. 976. v. *Lystigh*.
Tiidsregning, paa *Jeland*, 40. 185. 349.
 976.
 efter Ebbe og Flob, 41.
 efter Stiernernes Løb, 42.
 paa *Singrepe*, 43. 185.
Tildra, en *Fugl*, 580.
Tindabictia, en *Fisf*, 987.
Tindastol, et *Diarg*, 623. 657.
Tindastauil, 861.
Tindstilla-Jökul, 861.
Tindstældar-Jökul, 767.
Tisling, 68. 357.
Tisrnes, 621.
Tostelæf, 845.
Tog, en *Sort Hb*, 199.
Topli theimmarum, 1138. 142. 405. 639.
 660. 806. 887.
Toplus, theimmarum argillac. albus, 145.
 290. 405.
 coniformis, 290.
 Marris, 662. 934.
Toplus, hyide glabellignende, 661. 724.
 sandagtig, 661.
Torden og *Lynild* om *Vinteren*, 121.
Torden 2 usædvanlig, 648.
Tordenslag, 732.
Torfa.

Register.

- Torfa-Jøkul, 752. 766.
 Torfahlaup, 766.
 Torfavande, 766.
 Torfamyrrar, 767.
 Torf-Krokar, 35.
 Torf-Liaar, 35.
 Torfgrasfar-Allt, 357.
 Tormentilla, erecta, 940. 946.
 Torn, 820. 941.
 Torstefangst, 828.
 Torianus, en Hiff, 587.
 Træ-Eyler, et Skib, 494.
 Træfyllshøjde, 380.
 Træfyllshøst, 493.
 Træplantning, 956.
 Trægraver, 327.
 Tremella, nostoch, 434.
 Trifolium, fibrinum, 18. 211. 432.
 album pratense, 19. 319. 400. 815.
 Tringa, rostro brevi nigro, 227.
 rostro levi, 228.
 natans inquieta, 357.
 rostro nigro, basi rubra, pedibus cocci-
 neis, 580.
 rostro nigro, basi rubra, pedibus ru-
 bris, 580.
 cinereo-fusca, 580.
 pectore rubro, 985.
 tota supra fusca, 985.
 Trippel, 129.
 Truxa, argentea, 66. 231.
 Salmonata & maculata, 595.
 Auviatilis, 595.
 longa, fusca, 596.
 ex albo testacea, 596.
 Trøll, hvad betyder, 471.
 Trøllabotnar, 657.
 Trølladyngiur, 1024.
 Trøllahland, en Biargrad, 396.
 Trølladyngiur, 752.
 Trøllhals, 320.
 Trøllkonu-Gardur, 397.
 Trøllkonu-Rum, 734.
 Tun, hvad er, 8.
 Tune, blive flettere, 16. 348.
 Tunerygge-Jøkul, 622.
 Tungaa, 632.
 Tunga, 745.
 Tungefe, 875.
 Tungl-Allt, 433. 816.
 Tunguhver, 111. 127.
 Tunkrepia, 434.
 Turdus, communis minor, 582.
 viscivorus, 985.
 Tvedøgre, 631.
 Tvister, 750.
 Tyttingar, Passeres, 582.
 Thusa-Tyttingr., 582.
 Enio-Tyttingr, 582. 583.
 Thrastr, 582.
 Rudna-Tyttingr, 586.
 Tømmer, hvor saaes, 500. 514.
 dets Priis, 500. 512.
 dets Færfel, 508. 510.
 Tømmerbygning, 735.
 Tørv, til Bygning, 35.

Tørv,

Register.

Ulv, dens Tilværet og Vælfærd, 9. 10. 307.
 Jordblave der under, 10. 307. 392.
 hvorledes staaes, 122. 308.
 Strandtorv, 914. 935.

U.

Udædhebraun, 752. 808.
 Ugler, 705.
 Uhyrer, i Gloder, 794. 877.
 Uld, af Uidie, 173. af Gaar, 199.
 Uldfælding, 200.
 Ulfe, 359.
 Ulmaria, en Urt, 423. 676.
 Umbla, minor, 595.
 Umseddingsgras, 430.
 Umdæffill, 18.
 Undirheidar, 876.
 Undirhlidar, 1024.
 Unedals-Jækul, 622.
 Urdholm, 388.
 Urdholms-Gver, 388.
 Urter, i Risfar-Spyffel, 15. 17. 18.
 i Borgarfjords-Spyffel, 157. 164.
 i Sneefjaldsnes-Spyffel, 319.
 i Vestfjordene, 428.
 paa Nordlandet, 673.
 paa Østerlandet, 814.
 paa Sønderlandet, 939. 941. 945.
 Urter, brugte til Epile, 18. 19. 26. 157.
 321. 433. 434.
 Urter, brugte til Lægebrug, 165. v. Lægemidler.
 til Løbe, 18.
 til Barkning, 165.

Urter, paa Fjaldene, 91.
 blandt Fieblærgene, 102.
 i Haverne, 156. 322. 436. 680. 816.
 955.
 Anti-scorbutiske, 450.
 Urtepladse, 320. 430. 679. 941. 943.
 Urtica, minor, 429. 1003.
 maxima, 435. urens, 20.

V.

Vaaben, gamle, 736. 1034.
 Vaccinium, uliginosum, 170.
 Myrtillus, 171. 322.
 Vabler-Spyffel, 623.
 dets heede Brønde, 639.
 Vablerheyde, 623.
 Vablerviif, 746.
 Væddere, 54. 193.
 Værbuder, 326.
 Værtiid, 182.
 Valle, til Drifte, 31.
 Vallhumal, 673. 815.
 Valnalaug, 636.
 Vand, til Drifte, 5. 117. 294. v. Drifte.
 vand.
 Vand, malkesfarvet, 89.
 Smørbrøndes, 296. 297.
 kaagende op af Jis, 706.
 Vandaaer, varme, 112.
 Vandfalde, forsumne, 879.
 Vandfald, 600.
 Vandledning, paa Enge, 680. 847.
 Vandløsestrand, 974. 1026.

Vand.

Register.

- Vandsprings, 112.
Vandsprøtninger fra Jiebiørge, 789, 783.
dres Birkninger, 844.
Vapnesford, 744.
Varesang, 340.
Vargsslappe, 174.
Varmalesfur, 111.
Varmaleksier: Huse, 83, 130.
Varme Bade, i Kiofar: Syssel, 5.
i Borgarfiords: Syssel, 109.
i Vestfiordene, 382, 385.
paa Nordlandet, 634.
paa Østerlandet, 766.
paa Sønderlandet, 882.
Varme Bade og Bunde, Jordens og Skipper:
nes Forhøiing omkring dem, 916.
Varmets Grad i Luften, 6, 7, 121.
Varme og Kulde, 120, 121, v. Kulde og Hede.
Vatnahjalle, 753.
Vatsekstrur, et Insect, 661.
Vateblaame, 607.
Vatefiordsvatn, 382.
Vatnedalsvatn, 382.
Vatnanes, 621, 691.
Vatnahjalle, 622.
Vatodalsaa, 630.
Vatvatn, 873.
Vatesjell, 895.
Vatsekard, 1023.
Vedfiord, 745.
Vedse, 2.
Vegbreid, 165.
Veggialaug, 11.
Vegt, 160.
Veie, i Joland, 266, 269, 272.
besværlige, 497, 503.
Veirliget, i Kiofar: Syssel, 5, 6, 16.
paa Sønderlandet, 16.
i Dalene og paa Hjelde, 99.
i Borgarfiords: Syssel, 119.
dets Forandring, 120.
i Snæfjaldsnes: Syssel, 304.
i Vestfiordene, 389, 426.
paa Nordlandet, 642.
Dagbog derover, 644.
paa Ølandet, 799.
paa Sønderlandet, 900.
Ver, en Bygd, 774.
Veronica, officinalis, 431.
spicata, 431, 944.
serpyllifolia, 943.
— — — omnia minima, 944.
floribus corymbosis, 945.
caule serpente, 945.
Vesteraa, 632.
Vestertop, 631.
Vester: Jøfelen, 268, 270.
Hjese diihen, 270.
Vestertardsheyde, 84.
Vestfiordene, deres Navn, 373.
deres Deliggenhed, 373, 390.
hvad derunder besaates, 373, 374.
deres Beskaffenhed, 375.
Der, 376.
Diarge, 379.
Egne, 381.
Hoder og Sæer, 381.
Høer, 382.
Lust og Veirliget, 389.
Jordarter, 392.
Steenarter, 394.
Vest:

Register

Vestfiordene, deres

Mineralier, 406. Fengebarhed, 426.
 Veirigt, 426. Urter, 423.
 Stove, 435. Have- og Jorddyren. 436.
 Luddbyggere, 447. 614. Bygninger, 453.
 Epilse og Levemaade, 454. 499.
 Arbeide, 456. Lidsfordriv, 461.
 Dyr, 522. Fugle, 547. Fiske, 587.
 Insecter, 598. Markvardigheder, 613.
 Havne, 617.

Vestmannøes Øsne, 838.

Vestmannøer, 836.

Vettenyre, 425.

Verrarbloom, en Ur, 433.

Veydeleyfesiord, 514.

Vicia, Cracca, 430.

Vidarnyre, Tubera, 167.

Widerhtis, Salix, 167. 172.

deres Nytte, 173.

Widedals-Na, 630. Tunga, 682.

Widunder, Hav, 716.

i Floder, 794. 877. i Øer, 877. 878.

Widviik, 744.

Widviiksbiarg, 744.

Widde, 853. 952. 1032.

Wifistadavatn, 873.

Wigur, en Øe, 750.

Wikevaka, en Sang, 351.

Wiin, af Krakkar, 172.

Witte, to sole Øer, 726.

Widvander, 484 720.

Wifdgies, 222. 705 982.

deres Jangst, 828. 837. 982.

Willingholtavatn, 871.

Winde, i Borgarfiord: Syffel, 119.

i Thetfialdsæes: Syffel, 394.

i Vestfiordene, 390.

paa Nordlandet, 642.

paa Østlandet, 799.

paa Sønderlandet, 902.

Winde, Foraars, 6. 391.

Winde, stede Jordsæren, 6. 16. 391. 643.

684.

Winde, stærke, 390. 643.

Winde, stadige, 643.

blæse jaxulig, 902.

deres storste og mindste Kraft, 905.

Winduer, hvad dertil bruges, 53. 966.

Wintere, milde, 644.

haarde, 645. 903.

Viola, Tricolor, 429. 675.

palustris aculis, 433.

Wiser, historiske, 351.

Witazgiase, en Åger, 681.

Virriolum, martis nativum, 406. 664.

Witril, 14. 150. 664. 893. 934.

Virum, naturale fraggiuissimum, 314.

metallicum, 316.

Wodmulestad, 856.

Wogastape, 974.

Wogmærre, en Fisk, 592. 594. 610.

Wonarflard, 753.

Wulpecula, en Fisk, 598.

W.

Wtre-Golm, 81.

Zeoli.

Register.

3.


Zeolites, albus purus, 400. 658. 804.
plumosus, 804.
Zoophyta, 446. 1006. *Zostera*, 441.

D.

Ødelagde Jorder og Bygde, 369. 840.
Ødestiel, 976. 1010.
Øesfiord, 621.
Øesfiords:Syffel, 623.
Øeboerne, 481. 489.
Øfuguggen, en Øe, 596.
Øgmundshraun, 930. 1024.
Øduhyggur, 361.
Øll, fornum, 692.
Øllfiolda, en Gaard, 296.
Øllfollida, en Kilde, 799.
Ølfilde, Naudamells, 253. 300.
ved Ølfilda, 296.
Ørodaarheides, 297. Øsekots, 298.
ved Ørisum, 299. Øides, 300.
Ølmodesøe, 874.
Ølves:Åa, 874. Øhver, 890.
Øndveigs:Suler, 690.
Ønstebisfen, 610. 712.
Ønstekteen, 610.
Øndverdnarnes, 265. 276.
Ørase, 781. 841.
Ørase:Jøfel, 751. 782.
dens Jid: og Vand:Sprudning, 783.
Ørebæk, 852. 962. 971. 1036.
dens Indvaanere, 962.
Ørethlid, 385.

Øresveit, 265.
Ørsarøse, 854.
Ørne, i Island, 60. 220.
giøre Skade paa Lam, 194.
Ørrid, 595. deres Fangst, 697.
Ørridaa, 82. 103.
Ørridavatin, 792. 873.
Østerlards: første Øboelse, 846.
Østfiorde: Østfirdinga:Giordung, 742.
dens Strækning, Inddeeling, 742.
Øysfeler, 742. Størrelse, 743.
Øestfæstethed, 743. Fiorde, 744. 746.
Øierge, 745. 751. Øer, 749.
Øiebierge, 755.
Øloder, Øer, Øverer, 791.
Øuft og Øeikligt, 797.
Øord: og Øteen:Øter, 800.
Øineraller, 811. Øruatbæthed, 813.
Ørter, 814. Øndbyggere, 820. 846.
Øygninger, 824. Øpiise, 825.
Ørbeide, 827. Øide:fordriv, 834.
Øyr, 835. Øugle, 837.
Øifte, Ønfetter, 839. Øavne, 848.
Østhorn, 742.
Østra, 1010.
Øvelfer, forglemte, 740.
Øvar:Øygger, 81.
Øresfiord, 621.
Øren, en Øei, 742.
Ørraa, 872. 1030. forsvinder, 881.
Ørne, som gaar ude, 189. 977.
Ørnes Ørils, 190. 483.
Ørnedals:Øeyde, 623.






Tilhang

om de

Islandſke Urter.

De ſaa Eſtervetninger man er i Stand at give om den Islandſke Flora, har man den nu værende Miſſions-Medicus og Kongel. Historicus naturalis i Trankebar, Hr. Johann Gerhard König, at takke, ſom ſea Foraaret 1764 indtil ud paa Hoſten 1765 har opholdt ſig paa Island, hvorhen han blev ſendt paa Kongelig Bekoſtning, for at indſamle til den bekiendte Flora Danica (ſom efter allerhøieſte Befaling udgives af Hr. Finanzraad Oeder) iſær de Urter, ſom Island frem for andre Hans Majestæts Lande frembringer. Hans medfødt Elyſt til Naturhistorien lod ham ei forſtille ſig de Beſværligheder og Vanſteligheder, ſligt et foretagende forte med ſig, og hans utrættelige Gliid overvandt dem alle. Ved denne har han i ſaa kort Tid ſammenbragt et betydeligt Antal paa rare mindre bekiendte og tildeels ganſke nye Planter, ſom for den ſtorſte Deel allerede findes i Flora Danica.

Tiden tillod ham ei, ſom han havde i Sind, ſelv at ſkrive en udførlig Flora Islandica, forend han reiſte til ſit nærværende Opholdsſted; derfor har Hr. Cancellieraad D. F. Müller, hvis nyttige Iver for Natur-



historien af flere Skrifter noksom er bekendt, paa hans Anmodning, optegnet i *Novis Actis Nat. Curios.* Tom. IV. pag. 203. sqq. de Planter, som Hr. Kønig deels meddeelte ham i Natura, og tildeels mundtlig har navngivet for ham.

Denne Hr. Müllers *Enumeratio stirpium, in Islandia sponte crescentium*, er Grunden til vores *Flora Islandica*, som bestaaer af henimod halvsiette Hundrede Arter. Et Manuscript, som Hr. Kønig har efterladt sig her, og en Urtesamling, har tient til at foretage Hr. Müllers Enumeration.

Ved at følge Hr. Ridder von Linnées bekendte Orden, har man ladet sig nøie med at blot anføre hans Navne, uden efter de fleste Floristers Brug, at fylde Papiret, ved at udskrive de Linneiske Kiendetegn og Synonymie.

Saadanne Arter, som ei findes i v. Linné Syft. Nat. Edit. XII., har man korteligen beskrevet. De faa oeconomiske Anmærkninger, samt de Jølandiske Navne, ere tagne af ovennævnte Hr. Kønigs Manuscript.





FLORA ISLANDICA.

Monandria.

Hippuris vulgaris.

Callitriche verna.
autumnalis.

Diandria.

Veronica officinalis.

serpyllifolia.

Beccabunga.

Anagallis aqvatica.

scutellata.

alpina.

fruticula. Bed Oxyraa

Uthting; paa Grimman's-Stadle;

Reisium-Stadle, og Torfa-Joful.

marilandica.

Pingvula vulgaris.

Anthoxanthum odoratum.

Triandria.

Valeriana officinalis. Bed Holte

Præstegaard.

Scirpus palustris.

lacustris.

cæspitosus.

acicularis.

Scirpus setaceus.

Eriophorum polystachium.

vaginatum.

alpinum.

Nardus stricta.

Phleum pratense.

nodosum.

alpinum.

Alopecurus geniculatus.

Agrostis rubra.

stolonifera.

capillaris.

canina.

pumila.

alba.

arundinacea.

Aira carulea.

cæspitosa.

flexuosa.

montana.

subspicata.

alpina.

aqvatica.

Poa pratensis.

trivialis.

compressa.



Poa annua.
angustifolia.
alpina.
maritima Hudsonis.
Cynosurus caeruleus.
Festuca ovina.
rubra.
elatior.
fluitans.
duriuscula.
Elymus arenarius.
caninus.
Bromus cristatus.
Arundo Epigeios.
Phragmites.
arenaria.
Triticum repens.
Montia fontana.
Koenigia Islandica. Hr. König er
den første Botanist, som har op-
daget denne liden saftige Plante.
Den findes neistagtig beskrevet i
Ridderen von Linnæes Syst. Nat.
Ed. XII. Tom. II. Man. pag. 35,
og en accurat Tegning derpaa kan
sees i Flora Danica Tab. 418.
Han har fundet den paa Leers-
grund ved Næs.

Tetrandria.

Scabiosa succisa.
Galium palustre.
Mollugo.
verum.
boreale.
Plantago major.
laniceolata.
maritima.
coronopus.
Alchemilla vulgaris.
alpina. Ved Kieblevig.
Potamogeton natans.
maritimum.
compressum.
lucidum.
cristum.
pectinatum.
pustillum.

Sagina procumbens.
Sanguisorba officinalis. 3 Moos-
sælds Heede.
Tillæa aquatica. Ved Långervatn.

Pentandria.

Myosotis scorpioides.
Pulmonaria maritima. Ved Ø-
ves-Na.

Meny-

Menyanthes trifoliata.

Gentiana campestris.

amarella.

nivalis. Ved Krisevig.

ciliata? *G. detonsa*, co-

rollis quadrisidis, laciniis ob-

longis, apice subcrenatis, mar-

gine utroque bidentatis. Riøb.

Celf. Skr. 1ode Deel pag. 435.

Tab. I. f. III.

quinquefolia.

Bavarica. Flora Dan.

tab. 317. *G.* corolla quinque-

fida, infundibuliformi ferrata

foliis oblongis. Ved Besssted

og Reis.

tenella, foliis ovatis,

basi solutis, pedunculis filifor-

mibus longissimis (tetragonis)

fauce quadrisida barbata. Riøb.

Celf. Skr. 1ode Deel pag. 436.

Tab. II. f. VI. Fl. Dan. f. 318.

Paa tørre Enge, ved Besssted og

Hidarende.

Swertia rotata. Fl. Dan. tab. 343.

Ved Odde, ikke langt fra Dreba-

ken; paa Vosgaard ved Helsing; ved

Holte, og paa adskill. andre Steder.

Azalea procumbens.

Hydrocotyle vulgaris.

Ligusticum scoticum?

Angelica Archangelica.

sylvestris.

Imperatoria Ostruthium.

Carum Carvi.

Aline media.

Parnassia palustris.

Statice Armeria.

Linum catharticum.

Drosera rotundifolia.

longifolia.

Sibbaldia procumbens.

Hexandria.

Anthericum calyculatum.

Juncus effusus.

trifidus.

articulatus.

bulbosus.

bufonius.

biglumis.

triglumis.

pilosus.

campestris.

spicatus.

Rumex digynus.

Rumex acutus.
acetosa.
acetosella.

Triglochin palustre.
maritimum.

Ocandria.

Epilobium angustifolium.
latifolium? At denne

er funden paa Island, tages meget i Vil, skiont den anføres baade i Hr. Müllers Fortegnelse, og i Riob. Selsk. Skr. Paa det sidste Sted gives den ganske urigtig ind for en nye Art, under Navn af *Ep. corymbosum.* I Hr. Königs Manuscript findes den ei anført, og det er ei at formode, at saa ivrig en Botanist, som Hr. König er, ei skulle have skrevet et Ord om saa rar en Plante. Fra Gronland har Hr. Brasen, en Chirurgus, bragt den hid; kort efter at Hr. König var kommen hjem fra Island. I Siberien er den først opdaget, og Ridder von Linné har beskrevet den kort, men tydelig.

Epilobium montanum.
palustre.
alpinum.

tetragonum.
Vaccinium Myrtillus.
oxycoccus.
uliginosum.

Erica vulgaris.
Polygonum viviparum.

Hydropiper.
ambibium.
aviculare.
persicaria.

Paris quadrifolia.

Decandria.

Andromeda Hypnoides.
Arbutus uva Ursi.
alpina.

Pyrola rotundifolia.
secunda.

Saxifraga Cotyledon, en mindre Varietæt. Riob. Selsk. Skr. 10 D. pag. 44. Tab. II. f. IX. Ved Hefla.

stellaris.
nivalis. Ved Krisevig.
punctata.

Saxi-



Saxifraga oppositifolia. Bed Ørre
aa Althing.

autumnalis.

arizoides.

bulbifera? foliis caulini-
nis palmatis petiolatis, caule
bulbifero subramoso & multi-
floro. Fl. Dan. tab. 390. Bed
Adner See, Saudafjall, Hrafn-
tinnafjall og Krasen.

ribularis. Bed Hekla.

tridactylites. Bed Ørre

aa Althing.

caespitosa.

Groenlandica.

hypnoides.

petraea? folia linearia, ad
apicem spinulosa. Bed Ørre
aa Althing.

Stellaria biflora.

cerastoides.

Arenaria peploides. Bed Olvesaa.

serpyllifolia.

ciliata. Bed Nese, Bess-

sted, Grimansfiadde.

Cucubalus Beben.

Silene acaulis.

Scleranthus annuus.

Sedum rupestre.

acre.

annuum.

villosum. Bed Krisevig.

Lychnis flosculi. Bed Ørre
gaarden Holte.

alpina.

Cerastium viscosum.

vulgare.

alpinum. Bed Kiebles-

vig og Krisevig.

latifolium? Bed Nese,

Neikjavik, Besssted og paa Ørre
bakken.

Spergula arvensis.

nodosa.

Icosandria.

Spiraea ulmaria.

Sorbus aucuparia.

Rubus saxatilis.

Fragaria vesca. Bed Hoden af Hekla.

Potentilla verna.

anserina.

aurea.

Geum rivale.

Comarum palustre.

Dryas octopetala. Bed Krisevig.

Poly-

Polyandria.

Papaver nudicaule? *P. radicum.*

Riøb. Gelf. Sfr. 10 D. p. 455.

Tab. VIII. f. XXIV.

Thalictrum alpinum. Ved Kieles
vig.

Ranunculus acris.

bederaceus.

reptans.

aquaticus.

lapponicus. Ved Ness.

repens.

glacialis.

hyperboreus, foliis

profunde trilobis, lobis oblongis
divaricatis, caule filiformi
repente. Riøb. Gelf. Sfr. 10.

pag. 456. Flora Dan. tab. 331.

3 rindende Bænde ved Bæstet,
Ørebækken, Høfsaa, og i Alders
Eoen.

Caltha palustris.

Didynamia.

Thymus serpyllum.

Lamium purpureum.

Galeopsis Ladanum.

Tetradit.

Prunella officinalis.

Bartsia alpina.

Rhinanthus Crista galli.

Euphrasia officinalis.

Pedicularis sylvatica.

flammen. Ved Kræsen

og Myvatn.

Limosella aquatica. 3 Lagers

vatn.

Tetradynamia.

Draba verna.

muralis.

incana.

birta?

Thlaspi bursa pastoris.

campestre.

Cochlearia officinalis.

Cardamine pratensis.

hirsuta.

petraea.

bellidifolia?

Sisymbrium Islandicum, siliquis

brevibus declinatis, foliis lyra-

to pinnatis, foliolis ovalibus

dentatis. Flora Dan. tab. 409.

Ved de varme Kilder, og paa fugt-
tuge Steder ved Kræsen.

Arabis

Arabis alpina.

Bunias Cakile.

Monadelphia.

Geranium sylvaticum.

pratense.

montanum.

Diadelphia.

Polygala vulgaris.

Lathyrus pratensis.

Vicia cracca.

Pisum maritimum. Bed Selsunds,

fiadle, Rangaæn, og Roden af

Hefla. Jøslænderne kalde denne

Plante *Bonnagræs.*

Anthyllis vulneraria.

Trifolium arvense.

pratense.

repens.

Syngenesia.

Leontodon Taraxacum.

autumnale.

Hieracium pilosella.

auricula.

alpinum.

præmorsum.

Serratula arvensis.

Carduus lanceolatus.

Gnaphalium alpinum.

uliginosum.

sylvatico affine. Fl.

Dan. tab. 254.

Erigeron uniflorum. Bed Husevig.

Senecio vulgaris.

Matricaria inodora.

Achillæa Millefolium.

Viola canina.

tricolor.

palustris.

Orchis maculata.

latifolia.

hyperborea. Bed Havnæs

fiord, Væststed, Næs og Rieklæs

viif.

Morio.

mascula.

Satyrium viride.

album.

nigrum.

Ophrys Camtschatca?

Monœcia.

Sparganium natans.

Carex dioica.

Carex

Carex capitata.
pulicaris.
arenaria.
uliginosa.
leporina.
vulpina.
muricata.
loliacea.
canescens.
elongata.
flava.
pedata.
montana.
limosa.
pallescent.
capillaris.
Pseudocyperus.
acuta.
vesicaria.
birta.

Betula alba, quadriulnaris, plemque decumbens trunco curvato inæquali, sylvam constituit ad Lacum Laugervatn dictum. Diameter trunci raro quatuor pollices excedit. Comburit in usum fabrorum ferrariorum.
nana.

Myriophyllum spicatum.
verticillatum.

Ceratophyllum demersum.

Diöcia.

Salix Myrsinites.
arbuscula.
herbacea.
reticulata.
Myrtilloides.
glauc.
lanata.
lapponum.
arenaria.
fusca.
caprea.
pentandra.

Empetrum nigrum.

Juniperus communis.

Rhodiola rosea.

Polygamia.

Holcus odoratus.
Atriplex laciniata.
patula.

Cryptogamia.

Equisetum sylvaticum.

Equis-

Eqvisetum arvense.

limosum.

palustre. Isl. Saring.

fluviatile. Isl. Elting.

hyemale. Isl. Hægræs.

Disse 3 sidste Alter skal, efter

Indbyggernes Sigende, give Saa-
rene megen Seedme.

Osmunda Lunaria.

Acrostichum ilvense.

septentrionale.

Tbelypteris.

Polypodium Filix mas.

Filix femina.

fragile.

vulgare.

fontanum.

Phegopteris.

Dryopteris.

Ophioglossum vulgatum.

Lycopodium alpinum.

clavatum.

annotinum.

Selago.

Selaginoides.

dubium, furculis

simplicissimis erectis compres-
sis, foliis complicatis carina-

tis acutis alternis, distiche im-
bricatis.

Conferim nascitur & den-
sis cæspitibus obtegit rupes, tor-
rentibus aquarum, ex altioribus
regionibus verno tempore de-
fluentium, humectatas inunda-
tasve; passim & in terra crescit
locis, vere inundatis. Surculi
vix dimidio pollice altiores,
utrinque acuminati. Folia ba-
seos oblitterata. Fructificatio-
nis ne rudimentum quidem ob-
servari potuit, hinc de genere
dubium exstat.

Sphagnum palustre.

Splachnum rubrum?

vasculosum L. foliis o-
vatis nervo carinatis, apice ob-
tusiusculo.

Folia sparsa rariora, ut in
Spl. ampullaceo, & pellucida
punctata, ut in congeneribus
omnibus. Pedunculus pollica-
ris & bipollicaris, apice intu-
mescens in corpusculum (um-
braculum Linnæi) subsphæri-
cum obscure purpureum vel
fangvi-



fangvineum, cui insidet capitulum cylindraceum farctum, ore ciliato.

Splachnum ampullaceum L. foliis lineari lanceolatis, nervo carinatis, acuminatissimis.

Pedunculus pollicaris & bipollicaris, flaccidus uti caulis, lutescens & nitens, sensim intumescens in corpusculum obconicum, vel obovato truncatum, lutescens vel violaceum, in siccata plantula pellucens & vacuum, cui insidet capitulum ut in præcedente.

Bryoides foliis ovatis, nervo carinatis, setiferis.

Folia conferta imbricata, nervo ultra substantiam folii continuato in setam concolorem longitudine dimidii folii. Pedunculus semipollicaris, crassiusculus, rigidus, ex luteo & rubro nitens, sensim intumescens in capitulum, ovato cylindricum purpureum, sub ore ciliato coarctatum, quasi in cylindrum more specierum præ-

cedentium. Dill. Musc. 345. t. XLIV. f. 5. ad specimina nostra propius accedit, quam f. 4, sed & illa foliorum figuram minus exacte monstrat. Oed. En. n. 1157. & Fl. Dan. t. 192. videntur aliam speciem & quidem eandem cum fig. 4. Dillenii designare. In Islandia, & Groenlandia observata est rarior hæc species, quam in bivio positam Splachnis potius quam Bryis annumerare syadet habitus.

Nota. Splachni species pulchræ, alpinarum regionum plerumque incolæ, rarioribus muscis annumerantur. Notari meretur, quod omnes, quotquot videre contigit, in stercore pecorum natæ fuere. Accuratæ & distinctivæ earum descriptiones vix ullibi exstant, hinc adumbrationem earum, quas Islandia Koenigio obtulit, suppeditare haud a re creditum est.

Polytrichum commune.

urnigerum?

Fon-

Fontinalis antipyretica.
minor?

Phascum acaulon.

Mnium pellucidum.
fontanum.
hygrometricum.
purpureum.
setaceum.
cirratum.
bornum.
crudum.
pyriforme.
polytrichoides.
serpyllifolium.

Mnium minimum non ramosum angustissimis & pellucidis foliis. Ray. Synopf. Stirp. Britt. pag. 78. No. 5. Muscus polytrichoides exiguis capitulis in summis furculis. Moris. Hort. Oxon. Pars III. p. 629. Sect. 15. t. 6. f. II. Caulis foliis lanceolatis acuminatis sparsis instructus, viridis, continuatus in pedunculum longum aphyllum concolorem; capitulo L. sphaerula pulverulenta terminatum. Capitula non visæ.

Bryum apocarpum.

striatum.
pomiforme.
extinctorium.
subulatum.
ruvale.
scoparium.
undulatum.
beteromallum.
hypnoides.
argenteum.
pulvinatum.
cæspititium.
truncatulum.

Hypnum taxifolium.

denticulatum.
triquetrum.
filicinum.
proliferum.
parietinum.
prælongum.
crista castrensis.
abietinum.
cupressiforme.
aduncum.
scorpioides.
squarrososum.
dendroides.

Hypnum curtipendulum.

purum.

illecebrum.

cuspidatum.

sericeum.

velutinum.

Jungermannia albicans.

resupinata.

complanata.

dilatata.

rupestris.

epiphylla.

pinguis.

furcata.

ciliaris.

bicuspidata.

disticha, furculis

suberectis simpliciusculis, foliis
concavis distiche imbricatis.

Sureculorum apices referunt
Eragrostidis spiculam. Fructi-
ficatio non visa.

Marchantia polymorpha.

hemisphaerica.

tenella?

Targionia hypophylla? Hr. Rönig
troer at have seet dette rare Møss
ved Holste-Præstegaard, ikke langt

fra Ørebakken. Endskönt man
har niegen Grund til at tage det
i Øvil, især da Hr. Rönig selv er
uvis derudi, saa har man dog vil-
det anføre det, for at give dem,
som engang kunde faae Leilighed
dertil, Anledning til Efterfogning.

Blasia pusilla. Ved de varme Kils-
der ved Reiskium, og ved Langer-
vatn.

Riccia crystallina.

glauca.

Anthoceros punctatus. Ved Reis-
kium og Langervatn.

Lichen geographicus.

sanguinarius.

fusco-ater.

calcareus.

candelarius.

tartareus.

pallescens.

subfuscus.

saxatilis.

omphalodes.

olivaceus.

Fahlunensis.

stygius.

physodes.

Lichen

Lichen *parietinus*.

stellaris.

Islandicus. Denne findes
med Mælk, og splides i Island.
Hos os har den i de senere Tider
faaet Ord for at curere Svindsot,
dog have de anstillede Forsøge ikke
endnu givet stort Haab om saa en-
stelig en Virkning.

nivalis.

farinaceus.

venosus.

apotheciosus.

caninus.

sacatus.

croceus.

deustus.

cocciferus.

pyxidatus.

gracilis.

furfuraceus.

fraxineus.

prunastri.

resupinatus.

miniatus, Mich. n. Gen.

101. t. 54. f. 1.

velleus.

pustulatus.

Lichen *polyphyllus*.

digitatus.

cornutus.

deformis.

rangiferinus.

uncialis.

subulatus.

pascualis.

fragilis.

lanatus.

pubescens.

calyciformis.

virtus.

*L. leprosus rubens tuberculis
nigris*. Flora Danica tab. 470.
fig. 1.

gelidus L.; *L. heclæ*. Fl.
Dan. t. 470. f. 2.

trapeziformis, *coriaceus* e
frustulis planis varie angulatis
constans, nodulis elevatis ni-
gricantibus superficiei virescen-
ti immerfis.

Lichen *pulmonarius terre-
stris* & *clypeatus minimus* &
indivisus. Mich. n. Gen. 101.
tab. 54 fig. 3. Dill. Mus. 228.
tab. XXX. fig. 133.

Lichen



Lichen *nigrescens* Hudf. L. gelatinosus imbricatus, lobis obtusis laceris, peltis fuscis proliferis. Fl. Dan. 479. 3.

reticulatus, umbilicatus multifidus, laciniis margine longitudinaliter conglutinat, hinc simul sumtis mentientibus folium lineis anastomosantibus exaratum.

Unicum pulcherrimæ hujus plantulæ specimen inter Muscorum magnam copiam a Koenigio nostro acceptam deprehendere contigit. E centro fixo lacinia multifida quæquaversus tendentes prodeunt, quarum margines tam arcte coincidunt, ut folii superficies tantum secundum has incisuras striatum appareat, striis concentricis, Striæ aliæ transversæ, quibus concentricæ illæ secantur, superficiem efficiunt reticulatam, quæ insuper sparsim punctis excavata est. Color superne niger, inferne niger fusco variegatus. Substantia interior al-

ba, granulis lutescentibus referta, quæ sub punctis excavatis superficialibus hærent, hinc affinitas cum Lichene *miniato* Linnæi.

Lichen *crinitus*, foliaceus umbilicatus & polyphyllus, marginibus ramosè fimbriatis.

Lichenoides corneum marginibus eleganter fimbriatis. Dill. Musc. 218. t. XXIX. f. 116.

Folia superne colore sunt ex cœruleo nigricante, inferne fusco. Superficies subaspera. Fimbriæ marginales nigrae, basi sæpe fusca. Scutella aterrima, convexiuscula, superficie varie figurata referunt quodammodo nodulos vestiarios & fetis equinis contextos.

sulphureus, fruticulosus ramosissimus pallide sulphureus, ramis implexis apice viride nigricantibus, farinoso tuberculatis. Coralloides durior &c. Hall. Helv. Ed. II. n. 1964. an Usnea ceratoides candicans glabra & odorata? Dill. Musc. 71. t. XIII. f. 14? cfr. t. LXXXIV. f. 10.

Lichen

Lichen defraudans, fruticulosus,
solidus ramosissimus, furculis
ramisque confertissimis fastigia-
tis, ramulorum extremitatibus
contextis in crustam planam ni-
gram.

Egregiæ hujus speciei stru-
ctura casu erat detegenda. Re-
fert cæspitem terræ sic dictæ
turfaceæ, crusta atra obductum.
Diffracta crusta oculis se offert
Lichen fruticulosus descriptus.
Tubercula aggregata viridia cru-
stæ incumbunt, quæ an hujus
fructificatio sint, vel distincta
species e leproforum ordine,
oculus vel armatus distingvere
non valet.

Chara vulgaris.

bispida.

Tremella Lichenoides.

verrucosa.

bemispærica.

adnata.

Fucus ferratus.

vesiculosus.

divaricatus.

excisus?

Fucus inflatus?

ceranoides.

spiralis.

canaliculatus. Oed. Enum.
n. 165. Fl. Dan. t. 214.

distichus. Oed. Enum. 167.
Fl. Dan. t. 351.

nodosus.

siliquosus.

loreus. Oed. Enum. n. 103.
147. 167.

aculeatus. Fl. Dan. t. 355.
Longitudo biulnaris & ultra.
Isl. Skodlehaar.

Lycopodioides. Oed. Enum.
n. 51. 168. Fl. Dan. tab. 357.
Isl. Audustelja Thang.

muscoides?

Filum.

lanosus.

fastigiatus.

furcellatus?

palmaris. Isl. Sol. 3 Augusti

Maaned samles denue og forvares
til Vinteren, da de skærer den smaat
og spiser den kaagt med Mælk.

digitatus. Fl. Dan. t. 352.
Caulis biulnaris & ultra, diame-

tro

tro 2-3. pollicum. Frondis diameter sæpe $1\frac{1}{2}$ ulnarum; lacinia circiciter 30, ulnares, viridilutescentes. Isl. Thare. Saarene æde den.

Fucus esculentus. Fl. Dan. t. 417. Frondis vel folii, apice obtusi, longitudo 4 ad 6 ulnarum, latitudo 4-5 pollicum. Pinnæ utrinque circiter viginti, crassioris substantiæ, quam folium, quod viride. Isl. Myrskierne. Inderbyggerne spiise den, og Saarene siges at blive inoget seede deraf.

Saccharinus. Fl. Dan. t. 416. Specimen Islandicum erat folio simplicissimo; sunt vero alio folio bi- s. tri-partito, laciniiis lateralibus brevioribus, intermedia longissima. Longitudo sæpe 6-7 ulnarum, latitudo $\frac{1}{2}$ ulnæ. Linea folii longitudinalis pellucida glaberrima, ad latera lacunosa. Isl. Thare promiscue cum *digitato*. Kreaturene æde den ickun i Mangel af andre.

sanguineus. Fl. Dan. t. 349. Caulis, rami & rachis foliorum

vesiculis pedunculatis confertis obsiti. Isl. Ovætes. Ssl. Man holder for, at Saarene ei taale den, men blive syge deraf.

Fucus ciliatus. Fl. Dan. tab. 353. Ciliis prolificis se adglutinat corporibus heterogeneis.

crissus.

alatus. Fl. Dan. t. 352.

dentatus. Fl. Dan. t. 354.

Margines frondis tenuissime ciliati, vix callosi. An F. pinnatifidus Hudf.

rubens.

plumosus. Fl. Dan. t. 350.

Varietates duæ, quarum altera omnibus partibus tenerior, Conservæ similis. Isl. Amminneo. Ssl.

cartilagineus?

spermophorus?

gigartinus. Fl. Dan. t. 394.

Frondis dichotomi bipollicaris ultimæ ramificationes multifidæ; lacinia hæ ultimæ minimæ lanceolata sub apice intumescunt in tuberculum globosum, quo crescente, ipse apex aut repri-

reprimitur, aut plane evanescit; in utroque casu tuberculum videtur pedunculatum, & in priori lacinia apex cristam tuberculo subjacentem refert, hinc descriptio Linnæana, intellectu difficillima. Suspicio ceterum, nomen Koenigii, præcedenti speciei in Syst. Nat. Linnæano appositum, huic subjungendum fuisse.

Fucus conservoides?

plicatus Hudf. Oed. En. n. 116. Colore variat rubro, lutescente, albo, & si auctori credendum, saphireo.

albus? Hudf. Oed. Enum. n. 117. Fl. Dan. t. 408.

cornutus, virgatus dichotomus, setis æqualibus. Oed. En. n. 169. Fl. D. t. 358. Isl. *Thussa* *stæg.*

fungularis, coriaceus, frondibus semicircularibus imbricatum sessilibus, subvillosis fuscis, fasciis ochraceis & striis concentricis. Oed. Enum. n. 176. Fl. Dan. t. 420.

Fucus clavatus, dichotomus teres, extremitatibus clavatis, apice excavatis. Oed. Enum. n. 173. Minimus, longitudine pollicis. *coronopifolius*, frondibus cartilagineis subdichotomis, canaliculatis, subtus & margine oblitis verrucis seu ramulorum rudimentis confertis.

Fucus Coronopi facie. Ray. Synops. Stirp. Britt. p. 45. n. 23. Parvus purpureus L. luteus a basi usque ad apices ramificationum canaliculatus. Ramificationes sensim versus apicem latiores, facie crispa. Verrucæ marginales in ramulos cylindricos parallelos excrescunt. Isl. *Skod* *legræs.*

Ulva umbilicalis?

intestinalis.

compressa.

latissima.

pruniformis?

Lactuca.

sobolifera. Oed. En. n. 97.

Fl. Dan. tab. 356.

lanceolata. Oed. En. n. 90.

Ulva



Ulva Linza. Oed. En. n. 91.

Conserva littoralis.

æruginosa.

dichotoma?

scoparia.

cancellata.

polymorpha Fl. D. t. 395.

rupestris.

ægagropila.

corallina L. C. geniculata dichotoma, ramulis acutis, articulis pellucidis albis, geniculis purpureis lævibus.

barbata, dichotoma, ramulis subfastigiatis obtusis articulis pellucidis albis, geniculis purpurascensibus barbatis.

Byssus *cryptarum.*

Foliotbos?

botryoides.

Agaricus campanulatus.

finetarius.

Boletus bovinus.

Elvela atra pileo lobis difformibus non clausis, atra parva. Fl.

Dan. t. 354. 1.

æruginosa minima, pileo difformi viridissimo. Fl. Dan.

t. 354. 2.

Peziza lentifera.

scutellata.

cupularis.

zonalis; radiata pileo patente membranaceo, fibroso striato & zonis picto. Fl. Dan. t. 469. 2.

Clavaria coralloides.

muscoides.

Lycoperdon Bovista.



Forflaring

over endeel af Tabellerne.

Tab. 10. Fig. 1. Murex, Haf-Kongur. Fig. 2. Nerita, Meyar-Patta.
Fig. 3. Turbo Neritoides, Raudr Fjoru-Kongr. Fig. 4. Buccinum, Eggia-Kongr. Fig. 5. Ostrea, Harpudiskur. Fig. 6. 10. Julius, Bløden-Skere. Fig. 7. Scolopendra, Skere. Fig. 8. Lumbricus, Fjoru-Madkur. Fig. 9. Hirudo, Madka-Moder. Fig. 11. Marthvare. Fig. 12, 13. Blennius, Skerja-Steinbitur. Fig. 14, 15. Clupea, Trønu-Sil.


Tab. 15. (1) Forgaaerden, eller det nedfaldne af Hulens Høelving. 2. Indgangen. 3. Første Nabning. 4. Skandse-Hulen 3: Viiget. 5. En Mellem-Veg i Skandse-Hulens Indgang. 6. den smale Gang i samme Hule. 7. en først Søe. 8. en anden Tver-Hule. 9. Hull paa Mellem-Veggen. 10. tredie Tver-Hule. 11. anden Nabning. 12. Mellem-Veg. 13. tredie Nabning. 14. Arm af Surt-Hulen. 15. først Søe. 16. fierde Nabning. 17. det mørke og kolde Sted. 18. en Barde. 19. det inderste af Hulen.

NB. Det Stykke, fra 3die Nabning til Enden, som udgier $\frac{3}{4}$ Deele af Hulen, er her forkortet.

Tab. 45. a. Blåse-Høien selv med sine tre Nabninger. bbb. trende Høere. c. en anden mindre kaagende Høer. add. trende dybe kaagende Pøsele, som frembringe den feedagtige Jord. (e) Nordenden af Kulshaidar-Fjældene. f og g. Lille og Store Bursfell. (hh) Nordre Grusufell. (i) Nordre Ende af Hofs-Jokul. (k) en liden først Søe. ll. den nordlige Deel af Kial-Hrauni med sine Spalter. mmmm. Damp af bemeldte Spalter. nnnn. Uddøde gamle Høer. (o) en Barde hos Blåse-Høien af Hraun-Steene.

Trykfeilene kunne saaledes rettes.

Pag. 21.	lin. 9.	Malerie,	las:	Malerie.
—	— 14.	epidemius	—	epidemicus.
— 59.	lin. ult.	Getta	—	Gretta.
— 103.	— 16.	mindst	—	mindste.
— 107.	— 2.	saues	—	saules.
— 121.	— 8.	maatte	—	matte.
— 138.	— 19.	Mamor	—	Marmor.
— 146.	— 5.	Thophus	—	Tophus.
— 172.	— 16.	Wider	—	Widie.
— 177.	— 8	reentlig	—	reentlige.
— 178.	— 2.	reentlig	—	reentlig.
— 225.	— 11.	ernaar	—	er naar.
— 252.	— 9.	Pinner	—	Piner.
— 288.	— 12.	6862	—	i Mscr. staar 26862.
— 300.	— 2.	Hellafell	—	Helgafell.
— 315.	— 3.	liqvatum	—	liqvatum.
— 378.	— 11.	det	—	der.
— 397.	— 5;	—	—	S.
— 398.	— 9.	ere	—	er.
— 402.	— 6.	crystallizatos	—	crystallizatos.
— 449.	— 14.	den	—	de.
— 464.	— 14.	er	—	ere.
— 496.	— 6.	resde.	—	reiede.
— 586.	— 19.	men	—	med.
— 592.	lin ult.	Strift	—	Strift.
— 604.	— 22.	glauncis	—	glaucis.
— 621.	— 16.	Giorbierg	—	Gorbierg.
— 647.	lin. ult.	i Giorveien	—	i Gorveien.
— 654.	— 21.	Stene	—	Stene.
— 665.	— 15.	frus-de	—	frusede.
— 701.	— 18.	beredne	—	beriedne.
— 705.	— 7.	Hogser	—	Hiser.
— 714.	— 6	brunni	—	brunnei.
— 762.	— 26	Hodaland	—	Godaland.
— 932.	— 25.	Pinie	—	Pine.
— 954.	— 13.	nae	—	ner.
— 955.	— 20.	Meyran	—	Merian.









Lbs - Islandssafn



100436749 - 6

